


V. 17 - V. 18

卷
6

增廣本草綱目



本草綱目草部目錄第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 本經

商陸 本經

狼毒 本經

防葵 本經

狼牙 本經

蘭始 本經

大戟 本經

澤漆 本經

甘遂 本經

續隨子 開寶

蔓菁 本經 即天仙子

雲實 本經

訶麻 唐本 博落迴附

常山蜀漆 本經 吐莖山 土紅山附

藜蘆 本經 山慈石 參果根 馬腸根附

木藜蘆 拾遺

附子 本經

天雄 本經

側子 別錄

漏蘆子 綱目

烏頭 本經

白附子 別錄

虎掌天南星 本經

車鼓 本經

鉤吻 開寶 苦薩草附

半夏 本經

蚤休 本經

鬼臼 本經

射干 本經

鳶尾 本經

玉簪 綱目

鳳仙 綱目

坐琴草 圖經 坤不蘆附

曼陀羅花 綱目

羊躑躅 本經 山躑躅 羊不吃草附

芫花 本經

堇花 本經

醉魚草 綱目

莽草 本經

茵陳 本經

本草綱目

卷十七

石龍芮

本經即胡椒菜

毛茛

拾遺每蔓附

牛扁

本經風建草附

葶麻

圖經

格注草

唐本

海芋

綱目透山根附

鉤吻

本經

右附方舊一百三十四新四百九十五

本草綱目草部第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃

本經

釋名

經

將軍

吳普

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

蜀郡北郡或龍西二月養生黃赤其葉四四相當莖高三尺許三月花黃五月實黑八月采根根有黃汁切之陰乾景曰今采益州北郡汶山及西山者雖非河西龍西好者猶作紫花錦色味甚苦澁色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如西耐旺堪久此藥至勁利粗者便不中服茶曰葉子並並似羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖禁粗長而厚根紅者亦似宿羊蹄大有乃如莖長二尺其性溫潤而易蛀壞火乾乃佳作時燒石使熱橫寸截著石上燂之一日微燥以繩穿眼乾今出宕州涼州西羌蜀地者佳並以此者漸細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及龍西誤矣金鑑曰凡用當分別之若取和厚深沈能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者若取瀉瀉快推陳去熱者當取河西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦龍來者謂之土番大黃正月內生青葉似莞麻大者如扇根如芋大者如莖長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似薔薇花者並青葉色形如竹二八采根去黑皮切作橫片火乾蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土大黃二月間花結細實時珍曰宋祁益州方物圖言蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若監藥市以正吳頌曰鼎州出一種羊蹄大黃治疥癬甚效初生大者為板紫地錦文也今人以莊浪出者為最莊浪即右涇原龍西地與別錄相合正吳頌曰鼎州出一種羊蹄大黃治疥癬甚效初生條出穗五七莖相合花葉同色結實如薔薇而輕小五月熟即黃色呼為金薔薇三月采治五月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼為土大黃時珍曰蘇說即老羊蹄根也因其似大黃故謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃也狀似羊蹄而生山上所謂土大黃或指此非羊蹄也俱見本條

根

雷公

凡使細切以文如水旋斑緊重到炆蒸之從已至未晒乾又酒臘水蒸之從未至友如此凡七次晒乾却酒洗蜜水再蒸

一伏時其大黃必如烏膏樣乃晒乾用鐵器曰凡用有蒸有生有熟不得一聚用之承曰大黃采時皆以火石燂乾貨貴無生

者用之亦不須

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒雷曰神農雷公苦有毒屬鵠苦無毒李當之大寒元氣曰味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也

更多炮炙蒸煮

用之須酒浸煨熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒景曰大黃若峻下走用之於

本草綱目

卷十七上

草部

下必生用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至高之分驅熱而下如物在高顛必射而取之也若用生者則適至高之邪熱是以愈後或目赤或喉腫或頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元氣耗陰血故也
受才曰黃芩為之使無所畏權曰忌冷水惡乾漆
王治下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食薄滯腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟
本平胃

下氣除痰實腸開結心腹脹滿女子寒崩腹小腹痛諸老血留結
別通李經候利水腫利大小腸貼熱腫毒免寒熱時煩熱

蝕膿
通宣一切氣調血脉利關節泄癰滯水氣溫瘧熱瘡
大瀉諸實熱不通陰下焦濕熱消宿食瀉心下痞滿元下痢赤白裏急腹

痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譫語黃疸諸大瘡
時珍發明之才曰得為藥黃芩壯蠟細辛按冬瘡瘻患惡心下悸氣得消石紫石英桃仁

或曰心氣既不足而不用補心湯更用瀉心湯何也答曰若心氣不足則當不吐衄也此乃邪熱因不足而客之故令吐衄以苦泄其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用之無不效惟在量其虛實而已張仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連

足本經之陽亢甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣宛氏不明說而云邪熱客之何以明仲景之意而開悟後人也大黃乃足太陽手足陽明手足厥陰五經血分之藥凡病在五經血分者用宜之若在氣分者用之是謂謀伐無過矣瀉心湯治心氣不足吐血衄血者乃真心之氣不足而手足厥陰心包絡足厥陰肝足太陽脾足陽明胃之邪火有餘也雖曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發於陰而反下之則作痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結於上焦胃之上脘在於心故曰瀉心實瀉脾也素問曰太陰所致為痞滿又云濁氣在上則生腹脹是矣病發於陽而反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分野仲景大陷胸湯尤常用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸湯痞滿在氣分則半夏瀉心湯美成無已註釋傷寒論亦不知分別此義成無已曰熱淫所勝以苦泄之大黃之苦以蕩滌痰熱下燥結而泄胃強鎮固本草稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥攻病為隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用也梁武帝因發熱欲飲大黃姚僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧坦曰脉洪而實此有宿妨非用大黃無復理帝從之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻眾病其偶中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不戒哉蓋用藥不中皆由審病未得其源也

附方 舊十四新 吐血 治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之 大黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利 張仲景金匱玉函 **吐血刺痛** 大黃一兩為散每服一錢以生地黄汁

方傷寒痞滿 病於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為痞也 大黃黃連瀉心湯主之 大黃二兩黃連二兩黃芩二兩甘草二兩水五升煎取三升分三次服 張仲景傷寒論 **熱病瘧疾** 大黃五兩剉炒微赤為散用

方傷寒痞滿 二兩黃連二兩以麻沸湯二升漬之須臾絞汁分作二次溫服 張仲景傷寒論 **熱病瘧疾** 大黃五兩剉炒微赤為散用 冷水下 即傷寒發黃 方同上 氣壯者大黃一兩水二升漬一宿平旦煎服 傷寒類要 **脚風氣** 作痛大黃二兩切如梔子少許炒乾勿令焦揚

沸取湯調服當下冷膿惡物 一切壅滯 經驗方治風熱積滯化痰涎治痞悶消食化氣導血用大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜 即痛止 崔元亮海上方 一 切壅滯 九如梔子大每服十兩白湯下並不損人如要微利加二十兩 〇衛生寶鑑用皂莢熬膏和丸名

隆痰凡又名全真丸 全宣 痰為百病 痰痰九治痰為百病惟水瀉胎前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃芩八兩沉香半兩 宗服之有驗賜名保安丸 痰為百病 青礞石二兩以煅消二兩同人砂鑊固濟煅紅研末二兩石各取末以水和丸梔子大常服一二十

九小病五六十九緩病七八十九急病一百二十九溫水吞下即卧勿動候藥達上焦痰滯 男女諸病 無極九治婦人經血不通赤白帶 次日先下糟粕次下痰涎未下再服王隱君歲合四十餘斤愈疾數萬也 養生主論 男女諸病 下崩漏不止腸風下血五淋產後

積血癥瘕腹痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等症其効甚速宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分用童尿一盞食鹽三錢 浸一日切晒一分用醇酒一盞浸一日切晒再以巴豆仁三十五粒同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泔水一盞浸一日切晒一分

用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日去歸切晒為末煉蜜丸梔子大每服五十 心腹諸病 三物備急丸治心腹諸疾卒暴百病大黃巴豆 丸空心溫酒下取下惡物為驗未下再服此武當山士接雲雲方也 醫林集要 心腹諸病 乾薑各兩梔子大和搗一千杵九小豆大每

服三九凡中客卒忤心腹脹滿痛如錐刀急氣口噤唇青卒死者以暖水或酒服之或灌之未和更服三九腹中 腹中痞塊 大黃十兩為 鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即醒此仲景方司空表奏改為散用不及丸也 圖經本草 腹中痞塊 散醋三升蜜

兩匙和煎丸梔子大每服三十九 腹脇積塊 風化石灰末半斤凡器炒極熱稍冷入大黃末一兩炒熟入桂心末半兩略炒下米醋攪成 生薑湯下吐利為度 外臺秘要 腹脇積塊 膏攤布熨又方大黃二兩朴消一兩為末以大蒜同搗膏和貼之或加阿魏一兩尤妙

丹溪 久患積聚 二便不利上搶心腹脹滿食大黃白芍各二兩為末 脾瘕疝積 不拘大人小兒錦紋大黃三兩為末醋一盞沙鍋內文 心法 久患積聚 水丸梔子大每湯下四十九日三以知為度 千金方 脾瘕疝積 武火熬成膏傾瓦上日晒夜露三日再研用舶上硫黃

一兩形如琥珀者官粉一兩同研勻十歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切 小兒無辜 閉癰瘰癧或頭乾黃瘰或官痢仁瘰諸 冷生魚肉只食白粥半月如一服不愈半月之後再服若不忘口不如勿服聖濟總錄 小兒無辜 狀多者大黃煎主之大黃九兩錦紋新

實者若微朽即不中用削去皮搗篩為散以好米醋三升和置瓦甌中於大鑪內浮湯上炭火慢煮至成膏可丸乃貯瓷中三歲兒一服
七丸梧子大日再服以下出青赤膿為度若不下或下少稍稍加丸若下多又須減之病重者七八劑方盡根大人亦可服之此藥惟下
宿膿不令小兒利也須禁食毒物乳母
亦禁之一加木香一兩半 崔知悌方
小兒驚風 大黃煨熟黃芩各一兩為末煉蜜丸麻子大每服只可
五丸至十丸寧湯下加黃連名三黃丸 錢氏小兒方
骨蒸積熱 以童子小便五六合

煎取四合去滓空腹分為二服
如人行五里再服 唐利方
赤白濁淋 好大黃為末每服六分以雞子一個破頂入藥曰
木秘 錢有厥冷者酒服無厥冷五心煩

湯服 劉河
諸痢初起 大黃煨熟當歸各二三錢壯人各一兩
水煎服取利或加用板櫛 集簡方
熱痢裏急 大黃一兩酒浸半日
煎服取利 集簡方
忽喘悶色 不能言語涎流吐逆牙齒動搖

熱霍亂大黃人參各半兩水二盞
煎一盞熱服可安 危氏得效方
食已即吐 胸中有火也大黃一兩甘草二錢半水
煎一盞熱服可安 危氏得效方
婦人血癖 作痛大黃一兩酒二升煮
十沸頃服取利 千金翼

兩頭醋半升熬膏丸梧子大每服
五丸溫醋化下良久下 千金方
氣痛 錦紋大黃酒浸曬乾四兩為末好醋一升熬成膏丸芡子大卧時酒化一
升煮半升溫服 仲景金匱玉函方
人血癖 作痛大黃一兩酒二升煮
十沸頃服取利 千金翼

黃一兩酒一升煮一
沸頃服 千金方
男子偏墜 作痛大黃末和醋塗
之乾則易 梅師方
暴赤目痛 四物湯加大黃酒煎
服之 傳信適用方
胃火牙痛 口含冰水一口以紙燃蘸大黃末
塗頂上乾即再上

桃和眾至寶方
暴赤目痛 四物湯加大黃酒煎
服之 傳信適用方
胃火牙痛 口含冰水一口以紙燃蘸大黃末
塗頂上乾即再上

令燒存性為末早晚搽牙漱去都下一家專貨此藥
令兩宮常以數千購之其門如市也 千金家藏方
牙痛 牙根常出血漸至崩落口臭極效大黃米泔浸軟生地黃各旋切一
分兩宮常以數千購之其門如市也 千金家藏方

麻爛 用大黃枯樹等分為末
以擦之吐涎 聖惠方
鼻生瘡 生大黃杏仁搗勻豬脂和塗之方生大黃黃連
各二錢麝香少許為末用生油調搽 聖惠方
仙茅毒發 毒膿出口方
見仙茅下
損傷瘀血 三因方雞鳴散
治從高墮下木

石壓傷及一切損傷瘀凝精痛不可忍並以此藥推陳致新大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒細研酒一盞煎六分雞
鳴時服至晚取下瘀血即愈和濟方治跌壓瘀血在內脹滿大黃當歸等分炒研每服四錢酒溫服取下惡物即愈才
或作潮熱者大黃末薑汁調塗二夜黑
杖瘡腫痛 大黃末醋調塗之量尿
金瘡煩痛 大便不利大黃苦茶等分為末蜜丸
者紫二夜紫者白矣 湖湖集簡方

杖瘡腫痛 大黃末醋調塗之量尿
金瘡煩痛 大便不利大黃苦茶等分為末蜜丸
者紫二夜紫者白矣 湖湖集簡方
凍瘡破爛 大黃

傳

藥名甚多尤良領曰古方術家多用之亦可單服五月五日采根竹葉或樹屋東北角陰乾百日搗篩并華水調服云

神仙所秘法也時珍曰商陸苦寒沉也降也陰也其性下行專於利水與大戟甘遂蓋異性而同功胃氣虛弱者不可用方家治腫滿小便不利者以赤根搗爛入射香三分貼於臍心以帛束之得小便便利即腫消又治濕水以指畫肉上隨散不戒文者用白商陸香附子炒乾出火毒以酒浸一夜日乾為末每服三錢米飲下或以大蒜同商陸煮汁服亦可其莖葉作蔬食亦可治腫疾蓋誤曰古謂云其味酸辛其形類人瘰癧水貼腫其效如神斯言盡之矣

附方 舊九 濕氣脚軟 章柳根切小豆大煮熱更以綠豆同煮為水腫氣滿 外臺秘要用白商陸根去皮切如豆大一大盞以水二升煮一

食○千金髓用白商陸六兩取汁半合和酒半升者人與服當利下水取效○梅 腹中臬 有物如石痛刺喘時不絕百日死多取商陸

師方用白商陸一升羊肉六兩水一斗煮取六升去滓和葱豉作膳食之有效 根搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆冷即

易晝夜勿息 瘰癧如石 在脇下堅硬生商陸根汁一升杏仁一兩浸去皮搗如泥以商陸汁絞 瘰癧腹大 聖滿喘不能卧白聖散用

真八千金方 甘遂炒一兩為末每服二三錢熱湯調下大便 五戶注痛 腹痛脹急不得喘息上攻心胸旁攻兩脇痛或硬塊

宣利為度此乃去水聖藥也 潔古保命集 耳卒熱腫 以生商陸剉尖納 喉卒攻痛 商陸切根炙熱隔布敷之

及膨脹腎氣乾霍亂由毒氣與胃氣相搏欲出不得出也以 聖濟方 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧

商陸根和葱白搗傅臍上止疔疔出方免無虞 摘玄方 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧 瘰癧瘰癧

毒洋者是防葵俗用亦稀為瘡腹內要藥耳恭曰今出泰州成州秦高原在二州之界秦隴地寒元無蛟蛇此物與防葵都不同類生處又別太山漢中亦不聞有陶說誤矣急曰狼毒藥似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者為劣秦泰在隴西秦高是太山下縣陶云沉者是狼毒洋者是防葵此不足為信假使防葵秋冬采者堅實得水皆沉狼毒者夏采者輕虛得水皆浮且二物全別不可比類此與麻黃橘皮半夏枳實吳茱萸為六陳也保昇曰根似玄參惟虛浮者為劣也續曰今陝西州郡及遠石州亦有之狀如馬志所說時珍曰狼毒出秦蜀地今人往往以草蘭茹為之誤矣見蘭茹下也

根氣味辛有大毒

大明曰苦辛有毒之才曰大豆為之使宜醋炒無麥句薑異占斯塞陀僧也

主治 欬逆上氣破積聚飲食熱水氣延瘡癰疽蝕鬼精毒殺飛

烏走獸除胸下積

經本錄治痰飲癰瘕亦殺氣

合野葛細昂治聾

附方 抱朴子新六 **心腹連痛**

作服用狼毒二兩附子半兩搗篩塞丸梧子大一日服一丸二日二丸三日三

丸止又從一丸起至三丸止以瘥為度

射后方

九種心痛

一蟲二蟲三風四悸五食六飲七冷八熱九氣也又治連年積冷流注心胸及落馬驢車瘀血中惡等證九痛丸用狼毒炙香吳茱萸湯泡巴豆去心炒取霜乾薑炮人參各一兩附子炮去皮三兩為

未煉蜜丸梧子大每空服溫酒下一丸和劑局方

腹中冷痛

水穀陰積心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆宮飲食用狼毒三兩附子一兩旋覆花三兩搗末蜜丸梧子大每服三丸食前白湯下日三服之

射后方

陰山欲死

丸縮入腹急痛欲死狼毒

四兩防風二兩附子三兩炮以蜜丸梧子大每服三丸日夜三度白湯下

射后方

兩脇氣

言方同服中

刀蟲瘡

川狼毒杆末每服一錢用錫一皂子大沙糖少許以水化開時空腹服之次早即下蟲也

狼毒不拘多少搗爛以猪油馬油調搽患處方睡勿以被

積年疥癩

狼毒一兩一半生研一半研炒輕粉三合水銀三錢以茶末少許於掌頭恐藥氣傷面此維揚潘氏所傳方

積年疥癩

狼毒一兩一半生研一半研炒輕粉三合水銀三錢以茶末少許於掌頭恐藥氣傷面此維揚潘氏所傳方

遇夜不見燈火蘸油塗瘡上以口鼻

積年乾癬

生瘡瘡之黃水出每逢陰雨即

惡瘡

狼毒秦艾等分為末每服方寸匕於藥杯上吸氣以取效

防葵

本經上品藥

防葵

別錄

防葵

吳普又名蕭離方蓋農桑曰根葉

根葉如葵葉如葵上黑黃二月生根根大如桔梗根

中紅白六月花白七月八月實白三月采根桑曰此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西方有之興州者乃勝南者為勝蜀地也續曰今惟出襄陽地他郡不聞也其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如蔥花景天輩而色白六月開花即結子根似防風香

咽痛

毒攻作腫真謂如爪甲大約口嚕汁

中焦熱痞

善忘不寐開始二分甘草二兩消石為末每服一錢雞鳴時溫酒下以知為度

聖惠下

疥瘡癰癰調塗之 多能部事

大戟

本經下品經

錫鉅爾

下馬仙

綱目時珍曰其根辛苦戰人咽喉故名今俚人呼為下馬仙言利人甚速也郭璞注爾雅云蕒蕒鉅爾大戟也

集解曰大戟生常山十二月采根陰乾條并

若參度黃白黃白五月采苗二月八月采根用頃曰近道多有之春生紅芽漸長葉高一尺以來葉似初生楊柳小園三月四月間黃紫花團圓似杏花又似蕒蕒根似細若參秋久葉根陰乾就佳旬出者葉團高三四尺葉黃莖至心亦如百合苗上南生者葉似芍藥時珍曰大戟生平澤甚多直莖高二三尺中空折之有白漿葉長統如柳葉而不圓其根甚密錯而上杭州紫大戟為上江南上大戟次之北地綿大戟色白其根更柔如綿甚峻利能傷人弱者服之或至吐血不可不知

根

治瘰癧凡使勿用附生者誤服令人茂氣不禁即煎蕒蕒尾解之采得後於晚帖上細剉與海羊葉拌蒸從已至申去羊葉貼乾用時珍曰凡采得以漿水煮軟去骨晒乾用海羊葉麻而有毒恐不可用也

氣味苦寒有小毒 別錄曰甘大寒

權曰昔辛有大毒元素曰苦甘辛陰中微陽濕肺損真氣時珍曰得毒即不損脾之才曰反甘草用蕒蕒解之宋曰畏苦蕒蕒蕒蕒大戟曰亦小豆為之使惡蕒蕒

主治聖藥三水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛

吐逆

本經

頸腹癰腫頭痛發汗利大小便

錄毒藥泄天行黃病溫瘧瘵瘵結太下惡血瘕腹內雷鳴面水腫胎孕權治隱瘕風及風

毒腫

並者水曰熱淋取愈

成無已曰大戟甘遂之苦以泄水者腎所主也好古曰大戟與甘遂同為泄水之藥濕勝者若燥

塞竅而成效唾稠黏喘急皆入於肺則留伏蓄聚而成癰腫乾嘔寒熱往來入於經絡則麻痺皮膚痛入於筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱痛陳無擇三因方並以控涎丹主之陳有奇如此乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則凝滯而為痰為飲為涎為涕為癰

大戟能泄臟腑之水濕甘遂能行經隧之水濕白芥子能散皮裏膜外之痰氣惟善用者能收奇功也又錢仲陽謂腎為真水有補而無瀉而復云處瘡瘻黑腸腎一論用百祥膏下之以瀉腎非瀉腎也瀉其臟則臟自不實瀉其百祥惟用大戟一味大戟能行水故曰瀉其

腑則臟自不實腑者肺也竊謂百祥非獨瀉肺正實則瀉其子也腎邪實而瀉其肝也大戟味苦滑浸水色青綠肝膽之藥也故百祥膏又治嗽而能吐青綠水夫青綠者少陽風木之色也仲景亦云心下痞滿引脇下痛乾嘔短氣者十畫湯主之其中亦有大戟夫乾嘔

脇痛非肝膽之病乎則百祥之瀉肝膽也明矣肝乃東方宜瀉不宜補況瀉青瀉黃皆瀉其子同一瀉也何獨腎只瀉肺乎潔古老人治變黑歸腎證用宣風散代百祥膏亦是瀉子之意蓋天火熾水則益潤風火大勢則土受剋故津血內竭不能化膿而成青黑乾陷之證

為其風火之毒所以救腎扶脾也或云脾虛腎旺故厚
腎扶脾非也而腎之真水不可竭清其陽伏之邪毒附方
乾復納原汁盡焙為末水丸粟米大每服一二十九丸研赤脂湯下○潔古法機要靈寶百祥丸治瘰癧腎乾不發寒者宜下之
變震大便閉結用大戟一兩蜜三枚水一盞同煮是乾去大戟以蜜因焙為丸服之從少至多以利為度
胸背腰脇手足膝脾隱痛不可忍筋骨牽引鉤痛走易及皮膚麻痺如牛癰疽不可誤作風氣風毒及瘡疽施治又治頭痛不可果或睡
中流涎或欬唾喘息或痰迷心竅並宜此藥敷服腹腹自失諸疾悉愈藥大戟白甘遂白芥子微炒各一兩為末薑汁打糊丸梧子大
每服七丸或二十九丸以津液嚥下
若取利則服五六十九丸
三因方水腫喘急小便澀及水蠱大戟二兩乾薑炮半兩為散每服
頭服利下水二三升勿怪至重者不過再服便瘳瘳毒
食一年永不復作此方出張尚客李絳兵部手集
水氣腫脹大戟一兩履木香半兩為末五更酒服一錢半取下碧水後以水重復
如鼓或過身浮腫用黃一斗入鍋內以水浸過用大戟根苗蓋之瓦盆合定煮熱取棗無時食之棗盡決愈○又大戟散用大戟白
薑牛木香等分為末每服一錢以豬腰子一對批開繃末在內濕紙煨熟空心食之左則塌左右則塌石
張潔古法機要
牙痛

搖痛大戟咬於痛處
良生編中風發熱大戟苦參四兩白酢漿一斗
煮熱洗之寒乃止千金方

澤漆本經澤漆下品果澤漆經澤漆
乾天明曰此即大戟花川澤中有並梗小花黃色葉似嫩葉五月采之頭曰全葉州鼎州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤
漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食狀大戟苗能洩人不可為藥今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一
名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢葉並如馬齒莧綠葉如首管葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名
貓兒眼並頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝間細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草並有白汁粘人
其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟
苗也今方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本草文相合自漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

莖葉氣味苦微寒無毒
別錄曰辛大明日冷有小毒
治皮膚熱腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足
本利大小腸閉目輕身

澤漆本經澤漆下品果澤漆經澤漆
乾天明曰此即大戟花川澤中有並梗小花黃色葉似嫩葉五月采之頭曰全葉州鼎州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤
漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食狀大戟苗能洩人不可為藥今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一
名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢葉並如馬齒莧綠葉如首管葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名
貓兒眼並頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝間細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草並有白汁粘人
其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟
苗也今方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本草文相合自漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

澤漆本經澤漆下品果澤漆經澤漆
乾天明曰此即大戟花川澤中有並梗小花黃色葉似嫩葉五月采之頭曰全葉州鼎州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤
漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食狀大戟苗能洩人不可為藥今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一
名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢葉並如馬齒莧綠葉如首管葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名
貓兒眼並頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝間細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草並有白汁粘人
其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟
苗也今方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本草文相合自漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

澤漆本經澤漆下品果澤漆經澤漆
乾天明曰此即大戟花川澤中有並梗小花黃色葉似嫩葉五月采之頭曰全葉州鼎州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤
漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食狀大戟苗能洩人不可為藥今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一
名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢葉並如馬齒莧綠葉如首管葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名
貓兒眼並頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝間細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草並有白汁粘人
其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟
苗也今方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本草文相合自漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

澤漆本經澤漆下品果澤漆經澤漆
乾天明曰此即大戟花川澤中有並梗小花黃色葉似嫩葉五月采之頭曰全葉州鼎州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤
漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食狀大戟苗能洩人不可為藥今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一
名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢葉並如馬齒莧綠葉如首管葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名
貓兒眼並頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝間細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草並有白汁粘人
其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟
苗也今方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本草文相合自漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

澤漆本經澤漆下品果澤漆經澤漆
乾天明曰此即大戟花川澤中有並梗小花黃色葉似嫩葉五月采之頭曰全葉州鼎州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤
漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食狀大戟苗能洩人不可為藥今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一
名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢葉並如馬齒莧綠葉如首管葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名
貓兒眼並頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝間細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草並有白汁粘人
其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟
苗也今方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本草文相合自漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

澤漆本經澤漆下品果澤漆經澤漆
乾天明曰此即大戟花川澤中有並梗小花黃色葉似嫩葉五月采之頭曰全葉州鼎州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤
漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食狀大戟苗能洩人不可為藥今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一
名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢葉並如馬齒莧綠葉如首管葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名
貓兒眼並頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝間細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草並有白汁粘人
其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟
苗也今方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本草文相合自漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

澤漆本經澤漆下品果澤漆經澤漆
乾天明曰此即大戟花川澤中有並梗小花黃色葉似嫩葉五月采之頭曰全葉州鼎州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤
漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食狀大戟苗能洩人不可為藥今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一
名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢葉並如馬齒莧綠葉如首管葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名
貓兒眼並頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝間細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草並有白汁粘人
其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟
苗也今方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本草文相合自漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

澤漆本經澤漆下品果澤漆經澤漆
乾天明曰此即大戟花川澤中有並梗小花黃色葉似嫩葉五月采之頭曰全葉州鼎州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤
漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食狀大戟苗能洩人不可為藥今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一
名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢葉並如馬齒莧綠葉如首管葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名
貓兒眼並頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝間細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草並有白汁粘人
其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟
苗也今方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本草文相合自漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

澤漆本經澤漆下品果澤漆經澤漆
乾天明曰此即大戟花川澤中有並梗小花黃色葉似嫩葉五月采之頭曰全葉州鼎州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤
漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食狀大戟苗能洩人不可為藥今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一
名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢葉並如馬齒莧綠葉如首管葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名
貓兒眼並頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝間細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草並有白汁粘人
其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟
苗也今方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本草文相合自漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

反而立切也劉河間保命集云凡水腫服藥全消者以甘遂末塗腹臍臍令滿內服甘草水其腫便去又王璠有一蓮方云脚氣上攻結成腫核及一切腫毒用甘遂末水調傅腫處即濃煎甘草汁服其腫即散二物相反而感應如此清流錄諸病脚症用此一服病去七

八再服舊三新附方甘遂炒二錢二分黑牽牛一兩半膜外水氣甘遂末大麥麩各半兩水和作餅燒熟食之取利 聖濟總錄身面洪腫甘遂二錢生研為末以豬腎一枚

而愈也附方十九水腫腹滿甘遂炒二錢二分黑牽牛一兩半腎氣流注腿膝學急四肢腫痛即上方加木香四錢每用二錢燒熟溫酒嚥下當利黃水為驗 御藥院方傳正水脹急大小不利欲死

分為七鬻八末在內濕紙包煨令熟食之日一服肘后方腎氣流注腿膝學急四肢腫痛即上方加木香四錢每用二錢燒熟溫酒嚥下當利黃水為驗 御藥院方傳正水脹急大小不利欲死

至四五服常覺腹鳴小便利是其功也肘后方腎氣流注腿膝學急四肢腫痛即上方加木香四錢每用二錢燒熟溫酒嚥下當利黃水為驗 御藥院方傳正水脹急大小不利欲死

半炒胭脂子十文研勻每以一錢白麩四兩水和作餅子大水煮令小兒疳水珠子甘遂炒青橘皮等分為末三歲用一錢以麥芽湯浮淡食之大小便利後用平胃散加熟附子以二錢煎服 普濟方

水蠱喘甘遂大戟各一兩慢火炙研每服一字水水腫喘急大小便不通十棗丸用甘遂大戟芫花等分為末以棗肉和九梧子大壬娘重氣急小腹滿大小便不利已服猪苓散不瘳者用太山赤皮甘遂二兩搗篩白蜜和丸

夏十二個水一升煮半升去滓入芍藥五枚甘草一節水二升煮腎臟風氣攻注下部瘡瘻甘遂半兩木鼈子仁四個為末猪半升去滓以蜜羊升同煎八合頓取利為効張仲景金匱玉函經氣腫痛腰子一個去皮膜切片用藥四錢按在內濕紙包煨熟空心食之米飲下服後便伸兩足大便行後

可吃白粥二三日為妙也本事方二便不通甘遂末以生麩糊調傅臍中及丹田內仍艾三壯飲甘草湯以通為度聖惠方小便轉甘遂錢猪苓湯調下立疝氣偏腫甘遂苗香等分為末酒煮又太山赤皮甘遂末一兩煉蜜和勻分作四服日一服取利聖惠方小便轉甘遂通筆峰雜興方疝氣偏腫服二錢 儒門事親又太山赤皮甘遂末一兩煉蜜和勻分作四服日一服取利

氣噎甘遂炮煨五錢南木香一錢為末壯者瘧證發熱盜汗胸背疼痛甘遂麩包煎水煮十沸去麩以細糠火炒黃為消渴飲甘遂半兩黃連一兩為末蒸餅九粒豆大每瘧病奇方瘧證發熱盜汗胸背疼痛甘遂麩包煎水煮十沸去麩以細糠火炒黃為消渴飲甘遂薄荷湯下二九忌甘草楊氏家藏方瘧病奇方瘧證發熱瘧證發熱盜汗胸背疼痛甘遂麩包煎水煮十沸去麩以細糠火炒黃為消渴飲甘遂便下惡物為効不馬脾風病小兒風熱喘促悶亂不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛二錢半輕粉一角為末下再服濟生方每服用一字漿水少許滴油一小點抄藥在上沉下去漿水灌之名無價散全幼心鑑方麻木痠痛

膏用甘遂二兩薏麻子仁四兩棧脂一兩搗作餅貼之內飲甘草湯摘玄方耳聾聾閉甘遂半寸綿裹插入兩耳內口中嚼少甘草耳卒自然通也永類方

續隨子

宋開寶

釋名金子寶千兩金寶善薩寶日巨寶聯寶故名不月始長故名拒冬

北土產少苗如大戟初生一莖莖端生葉葉中復出葉花亦類大戟自葉中抽幹而生實

青有殼人家園亭中多種以為飾秋種冬長春秀秋實時珍曰莖中亦有白汁可結水銀

以紙包裹去油取色白者氣味辛溫有

毒治婦人血結月閉瘀血癥瘕除毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸下惡滯物寶未聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾碎研

酒服不過三顆當下惡物宣一切宿滯治肺氣水氣日服十粒瀉多以酸漿水或薄醋漿飲即止又塗疥癩瘡

人不可過多時珍曰續隨子大戟澤漆甘遂莖葉相似主癰亦相似其功皆長於利水惟在用法亦皆要藥也附方新四小便不通一兩鉛丹半兩同炒蜜搗作團瓶盛埋陰處臘月至春末取出研蜜九梧子大每服二三十丸水通陽水腫每服以白湯送下五十丸以去陳莖摘玄方延積散續隨子三十枚膩粉二錢青黛炒一錢研子也斗門方後以取下積聚惡物為效聖濟錄方蛇咬腫欲死用重臺六分續隨子仁七粒搗篩為散酒服方

葉及莖中白汁主治新入面皮去野蠶明搗葉傳嗽聲立止時珍

葉一枚燒熟去皮核同嚼冷茶送下聖濟錄方蛇咬腫欲死用重臺六分續隨子仁七粒搗篩為散酒服方後以取下積聚惡物為效

葉及莖中白汁主治新入面皮去野蠶明搗葉傳嗽聲立止時珍

葉及莖中白汁主治新入面皮去野蠶明搗葉傳嗽聲立止時珍

葉及莖中白汁主治新入面皮去野蠶明搗葉傳嗽聲立止時珍

莨菪

音浪湯

本經下品藥名天仙子圖經行唐時珍曰莨菪一作蘭菪其子服

之令入狂狼救宥故名莨菪

集解錄曰莨菪子生海濱川谷及雍州五月米子弘景曰

之葉似松葉莖葉有細毛花白色子最作圓狀結實扁細若粟米大青黃色六月七月采子日乾頭

地黃王不留行紅藍等而謂如三指四月開花紫色莖莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中子至細青白色如粟米粒

之葉似松葉莖葉有細毛花白色子最作圓狀結實扁細若粟米大青黃色六月七月采子日乾頭

地黃王不留行紅藍等而謂如三指四月開花紫色莖莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中子至細青白色如粟米粒

曰凡使勿用蒼蠶子其形相似只是微赤服之無効時人多以雜之時珍曰仲景金匱要略言蜜中有水黃若葉而先有毒誤食令人狂亂狀如中風或吐血以甘草汁解之

子修治

牛乳汁浸一宿至明日乳汁盡即是真者乾搗篩用氣味苦寒無毒明曰溫有毒服之熱發以綠豆汁甘草汁麻犀角並解

之酸曰有大毒誤服之衝人心大煩悶眼生星火頭曰不經言性更後人多云大熱而史記淳子意傳云昔有滑川王美人懷子不乳飲以浪藥一撮以酒飲旋乳且不乳豈藥所治又古方主卒顛狂亦多單用良藥性果寒耶

拘急及服輕身使人健行走及奔馬強意益力通神見鬼多食令人狂走經療癩狂風癩顛倒拘攣安心定志聰明耳目除邪逐風變

白主瘰癧取子洗晒隔日空腹水下一指捻亦可小便澀令滋養暴乾上服勿令子破破則令人發狂藏器炒焦研末治下部脫肛止冷

痢主蛀牙痛之蟲出燒熨蟲牙及洗陰汗大明曰在景曰入瘰癧狂方用然不可過刺久服自無瘰癧通神健行足為大益而仙經不

丸服去一切冷氣積年氣弱甚溫暖也不可生服傷人見鬼於鍼狂風癩瘡曰其若之功未見如所說而其毒有甚焉煮一二日而芽方

生其為物可知矣良藥當防其毒而能令人狂惑見鬼者皆人未有發其毒者蓋此類皆有毒能使痰迷心竅蔽其神明以亂其

視聽故耳唐安祿山誘契丹飲以良酒醉而坑之又嘉靖四十四年二月陝西游僧武如曹挾杖術至昌黎縣氏張社家見其妻是

飯間呼其全家同坐將紅散入飯內食之少頃舉家皆迷任其打罵復將魔法火入柱耳中柱發狂惑見鬼家皆是故鬼黨行殺凡一

十六人並無血跡官司執柱囚之十餘日柱吐痰二碗許問其故乃知所殺者皆其父學兄懷異子姊妹也柱與如附方舊二新卒發顛

香皆給死世宗肅皇帝命榜天下觀此坎藥亦是其若之類耳方其迷惑之時視人皆鬼矣解之之法可不知乎附方舊二十卒發顛

王莧若三升為末以酒一升漬數日絞去滓煎令可凡如小豆三九日三服當見由急頭中風澤膠脂兩五靈脂一兩為末糊九梧子大

牙如有蟲行額及手足有赤豆處如此並是瘰癧也未知再服取肅神良陳述之小品方風澤膠脂兩五靈脂一兩為末糊九梧子大

以螺青為末每服十九男子薑酒久嗽不止有濃血黃若子五錢淘去浮者煮令芽出炒勿真酥一雞子大大秦七枚同煎令酥盡

酒下女子羌花湯下聖藥錄久嗽不止有濃血黃若子五錢淘去浮者煮令芽出炒勿真酥一雞子大大秦七枚同煎令酥盡

甲嗽至三十年者莧若子不香藥等分為末以羊脂冷塗方見獸部積冷瘰癧者大棗四十九個水三升煮乾只取棗去

紙上撒末於上棗作筒燒烟熏之棗行功單藥方水腫通服

草部

曰雲實生河間川谷十月采果乾善曰莖高四五尺大葉中空葉如麻兩兩相對六月花八月九月實十月采其莖處處有之子細如
莖應子而小黑其實亦類莖葉燒之致鬼未見其法術卷曰雲實大如黍及麻子黃黑似豆故名大豆莖生澤旁高五六尺葉如細槐亦
如首霜枝間微刺俗謂為草雲母陶云似葶藶者非也保昇曰所在平澤有之葉似細槐花黃白色其莢如豆其實青莖色大如麻子
五月六月采實爾曰葉如槐而狹長枝上有刺苗名具草又名羊石子草實名馬豆三月四月采的十月采實過時即枯落也時珍曰此
草山原甚多俗名枯刺亦莖中空有刺高者如蔓其葉如槐三月間黃花紫然滿枝莢長三寸許
狀如肥皂莢內有子五六粒正如鵲豆兩頭微大有黃黑斑紋厚殼白仁咬之極堅重有腥氣

實修治數日凡采得粗搗相對洋澤**氣味**辛溫無毒別錄曰苦善曰神農本草經黃帝岐雷公若**主治**泄痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱

湯別錄治瘧多角蘇頌曰**主**羸瘦血虧時珍方**一**蠱下不止雲實女萎各一兩桂半兩川烏頭二兩為末蜜丸梧子大每服五丸水下日三服**肘后方**

花主治鬼精多食令人狂走久服輕身通神明本經**殺精物下水燒之致鬼**別錄發明時珍曰雲實花能令人見鬼發狂豈有久服輕身之理此古書之訛

根主治骨哽及咽喉痛研汁嚥之時珍

蓖麻梵音畢畢**頌曰**葉似大麻子形如牛蟬故名時珍曰**集解**案曰此人間所種者葉似大麻葉而其大結子如牛蟬今胡中傳來
唐本草象龜亦作蠟蠟牛虱也其子有麻**名**蓖麻解者赤高文餘子大如皂莢核用之亦良保昇曰今在處處有之夏生
苗葉似葶藶而大厚莖亦有節如甘蔗高文餘秋生細花隨後結實殼上有刺狀類巴豆青黃斑褐夏采莖葉秋采實冬采根日乾用時
珍曰其莖亦有白中空其葉大如鈴葉葉凡五尖夏秋間極裏抽出花穗莖葉黃色每枝結實數十顆上有刺攢簇如蠅毛而軟凡
三四子合成一顆枯時劈開狀如已豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛蟬再去

斑殼中有仁嬌白如續隨子仁有油可作印色及油紙子無刺者良子有刺者毒

子修治**凡**使勿用黑天赤利子緣在地莖上是穎而頭尖有毒其莖麻子節節有黃黑斑凡使以鹽湯煮半日去皮取子研用
小時珍曰取蓖麻油法用蓖麻仁五升搗爛以水一斗煮之有沫撇起待沫盡乃止去水以沫煎至點燈不炸滴水不散為度

味辛平有小毒時珍曰凡服蓖麻者一生不得食炒**主**治癰瘡以水研三十枚服之吐惡沫加至三十枚三服癰瘡則止主風虛

豆犯之必脹死其油能伏丹砂粉霜

數枚有效
宗
主偏風不遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾舌脹喉痺喘脚氣身腫丹瘤湯火傷鍼刺入肉女人胎衣不下子湯淫去

其性善走能開通諸竅經絡故能治偏風失音口噤目喎斜頭風七竅諸病不止於此出有形之物而已蓋鵝鵝油能引藥氣入內滲麻油能拔病氣出外故諸病多用之一人病偏風手足不舉時珍曰由同羊脂麝香棗核甲子等藥煎作餅厚半寸貼之

下即不能食或點紅肉即下血
附方 舊九新 半身不遂
失音不語取蓖麻子油一升酒一斗銅鍋盛油
落其中一日煮之令乾田鼠之
目高斗 蓖麻子仁搗膏左貼右

方用蓖麻油紙剪花貼太陽亦勅又方蓖麻仁半兩米已三十重貳九米蓖麻子剛子各四十九粒去殼去殼腦腦片一大塊搗搗泥泥糊糊丸梧子梧子大線穿十五枚烏金衣上春風入量中不清麻仁二

五重風圓 不問年月遠近用蓖麻子仁二兩黃連一兩石膏水一碗文武火煮之生筋散貼之本龍子六箇去殼蓖麻子六十粒去殼研細入麝香末二錢入酒三盞之一日一易三十日可聞香氣也 聖濟錄 天木曾怪柱骨倒乃體虛所致宜

用此法而愈
急候重裏
牙關緊急不通用此即破以蓖麻子仁研爛蠟卷作
索口二重杜社方用蓖麻子仁一枚朴硝一錢同所及
仁未退再熏以愈為度有人舌腫出口外一村

然厚良方
小口瓶內燒煙熏吸却便或只取油作擦尤妙名聖煙筒
喉中瘡月水服之連進二三服效○三因方用蓖麻仁煎

芥穗等分為末蜜
丸綿包噙嚥之

水氣脹滿黃麻子仁水解得三合清豆一頓服盡日中當下青黃水也或云壯人止可服五粒外臺秘要

腳氣作痛黃麻子七粒去殼研爛同蘇合香丸貼足心痛即止也外臺秘要

小便不通麻

仁三粒研細入紙中
入莖中即通

枳內插
 勾當
 咳嗽
 肝子去殼炒熟甜者食之須多服
 見效終身不可食砂豆
 衛生易簡方
 雀巢
 包元亮海上集驗方取鴉麻子七粒去殼研膏塗
 心若胎及衣下便速去不爾則手腸土即以此

膏塗頂則腸自入也○肘后方云產難取芫麻子仁十四粒每手各把七粒須臾立見下也

子宮脫下
 黃麝子仁枯礬等分為末要紙上托入
 范麻子仁十四枚研膏塗頂心即入
 仍以
 盤腸生產
 同上
 催生下胎
 不拘

死胎菟麻二個巴豆二個麝香一分研貼臍中
足心又下生胎一月一粒溫酒吞下 集簡方

并
一乃毒重痛不可忍范麻子仁搗
月傳即止也射后方
腐爛重
麻子一兩去皮黃連一兩對豆大以小瓶
手拍曲節間痛不可忍漸至斷落用范

子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後取

麻子一枚劈破面東以浸藥水吞之漸加至四五枚若有
試之如不發是功也若發動再服直候不發乃止
杜壬
小兒丹
入麪一匙水調塗之
黃麻子五個去皮研

其知
真秘旨

瘰癧豆膏 凡瘰癧用白膠香一兩瓦器密化去滓以蓖麻子六十四個去殼研

緋帛量

滄大小攤貼一膏可市虱白倉一起白屑或微有赤瘡用蓖麻子仁四十粒白果膠囊各
 一五粒公三錢已一團為丸凡白屑之疾膏下王蓖麻子仁壹陸僧硫黃各一

之摘

髮黃不黑
蓖麻子一百箇去殼與大棗十五枚爛入乳小兒乳汁和丸作餅每以髮黃不黑
蓖麻子仁香油煎焦去滓湯火炒之

寫龍麻

子仁粉等分研膏湯傷以油或入人
范麻子去殼一个先以帛襯傷處傳之頻看若見刺出即拔
木骨車范麻子仁一兩

今謂火
勾每以

以水調塗之。○古銅駝。金車。一。去。心。腎。驚。悸。出。於。肉。或。加。白。檀。肉。豆。研。尤。妙。
一。拾。雪。舌。根。嚙。之。自。然。不。見。又。方。蓖。麻。油。佳。白。芩。一。兩。芩。麻。子。仁。研。爛。入。百。藥。煎。研。九。三。犬。大。湯。芩。麻。子。五。十。粒。去。殼。以。丹。花。水。

紅雙等膏袖

分研細沙糖丸皇子大綿裹含照痰出大良藥厚口彈子大井花水化下半丸即下果二日膏先以溫水洗咬痛處乃貼

珍方

有臺一
 風重下
 二安島
 受之
 三三
 旁口消
 之由
 金方
 元寸
 貢二
 三三
 臺二
 金餘
 台及
 帝多
 欽時
 方所
 均為
 足稅
 收

卷五

鼻部

附錄博落通 拾遺載曰有大毒土惡瘡癰疽贅癰肉白癰風雷黃枯癰溪癰瘡癰和百文青難桑皮等分爲末傅之惡毒精鬼當別有法生江南山谷莖葉如芭蕉莖中空吹之作聲如弄絲因名之百文青

今集

雷公老人久病力乏之時參用常山蜀漆酒不遠千里一

傷大瘧有六經五臟瘧瘧食積瘧瘧危邪諸瘧須分陰陽虛實不可一概論也常山蜀漆生用則上行必吐酒蒸炒熟用則氣稍緩少用亦不致吐也得甘草則吐得大黃則利得烏梅酸棗則入肝得小麥竹葉則入心得糯米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得芫果枳櫟則入脾蓋無疫不作瘧二物之功亦在驅逐痰水而已楊士瀛直指方云常山治瘧人皆薄之瘧家多畜痰涎黃水或停滯心下或結滯腸間乃生寒熱法當吐痰逐水常山豈容不用水在上焦則常山能吐之水在腸下則常山能破其脾而下其水須行血藥品佐助之必收十全之功其有純陽發瘧或溫熱內實之證投以常山大便點滴而下似泄不泄者復用北黃為佐泄利數行然後復愈也又待制李憲云嶺南瘧氣寒熱所感邪氣多在營衛皮肉之間欲去皮膚毛孔中瘧根本非常山不可但性吐人惟以七寶散冷服之即不吐也

附方 舊三新
截瘧諸湯 外臺秘要用常山三兩漿水三升浸一宿煎取一升欲發前服取吐○時后方用常山一兩糯米一百粒水大升煮三升分三服先夜未發時發時服盡○養生主論王隱者驅瘧湯云用此四十年奇效不能盡述切勿加減萬一無吐者常山酒煮晒乾知母貝母芫果各一錢半水一鍾半煎半熟五更熱服渣以酒浸發前服

截瘧諸酒 肘后方用常山一兩酒一升漬二三日分作三服平旦一服少頃再發如神
截瘧諸散 千金方恒山丸治數年不瘧者兩劑瘧一月以來者一劑瘧恒山三兩研末雞子白和九梧子大九梧子煮殺腥氣則取神乾收之每服二十丸竹葉湯下五更一服天明一服發前一服或吐或否即止○肘后方砂九恒山搗末三兩真丹一兩

研白蜜和杵百下九梧子大先發時三九少頃再服三九臨時服三九酒下無不瘧者○曾世榮治幼心書黃丹九治大小久瘧恒山二兩黃丹半兩烏梅連核九焙一兩為末糯米粉糊丸梧子大每服三五十丸涼酒下隔一夜一服平旦一服午後方食○葛洪肘后方用恒山三兩知母一兩甘草半兩搗末蜜丸梧子大先發時服十丸次服七丸後服五六丸以瘧為度○和劑局方膽仰丸治一切瘧常山四兩炒存性草果二兩炒存性為末薄糊丸梧子大每服十丸時冷酒服五十九五更再服忌食熱物○又勝金丸治一切瘧胸膈停痰發不愈者常山八兩酒浸蒸焙候榔二兩生研末糊丸梧子大如上述法服○集簡方二聖丸治諸瘧不拘遠近大小用

雞骨恒山雞心檳榔各一兩生研細經甲煨焦一兩半為末糯米粉糊丸菜豆大黃丹為衣每服三五丸如上述法服

厥陰肝瘧 寒多熱少狀或小腹滿小便如腰不問久近不泄如神恒山一兩醋浸一夜

瓦器煮乾每用二錢水一盞煎半盞五更冷服之 趙真人濟急方

太陰肺瘧 瘧聚胸中病至今人心寒寒甚為熱熱間善驚如有所發日早分三次

服千金方 少陰腎瘧 淫濕寒手足寒腰脊痛大便難目眊眊然恒山二錢半乾半兩烏梅

一錢竹葉一錢半葱白三根水一升半煎一升發前分三服 千金方 疔瘧瘧 瘧不熱者蜀漆散用蜀漆雪母

服千金方 疔瘧瘧 瘧不熱者蜀漆散用蜀漆雪母

別錄曰：吾微宦，善曰：神農雷公辛有毒，岐伯賦有毒，李時珍曰：畏毒之才曰黃連，為之使反細辛，芍藥人參沙參紫參丹參苦參惡大黃，時珍曰：畏

本經
瘵咳逆喉痺不通鼻息肉馬刀爛瘡不入湯用別錄

藥宗卷之四
名曰嘔別本云治噦逆甚効時珍曰噦逆用吐藥亦

反胃吐法去痰積之義吐藥不一常山吐瘧瘵瓜吐熱痰烏附吐濕痰萊菔子吐氣痰藜蘆則吐風痰也樓張子 and 儒門事親云一婦病風癰自六七十年得驚風後每二一年一作至五七年五作三十歲至四十歲則日作或甚至一日十餘作遂膏肓健忘求死而

已值歲大飢，采百草食於野中。見草若蔥狀，采歸蒸熟，飽食之。至忽覺心中不安，吐涎如膠，連日不止。約一二斗汗出如洗，甚膏困。三日後，遂輕健，病去食進。百脈皆和，以所食烹，訪人乃蔥薤苗也。即本草薤蘆是矣。圖經云：能吐風病，此亦偶得吐法耳。我朝荆和王妃劉氏。

年七十病不省人事牙關緊閉群醫束手先考太醫吏目月池翁診視藥不能入自午至子不付方舊六新獲已打去一齒濃煎藜蘆湯灌之少頃噓氣一聲遂吐痰而甦調理而安藥弗眩厥疾弗瘳誠然作方十三諸風痰飲藜蘆一分金一分為末

每以一字湯漿水一匙
和服探吐 經驗方

中風不省 牙關緊閉者藜蘆兩去苗頭煎防風湯浴過焙乾切微褐色為末
每服半錢小兒減半溫水調灌以吐風涎為效未吐再服 簡要濟眾

中風不語 唯中如受銀口
涎沫取藜蘆一分

天向星一個去浮皮於臍上剝一坑納入陳醋二錢斗四面火逼者風頭痛并治紫唇一並卓砂末入麝香少許以鼻吸黃色研為末生麪丸小豆大每服三九溫酒下之甚効經驗方

欲吐不吐勢危者半匙
蘆朮調下探吐 保命集
痰毒瘡 藜蘆生炙各一兩巴豆二十五枚熬黃研末蜜丸小豆大每
黃痘腫疾 錢氏小吐不過數服效

身面黑痣 聖膏以針微刺破點之不過三次効
聖惠 中風肉三分

牙痛
三上消勿點兩畔○聖惠方
牙痛
吞汁神效
千金翼
白虎瘡
塗之
肘后方
豆生蠅虫
之
直指巨犀屑
頭按之緊包二

反按惡瘡 傳每日三五上 聖濟錄 疔瘡 瘡 油和塗 疔瘡 疔之虫自出也 陶隱居方 護石外 為末水

草部

七

服一錢必吐出

德生堂方

附錄山慈石

別錄有石末川曰苦平無毒主女子帶下生

參果根

入曰苦有毒主崩漏生百餘根根有灰裏並三月三日

賜根

宋圖經領曰苦辛寒有毒主瘰癧風葉瘡疥

木黎蘆

格錄

底驢

陶弘景注漏蘆云一名底驢山南人用苗北人用根按底驢乃木黎蘆非漏蘆也乃樹

月開細黃花五月結
小長子如小豆大

氣味苦辛溫有毒治疥癬殺蟲

附子

本經

下品釋名曰烏頭

別錄曰初種為烏頭象鳥之頭也附烏而生者為附子如子附母也烏頭如芋魁附子如芋子蓋一物也

正集解

別錄曰附子生魏為山谷及廣漢冬月采為附子春月采為烏頭弘景曰烏頭與附子同根附子八月采八角者良烏頭四月采

寸側子即附子邊角之大者並是同根而本經附子出魏為天雄出少室烏頭出朗陵分生三處當各有所宜也今則無別矣恭曰天雄

而實附子大而短有角平穩而實烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名為虎掌並是天雄一裔子母之類氣力乃有

珠等即宿根與嫩者耳戰曰烏頭少有並苗身長而烏黑少有旁尖烏頭皮上蒼色有尖頭大者孕八九個周圍底陷黑如烏鐵天雄身

全矮無尖周匝四面有附子孕十一個皮蒼色側子只是附子旁有小顆如棗核者不籠子是喙附烏雄側中毗連者不入藥用保昇曰

正者為烏頭兩歧者為烏喙細長三四寸者為天雄根旁如羊散生者為附子旁連生者側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍

為烏頭博物志言附子烏頭天雄一物也春秋冬夏采之各異而廣志云要毒附子也一歲為側子二年為烏喙三年為附子四年為烏

川烏頭是也春末生子故曰春米為烏頭頭生子已成故曰冬米為附子其天雄烏頭側子皆是生子多者因象命名若生子少及獨頭者即無此數物也其產江左山南等處者乃本經所列烏頭今人謂之草烏頭者是也故曰其汁煎為射箭藥景不知烏頭有二以附子之烏頭注射箭之烏頭遂致諸家疑貳而當觀之說尤不近理宋人楊天惠著附子記甚悉今撮其要讀之可不辨而明矣其說云綿州乃故廣漢地領縣八惟彰明出附子彰明領鄉二十惟赤水廬水昌明會昌四鄉產附子而赤水為多每歲以上田熟耕作壅取種於龍安龍州齊歸木門青趙小坪諸處十一月下種春月生苗其莖類野艾而澤其葉類地麻而厚其花紫瓣黃難長莖而圓七月采者謂之旱水春縮而小蓋未長成也九月采者乃佳其品凡七本同而未異其初種之小者為烏頭附烏頭而旁生者為附子又左右附而偶生者為高子附而長者為天雄附而老者為天雄附而上出者為側子附而散生者為漏藍子皆脈絡連貫如子附母而附子以貴故專附名也凡種一而子六七以上則皆小種一而子二三則稍大種一而子持生則特大附子之形以蹲坐正節角少者為上有節多氣乳者火之形不正而偏缺風號者為下本草言附子八角者良其角為側子之說甚謬矣附子之色以花白者為上鐵色者次之青綠者為下天雄烏頭天雄皆以豐實盈盛者為勝漏藍側子則固人以乞伏夫不足數也謹按此記所載漏藍即當數所謂木鼈子大明所謂虎掌者也其高子即烏喙也天雄即天雄也陰昇曰附子烏頭天雄側子烏喙皆得生熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裹之數易便之類醫方亦無此名功用當相同爾

不乾乾又法以米泔及糟麴等淹之並不及前法頃曰五物收時一處造醃其法先於六月內造大小麴麴未米前半月用大來煮成粥以麴造醃候熟去糟其醋不用太酸酸則以水解之將附子去根鬚於新甕內淹七日日攪一遍撈出以珠篩攤之令生白灰乃向慢風日中晒之百十日以透乾為度若猛日則皺而皮不附肉時珍曰按附子記云此物最多不能常熟或種麥而苗不茂或苗秀而根不充或已醃而腐或已曝而燥若有神物陰為之者故園人常備於神日為藥取其醃法用醋醃安室中淹覆彌月乃發出服乾方出醃時其大有如拳者已定輒不盈握故及一兩者極難得土人云但得半兩以上者皆良蜀人領者少惟秦隴閬中人宜之然秦人纔市其下者閬漸纔得其中者其上品則皆貴人得之矣○弘景曰凡用附子烏頭天雄皆熟火微炮令折勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子須甘草人參生薑相配者制其毒故也穀曰凡使烏頭宜文武火中炮令皺折聲破用若用附子須底平有九角如鐵色一個重一兩者即是氣全勿用雜木火以柳木灰火中炮令皺折以刀刮去上孕子并去底火壁破於屋下干地上掘一土坑安之一宿取出焙乾用若陰制者生去皮底底薄切以東流水并黑豆浸五日夜流出日中晒用蜜膏曰凡用烏頭及天雄須用童子小便浸透煮過以殺其毒并助下行之力入鹽少許先好或以小便浸二七日揀去壞者以竹刀每個切作四片并水淘淨逐日換水再浸七日晒乾用時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用者須知陰制之法去皮脂入藥熟用者以水浸過炮令發拆去皮脂乘熱切片再炒令內外俱黃去火毒入藥入法每一個月甘

草二錢鹽水薑汁壹原各半薑同煮熟出火毒一夜用之則毒去也

氣味辛溫有大毒

別錄曰甘大熱苦已神農辛岐伯雷公甘有毒李當之苦大溫有大毒元素曰大辛大熱氣厚味薄

可升可降陽中之陰乎中既無所不至為諸經引用之藥好古曰入手少陰三焦命門之劑其性走而不守非若乾薑正而不行趙嗣真曰熟附麻黃發中有補仲景麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯是也生附配乾薑補中有發仲景乾薑附子湯通脉四逆湯是也載原禮曰附子無乾薑不熱得甘草則性緩行桂則補命門李壽曰附子得生薑則能發散以熱攻熱又尊虛熱下行以除冷病之才曰地膽為之使惡蜈蚣要防風黑豆甘草人參黃耆附子曰畏綠豆烏雞黃連犀角足豉汁得蜀椒食鹽則下達命門

欬逆邪氣寒濕踴躍拘攣膝痛不能行步破癥敗積聚血癥金瘡

肌骨又墮胎為百藥

溫脾胃降脾濕腎寒補下焦之陽虛

李督脉為病脊強而厥

治三陰傷寒陰毒陰疰中寒中風痰厥氣厥柔痙癰小兒慢驚風濕麻痺腫滿脚氣頭風腎厥頭暈暴瀉脫

陽久痢脾泄寒瘧瘴氣久病嘔噦反胃噎膈癰疽不飲久漏冷瘡合意湯寒耳治

烏頭

治諸風風痺血痺半身不遂降寒冷溫養臟腑去心下堅痞感寒腹痛

不足肝風虛

助陽退陰功同附子而稍緩

若足寒症即用附子風疾即用川烏頭一云凡人中風不可先用風藥及烏附若先用氣藥後用烏附乃宜也又凡用烏附藥並宜冷服

者熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽上浮治之以寒則陰盛甚而病增治之以熱則邪格而不納熱藥冷飲下咽之後冷體既消熱性便發

而病氣隨愈不違其情而致大益此反治之妙也昔張仲景治寒濕內結用蜜煎烏頭近効方治喉痺用蜜炙附子含之嚥汁朱丹溪治

病氣用烏頭枕子並熱固寒用也李東垣治濕輸林淫陰盛格陽傷寒面目赤煩渴引飲脉來七八至但按之則散用薑附湯加人參投

半斤服之得汗而愈此則神聖之妙也

痲痺用細辛則傳青囊者忌煩用之有退陰回陽之力起死回生之功近世陰證傷寒往往疑似不敢用附子直待陰極陽竭而用之

已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰陽氣衰必須急用人參健壯以並其原佐以附子溫經散寒捨此不用將何以救之劉完素曰俗方治痲痺多用烏附其氣暴能衝開道路氣血蘇及藥氣盡而正氣行則痲愈矣張元素曰附子以白木為佐乃降寒濕之聖藥屬藥宜少

加之引經又並火之原以濟陰則便弱有節焉附見也處指曰附子藥壯之質有新則奪將之氣能引補氣藥行十二經以通氣
失之元陽引補血藥入血分以滋養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表之風寒引溫燥藥下焦以祛除在裏之冷濕實事口

氣虛熱者宜少用附子以行氣虛人多濕亦宜少加烏附行經伸景人味丸用為少陰嚮導後世因以附子為補藥誤矣附子走而不
守取其健悍走下之性以行地黃之濡能致遠耳烏頭天雄皆氣壯形悍可為下部藥之佐無人表其害人之禍相習用為治風之藥及

補藥殺人多矣至履曰伸景八味丸兼陰火不足者錢仲陽六味地黃丸為陰虛者設附子乃補陽之藥非為行滯也舒曰烏附非
身涼而四肢厥者不可僭用服附子以補火必妨瀉水時珍曰烏附毒藥非危病不可用而補藥中少加引導其捷有人燒服錢已即發

燥不堪而首人補劑用為常藥豈古今運氣不同耶 別府都昌王體瘦而冷無他病日以附子煎湯飲兼嚼硫黃如此數載新州街張
百戶平生服鹿茸附子藥至八十餘康健倍常字張翼聲說載趙知府耽酒色每日煎乾薑附湯吞硫黃金液丹百粒乃能健啖否則

僕弱不支壽至九十他人服一粒即為害若此數人皆其臟腑稟賦之偏服之有並無害 附方 卷二十六 少陰傷寒 初得二三日脈微細
不可以常理概論也又瑣碎錄言澤臺風上極寒民咬附子如咬羊栗此則地氣使然爾 附方 新八十七 少陰傷寒 但欲寐小便色白者

麻黃附子甘草湯微發其汗麻黃去節二兩甘草炙二兩附子炮去皮一枚水 少陰發熱 少陰病始得及發熱沉者麻黃附子細辛湯
七升先煮麻黃去沫納二味煮取三升分作三服取微汗 張仲景傷寒論 少陰發熱 發其汗麻黃去節二兩附子炮去皮一枚細辛

二兩水一斗先煮麻黃去沫乃納 少陰下利 少陰病下利清穀裏實外熱手足厥逆脈微欲絕身及不惡寒其人面赤色或煩者或乾嘔
二味同煮三升分三服 同上 少陰下利 或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯用大附子一個去皮生破八片甘草炙二兩乾薑三

兩水三升煮一升分溫再服其脉即出者愈面赤加葱九釐腹痛加芍藥 陰陽虛寒 傷寒已發汗不解及惡寒者虛也芍藥甘草附子湯
二兩嘔加生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脉不出加人參二兩 同上 陰陽虛寒 補之芍藥三兩甘草炙三兩附子炮去皮一枚水五

升煮取一升五 傷寒發熱 傷寒下後又發其汗晝夜煩躁不得眠夜不安靜不嘔不渴無表證脉沉微身熱大熱者乾
合分服 同上 傷寒發熱 傷寒附子湯濕之乾薑一兩生附子一枚去皮破作八片水三升煮取一升頓服 傷寒論 陰陽格陽 傷寒陰

其人必躁熱而不飲水脉沉手足厥逆者是此證也露靈靈用大附子一枚 熱病吐下 及下利身冷脉微發熱不止者附子炮一枚去皮
燒存性為末蜜水調服過數氣熱後熱氣上行而汗出乃愈 孫兆口訣 熱病吐下 臍分作八片入鹽一錢水一升煎半升溫服立效

經方 陰毒傷寒 孫兆口訣云房後受寒少腹痠痛頭眩重手足厥逆脉息沉細或作呃逆並宜退陰散用川烏頭乾薑等分切炒
良方 陰毒傷寒 為散每服一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服得汗解○本草方玉女散治陰毒心腹痛厥逆惡候用烏頭去皮破

冷水浸七日切細紙裹收之遇有患者取為末一錢入鹽八分水一盞煎八分服壓下陰毒如猪血相似以再進一服○濟生回陽散治陰
毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷一切冷氣大附子三枚炮裂去皮脂為末每服三錢薑汁半盞冷酒半盞調服良久脉下如火暖為度

○續傳信方治陰毒傷寒踰時過急者用半兩重附子一個生破作四片生薑一大塊作三片糯米一搥以水一升煎六合溫服暖卧或汗出或不出候心定則以水解之類解之不得與冷水和局更煎薄服之屢用多效也

中風痰厥 俗不知人

并體虛之人患瘧疾寒多者五生飲用生川烏頭生附子並去皮脂各半兩生薑兩生中風氣厥 痰壅昏不知人六脉沉伏生附子去皮生一兩生木香二錢五分每服五錢生薑十片水二盞煎取一盞溫服和劑局方

水二盞煎七分溫服之濟生方中風偏廢 羌活湯用生附子一個去皮脂羌活烏藥各一兩每服一盞生薑三片水一盞煎取七分服之王氏簡易方半身不遂 逐今藥法用附子一兩以無灰酒一升

病癰 手足腫曳口眼喎斜語音嘶啞步履不正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮脂五靈脂各五兩為末入龍腦麝香五分滴水為丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化服酒調服一日二服至五七丸使覺手搖移得步十丸可以振頭也梅師方風寒濕痺 麻木不仁或手足不遂生川烏頭末每以香白米煮粥一碗入末四錢慢煮得粥下薑汁一匙蜜三大匙空服嚼之或入薑汁末二錢左傳云風淫末疾謂四末也脾主四肢風淫客肝則促脾而四肢病也此方極有力子每授人良驗許學士平事方體虛

有風 外受寒濕身如在空中生附子生天南星各二錢生薑十片水一盞半慢火煎服予曾病此醫傳張子發授此方二服愈本事方口眼喎斜 取湯吐涎立初無此名通關散 篋中秘寶方

瘡 卒忤停尸並用附子末入喉中瘡 千金翼產後中風 身如角弓反張口噤不語川烏頭五兩到理黑大豆半升同炒半黑以酒三升傾鑊內急攪以續攪取酒微溫服一小盞取汗若口不開物開灌之末切加烏雞一隻炒細酒中服以瘡為度小品

諸風血風 烏荊丸治諸風縱緩言語蹇澀偏身麻痺皮膚瘙癢及婦人血風頭痛目眩腸風藏毒下血不止者服之尤効有痛風擊搏腫痛不收者服六七服即瘳也川烏頭炮去皮脂一兩荊芥穗二兩為末醋炒糊丸梧子大溫酒或熟水每服二十九和劑方

婦人血風 虛冷月候不勻或手腳心煩熱或面浮腫頭麻用川烏頭一斤清油四兩鹽四兩罐內同熬令裂如桑葉色為度去皮脂五靈脂四兩為末樣勻蒸餅丸如梧子大空心溫酒或湯下二十九亦治丈夫風疾梅師諸風痛疾 生川烏

二錢半五靈脂半兩為末猪心血和丸梧子大每薑湯化服一丸小兒驚風 梧子大連川烏頭生薑一兩全蠍十個去

薑汁調攤貼天柱骨內小兒驚風 尾全作三服水一盞薑三片煎服湯氏學後實德小兒驚風 乃肝腎虛風邪襲入用附子

脈瀉青丸 全切心鑑小兒驚風 為末葱根搗和作餅貼心處全切心鑑麻痺疼痛 仙桃丸治手足麻痺及癰疽疔瘡腫痛或打

四兩威靈仙五兩流端為末酒糊丸梧子大每服七丸風痺肢痛 營衛不行川烏頭炮去皮以大豆同炒至汗出為度去豆焙乾全蠍

至十九鹽湯下忌食此藥常服其効如神普濟方風痺肢痛 牛錢焙為末醋煎熟稠丸綠豆大每溫酒下七九日一服聖惠方月

脚冷痺

痲痛有風川烏頭三個生去皮脂為散
醋調塗帛上貼之須臾痛止 聖惠方

大風諸痺

痲痺脹滿大附子半兩者二枚炮折酒漬之春冬
五日夏秋三日每服一合以瘰為度 聖惠方

脚氣腿腫

久不瘳者黑附子
一個生去皮脂為

散生薑汁調如膏塗之藥乾再
塗之以腫消為度 簡要濟眾

十指疼痛

麻木不仁生附子去皮脂木香各等分
生薑五片水煎溫服 王氏簡易方

搜風順氣

烏附丸用川烏頭二十個香附子半斤薑汁
淹一宿焙炒為末酒糊九梧子大每溫酒下

十九肌體肥壯有風疾
者宜常服之 濟眾方

頭風頭痛

外臺秘要用臘月烏頭一升炒令黃末之以絹袋盛浸三斗酒中逐日溫服○孫兆口訣用附子炮石
膏煨等分為末入腦麝少許每服半錢茶酒任下○修真秘旨用附子一枚生去皮脂綠豆一合同入

鉗子內煮豆熟為度去附子食綠豆
立瘳每個可煮五次後為末服之

風毒頭痛

聖惠方治風毒攻注頭目痛不可忍大附子一枚泡去皮為末以生薑一兩大黑豆一
合炒熱同酒一盞薑七分調附末一錢溫酒服又方治二三十年頭風不愈用大川烏

頭生去皮四兩天南星炮一兩為末每服二錢細茶三錢海荷七葉蔓梅一個水一盞煎七分臨卧溫服
○宋氏集驗方治頭痛連睛者生烏頭一錢白芷四錢為末茶服一字仍以末噴鼻有人用之甚得効

風寒頭痛

十便良方治風寒客
於頭中清涕項筋急

硬胸中寒痰嘔吐清水用大附子或大川烏頭二枚去皮蒸過川芎生薑各一兩焙研以茶湯調服一錢或剉片每用五錢水煎服隔三
四日一服或加防風一兩○三因方必効散治風寒流注偏正頭痛年久不愈最有神効用大附子一個生切四片以薑汁一盞浸炙再

浸再炙汁盡乃止高良薑等分為末
每服一錢臘茶清調下忌熱物少時

頭風摩散

沐頭中風多汗惡風當先風一日則痛甚用大附子一個炮令溫等分為末
以方寸七摩顙上令藥力行或以油調稀亦可一日三上 張仲景方

南星等分為末蔥汁
調塗太陽穴 經驗

頭風斧劈

難忍川烏頭末燒烟熏碗
內溫茶泡服之 集簡方

個炮熟去皮生薑半兩水一升半煎分三服○經驗良方並根丸治元陽虛頭痛和破眼睛如錐刺大
川烏頭去皮微炮全蠍以糯米炒過去米等分為末並根汁丸綠豆大每薄荷茶下十五丸一日一服

氣虛頭痛

氣虛上壅偏正頭痛不
可忍者大附子一枚去

皮臍研末蔥汁麴糊丸綠豆大每服十九茶清下○僧繼洪濟寧方蠍附丸云氣虛頭痛惟此方最合造化之妙附子助陽扶虛鍾乳補
陽鎮墜全蠍取其鎮重蔥涎取其通氣湯使用椒以遠下蠶以引用使虛氣下歸對證用之無不收効大附子一枚剉心入全蠍去毒三

腎氣上攻

頭項不能轉移椒附丸用大熟附子一枚為末每用二錢以椒二
枚在內以餘附末同鋪乳粉二錢半白麴少許水和作劑包

附煨熟去皮研末葱涎和九梧子大每椒鹽湯下五十九
點服椒氣下達以引

耳鳴不止

無晝夜者烏頭燒作灰菖蒲等分為末
綿裹塞之日再用取効 楊氏產乳

逆氣歸經 本事方

鼻淵腦泥

生附子末葱涎和如
泥齋涌泉穴 普濟

耳聾龍腦

或更於上灸二七壯

本草綱目
卷之六

本草
拾遺
聾耳膿血

生附子為末葱涕和灌耳中 附后

喉痺腫塞

附子去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜入舍之勿
噉汁已成者即膿出未成者即消出本草拾遺

久患口瘡

生附子為末醋麪調貼足心
男左女右日再換 經驗方

風蟲牙痛

普濟方用附子一兩燒灰研麝一分為末摺之又方川魚頭川附子生石
麪糊丸小豆大每綿包一丸咬之○刪繁方用炮附子末納孔中乃止

眼暴赤腫

破痛不得開淚出不止前阨子夷腹未如
蠶砂大着背中以定為度 張文仲備急

方一切冷

去風痰定喘身疼痛益元氣強力固精並體令人少病川芎頭一斤用客五升大甕鉢子盛以童子小便浸七日逐日添令益出揀去壞者不用餘以竹刀切作四片新汲水淘七次乃浸之日日換水日足取焙乾末酒煮麴糊丸綠豆大每服十丸

空心鹽湯下少粥
飯壓之 經驗方

升降諸氣

晚則宣流熟附子一大個分作二服水二
盞煎一盞入沉香汁溫服 和劑局方

中寒腎困

量附湯治體虛中寒腎不知人及臍腹冷痛霍亂轉筋
一切虛寒之病生附子一兩去皮臍乾薑炮一兩每服

三錢水二鍾煎一鍾
溫服和劑局方

心腹冷痛

冷熱氣不和
五九生薑湯

山梔子川烏頭等分生研為末酒糊丸梧子大每服十
 下小腸氣痛加炒茴香葱酒下二十九 王氏博濟方 心痛氣
 濕熱困寒鬱而發用梔子
 降濕熱烏頭破寒鬱烏頭

為梔子所引其性急速不留胃中也川烏頭山梔子
各一錢為末順流水入薑汁一匙調下 丹溪纂要

寒厥心痛

及小腸膀胱痛不可止者神砂一粒丹用熟附子去皮礬金橘紅各一兩為末醋麴糊丸如酸棗大米砂為衣每服一丸男酒下女醋湯下

宣寒

肚腹
 痛

脫手足厥冷自汗出脈弦而緊用大烏頭煎主之
 大烏頭五枚去脂水三升煮取一升去
 蜜二升煎令水氣盡強人服七合弱人服五合
 不瘥明日更服
 張仲景金匱玉函

寒疝身痛

腹痛手足逆冷不
仁或身痛不能眠

用烏頭桂枝湯主之烏頭一味以蜜二升煎減半入桂枝湯五合解之得一升初寒云一為的心腹皆痛諸藥不効者大烏頭五枚去角

和丸悟

子大每服二

十九 寒山骨世 腹痛腸鳴自汗厥逆熱附子去皮臍玄胡索炒各一兩生

汗出厥

下永隆
逆天附子炒

炒去皮臍一枚山梔子炒焦四兩每用二錢水一盞酒半盞煎七分入鹽一於

溫服○

白明方治陰疝小腹腫痛如蒸梨子等分又虛者加桂枝等分薑糊為丸酒服五十丸
 九橘子大每服三十九空心溫酒服○夷堅志云時康祖大夫病心胃一漏數竅流汁已二十年又苦腰痛行則偃偉形神憔悴

悍醫不

此治通判韓子溫為愴重方得此方令服旬餘腹痛減久服遂瘕心渴亦瘳精力倍常步履輕捷此方本治腰而効乃如此耳
 通驗方用附子炮去皮薑為末以水二盞入藥二錢分點為常服同煎取一盞空心服去積令是下元易壯益氣固食無碍○每

內用盆合之一宿取出去砂土入青鹽四兩同炒赤黃色為

胃冷有痰脾弱嘔吐生附子半頁各二錢薑十片水二盞煎七分久冷反胃

經驗方用大附子一個生薑一兩剉細同煮研如麵糊每米飲化服一錢○衛生家寶方用薑汁打糊和附子末為丸大黃為衣每溫水

服十丸○斗門方用長大附子一個坐于磚上四面着火漸逼以生薑自然汁湔之依前再逼再約薑汁盡半碗乃上研末每服一錢

粟米飲下不過三服瘥以猪腰子切片炙熟蘸食○方便集用大附子一個切下頭子剉一錢安丁香四十九脾寒瘥疾濟生方云五輪

個在內仍合定線繫入砂鉢內以薑汁浸過文火熬乾為末每挑許置掌心欲喫日十數次忌毒物生冷

發為痼疾寒多熱少或但寒不熱宜七葉湯主之用附子一枚炮七次鹽湯浸七次去皮臍分作二服水一盞生薑七片煮七次

露一宿發日空心溫服未久再進一服○王堉百一選方云實處宜附子風處宜烏頭若用烏頭則寒多者火炮七次熱多者湯泡七次

去皮焙乾如土法用烏頭性熱炮多則熱散也又果附湯用熟附子去皮草果仁各二錢寒熱瘥疾附子一枚重五錢者炮爛人參丹砂

半水一盞薑七片煮一枚煎七分發日早溫服○肘后方臨發時以醋和附子塗于背上

十九丸未發時連進三服中病則吐或身體瘥疾瘥寒熱往來頭痛身瘥嘔痰或汗多引飲或白利煩躁宜薑附湯主之附子一

麻末末中病來日再服 龐安常傷寒論瘥疾瘥寒熱往來頭痛身瘥嘔痰或汗多引飲或白利煩躁宜薑附湯主之附子一

以啞聲為危急不過一二日而死醫謂極熱感寒也用生附子一味治之多愈便虛閉兩尺脈沉微用利小水藥不動者乃虛寒也附

非得謂以熱攻熱而發散寒邪乎此真起死回生之妙藥也 嶺南衛生方 小兒虛閉 兩尺脈沉微用利小水藥不動者乃虛寒也附

便虛閉

兩尺脈沉微用利小水藥不動者乃虛寒也附

子一個炮去皮臍溫水浸良久澤瀉一兩每服

四錢水一盞半燈心七瘥疾瘥瘥滿 大人小兒男女腫困精得既取精而腫再作小便不利若再服利藥性寒而小便愈不通矣醫者到此

並煎服即愈 普濟方月瘥疾瘥瘥滿 多束手蓋中焦下焦氣不升降為寒痞隔故水凝而不通惟服沉附湯則小便自通喘滿自愈用生附

子一個去皮臍切片生薑十片入沉香一錢磨水同煎食前冷飲 卑虛濕重 大附子五枚去皮四破以赤小豆半升藏附子於中慢火煮

附子雖三五枚亦無害小兒每服三錢水煎服 朱氏集驗方 卑虛濕重 大附子五枚去皮四破以赤小豆半升藏附子於中慢火煮

湯下 朱

氏集驗方 陰水腫滿 烏頭一升桑白皮五升水五升煮一升去滓銅器盛之重湯煎至可丸九小豆大每服三五丸取小便利為佳忌油

送下 大腸冷秘 附子一枚炮去皮取中心如棗大為 老人虛泄 不不禁熱附子一兩赤石脂一兩為末醋糊

普濟方 大腸冷秘 附子一枚炮去皮取中心如棗大為 老人虛泄 不不禁熱附子一兩赤石脂一兩為末醋糊

丸梧子大每陳皮湯臍寒脾世及老人中氣不足久泄不止肉莖隨二兩煨熟大附子去皮臍一兩五錢為末粥九梧子大每服八十九

內以水煮一日常令水過兩指取出每個切作三片再同煮半日剉去皮切焙為末別以棗肉和丸梧子大每空心米飲服三四十丸

小兒吐泄 注下小便少白龍丸用熟附子五錢白石脂煨龍骨煨各二錢半為末醋糊丸黍米大每米飲量兒大小服全

霍亂吐泄 不止 附子重七錢者炮去皮臍為末每服四錢水二盞半煎一盞溫服立止 秘寶水泄久痢 川烏頭二枚一生用一以黑豆半合同煮熟研入綠豆大每服五丸黃連湯下 普濟方 久痢赤白 獨聖丸用川烏頭一

個灰火燒烟盡取出地上蓋良久研末酒化臘丸如大麻子大每服三丸赤痢黃連甘
熟附子半兩研雞子白二枚烏和丸

芫黑豆煎湯放冷吞一白朮甘草黑豆煎湯放冷吞如瀉及肚痛以水吞下忌熱物
 下痢發空 脉沉陰寒退陰散主之陳自明云一人病此一二日愈日久腸冷者熟附子去皮枯白礬一兩為末每服三錢米
 服米湯送下

聖濟總錄一
不止服此兩服而愈方見前陰毒傷寒下
下血虛寒
飲下○又方熟附子一枚去皮生薑三錢半水煎服或加

黑豆一百粒
易豆生
生地黄一斤搗汁入酒少許以熟附子一兩半去皮臍切片入汁內石器煮成膏取附片焙乾入山藥三兩研末

並聖惠方。凡虛火上以膏和搗丸梧子大每空心米飲下三十丸昔爲察判妻苦此疾百藥皆試得此而愈屢發屢効余居士選奇

方
雙文曰蜀熟附子益末每服二錢薑三片
虛火上
行背內熱如火灸者附
紅識今痛比方平易更
熟附子去皮

水一盞煎六分溫服 普濟方 附子末津調塗涌泉穴 摘玄方 系外不言 當歸等分每瓶三錢水煎服 普濟方

生附子為末，淳酒和塗之。
重耳氏膏用大附子四枚，生切以者脂一片，三年苦酒同煮。一重耳氏膏頭少黃，集沙各一。

月足心胎下去之
小品方才月才清
三宿取脂煎三上三下日摩薄之取効
聖師方
癰疽重毒
兩烏末重周塗之召百

乾以米泔
煎立為瘡口冷膿水不絕內無惡肉大附子以水浸透切作大片厚三分安瘡口上以艾炷灸之

潤之同上瘰癧方源日一灸灸至五七次仍服肉托藥自然肌肉長滿所未作餅子亦可也韓已外科心法瘰癧直弩切者藥下台

此法極妙附子削如棋子大以唾粘貼上用艾火灸之附子頭五枚震時三十膏三日洗

子焦復唾以濕之再灸令熱氣徹內即瘡也千金方
瘡宜突
之日夜三四度
古今錄驗
丁倉重商
久生亦

附子去皮為末以水送下

煎洗甚驗
聖惠
手足凍裂
金之良
足金
思飲酒
是肝腎
冷熱日
香自包
川為兩
天膏之
刀服進
牛湯力

言者不計其功之
一、人食沙土月用鹽以煮朴老月照川魚頭者信之內用蓮子湯煎

寺參口

烏頭附子火王治寒末茶月半錢風痰頭開月日量車馬力力更飲主月廿一日人飲

[illegible]

為末薑汁麴糊丸黃米大每服十九米飲下亦治久濕疝瘕凡用烏附不可執為性熱審其手足冷者輕則用湯甚則用丸重者用膏候手足暖陽氣回即為佳也按此方乃和劑局方碧霞丹變法也非真慢脾風不可執用是故初虞世有金虎碧霞之戒 附方

新風厥癰痛 凡中風痰厥癰痛驚風痰涎上壅牙關緊急上視搖擗並宜碧霞丹主之烏頭尖附子尖蠟梢各七十個石綠研九度飛過

七 風厥癰痛 十兩為末麴糊丸芡子大每用一丸薄荷汁半盞化下更服溫酒半合須臾吐出痰涎為妙小兒驚癇如白僵蠶等分 和

制局 騰風撮口 生川烏尖三個全足蜈蚣半條酒浸炙麝香少許為末以少許吹鼻得嚏乃以薄荷湯灌一字 永類方 木舌腫脹 川烏尖已豆研細醋調塗刷 集簡方 牙痛難忍 附子尖大雄尖全蠟各七個生研為末點之

永類方 奔豚疝氣 作痛或陰囊腫痛去鈴丸用生川烏尖七個已豆七枚去皮油為末糕糊丸梧子大 朱砂磨香為衣每服二九空心冷酒或冷鹽湯下三兩日一服不可多 澹寮方 割中成瘡 連年不愈川烏頭尖黃蘗

為度 古 老幼口瘡 烏頭尖一個天南星一個研末薑汁和塗足心男左女右不過二三次即愈

今錄驗

本草綱目

卷十七上

草部

本草綱目草部目錄第十七卷上終

本草綱目草部第十七卷下

草之六

天雄本經時珍曰天雄乃種附子而生出或變出其形長

下品釋名有集而不生子故曰天雄其長而老者謂之天雄其形也集解別錄曰天雄生少室山谷二月采根陰乾弘景曰今米用

附子三種本出建平故謂之三建今宜都狼山者最好謂為西建建塘間者謂為東建氣力小弱不相似故曰西水柄勝東白也其用灰

殺之時有水死者不佳本經曰天雄附子為頭並以前道綿州龍州出者佳餘處縱有方弱不相似間以三物俱出建平故名之者非也

頭苗名量音斬爾雅云為重單是也今訛單為建遂以建平譯之矣承曰天雄諸說悉備但始種而不生附子則子經年獨長大者是也

蜀人種之尤忌生此以為不利如養穀而成白種之意時珍曰天雄有二種一種是蜀人種附子而生出長者或種附子而盡熟或長者

即如種芋形狀不一之類一種是地處單為頭之類自生或者故別錄註為喙云長三寸已上修治法亦得大明曰凡丸散炮去皮

者為天雄是也入藥須用蜀產曾經釀制者或云須重一兩半有象眼者乃佳餘見附子下別錄曰甘大溫性曰天雄宜乾薑

用飲藥即和皮生使甚佳時珍曰熟用一法每十兩以酒浸七日掘土坑用炭火氣味辛溫有大毒別錄曰甘大溫性曰天雄宜乾薑

枳殼亦去火以醋二升沃之傾乾來熟入天雄在內小盆合一夜取出去積用之之〇之才曰建為之使惡附子

治一切風寒濕痺筋骨痛緩急破積聚氣虛強筋骨輕身健行本經瘰癧面風去來疼痛心腹結聚關節重不能行步除濕開

痛長陰氣強志令人武勇力作不倦別錄治風痰冷痺軟脚毒風能止氣喘促急殺禽毒新

治一切風一切氣助陽通經水補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四肢不遂下胸膈水破疫癰瘰癧排膿止痛補骨消痰無

本草綱目 卷十七下 草部

卷之六

別錄
下品

時珍曰生于附
故為許慎說文

子之側
作劍子

集年弘景曰此
子皆是鳥

頭下旁出者

以少者為側子

時不用此來醫
大者為附子今

以附子為側

驗茶曰側子附

正果春

生治腫風痺節月柳疼冷寒氣氣腫文

陸台別
療脚氣

冷風氣庫大

風力骨痛急

金匱要略

身風痺神女

機曰鳥頭

腦得母之氣守而不朽屬乎中者也則子散生旁則體無定在其氣輕揚宜其發散四肢充達皮毛為治風之藥天雄長而尖其氣親上宜其補上焦之陽虛木蠶子則陰氣所結其形僅殘宜其不入湯服令人喪目也時珍曰唐元希聲侍郎治癰瘰風有則子湯見外臺秘要錄多

不錄

漏藍子

目牙氣

學
論
炮
火
處
臺

日華時
各大明

曰此乃附子

之蹟細未成者

二十對附子

古南星之最小
五十對鳥頭五

者名虛筆此物

類之故亦同

味辛平

毒微白服之
令人喪子

主治惡痢冷

通鑑纂要

卷之四

時珍曰按楊士

藏直指方云曰

八漏瘡年久者

復其元陽當用

漏蓋于軍加威

編云一人兩足生瘡莫能靠近夜須五夫人伺下醫神授方用漏籃子一枚生研
為末入臘粉少許井水調塗取去治之果愈蓋此物不堪服餌止宜入瘡科也

附方新
一 土瘡 雖下及体患刺百歲丸用漏籃子一
箇大者阿膠不香黃連鹽棗煨各平

大每歲一丸來飲下 羅天益衛生寶鑑

三

此者俗為

掛獸故有

大雄晉曰

數十步即

秋如蓬頭

10

毒之

卷之四

卷之四

卷三

卷之四

11

瘰癧能行步癰腫疔毒

別錄

男子腎氣衰弱陰汗癰癧疔毒不消

時 主大風頑痺

射罔

味苦有大毒

之才曰射罔大明曰人中射罔毒以其毒烈小豆葉碎碎冷水腎尾皆可一味煎之

治尸疰瘰癧及頭中風痺

別錄

瘰癧瘡瘡根結核癰癧毒瘰癧及蛇咬先

取鹽肉四畔漸近瘡留瘻至骨瘻有熱膿及黃水塗之若無膿水有生血及新傷破即不可塗立殺人

感發

時珍曰射罔射罔乃至毒之藥非

若川烏頭附子人所共畏知以釀制殺其毒性之比非厥烈急疾不可輕投甄權藥性論云益陽事治男子腎氣衰弱不可遽然此類能

暖風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒宜有川烏頭附子補石腎命門之功故戰邪知府自負如醫因病服解草烏頭木地龍子藥過多

南入腹而麻痺遂至不救可不慎乎機曰烏頭形如烏嘴其氣鋒銳通經絡利關節尋遠徑而直抵病所前為射罔能殺禽獸非氣

之鋒能如是乎楊清吳曰凡風寒濕痺骨內冷痛及損傷人骨年久發痛或陰疽腫毒並且草烏頭而星等分少加肉桂為末薑汁

熱酒調塗未破者能肉消久煮者能去其毒二藥方 陰毒瘰癧 生草烏頭為末以葱頭雜藥納穀道 二便不通 即上方名 中風癱

性味辛烈能破惡塊逐寒濕遇冷即消遇熱即消 附方 四十八陰毒瘰癧 生草烏頭為末以葱頭雜藥納穀道 二便不通 即上方名 中風癱

手足顛倒言語蹇澀左經丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去皮二兩乳香沒藥各一兩為末生烏豆一升以 瘰癧瘰癧 骨節疼痛

諸風痺漏下血一切風痺草烏頭川烏頭兩頭尖各三錢硫黃麝香丁香各一錢半薑子 諸風不遂 朱氏集驗方用生草烏頭晚露少等

五國為末以熟粉又桂枝散合成一處用紗紙包裏燒重病處各雷丸 孫天仁集驗方 諸風不遂 朱氏集驗方用生草烏頭晚露少等

楊子大母服四五丸白湯下甚妙多服恐入名郭者小金丹。經驗濟世方用草烏頭四兩去皮大豆半升鹽一 兩同以沙瓶煮三伏時去豆將烏頭入木臼搗三百杵作餅燒乾為末酒糊丸楊子大母空一鹽湯下十九粒至寶丹 一切頑風 周生草

腐半袋入內再將豆腐壓乾入鍋中煮一夜其藥即堅如石取出晒
乾為末每服五分令風濕氣以生薑湯下麻木不仁以葱白湯下之 活人心統
服病甚一丸作二九薄湯下 風濕走痛 黑髮煎丸用兩頭尖五靈脂各一兩乳香沒藥當歸三錢為末醋糊丸梧子 腰脚冷痛 烏頭三錢
化下覺微麻為度 本事方 風濕走痛 大每服十九至三十九臨卧溫酒下忌油膩濕麵等物勿服 瑞竹堂方 腰脚冷痛 烏頭三錢
未醋調貼須臾痛 膝風作痛 草烏細辛防風等分為末搗紙微中及 連行脚腫 以水微濕慘之用之可行千里甚妙 經驗脚氣聖藥
止 十便良方 安養膝內能除風濕健步 扶壽方 連行脚腫 以水微濕慘之用之可行千里甚妙 經驗脚氣聖藥

間有核生草烏頭大黃木龍子作末薑汁煎茶調貼之 濕滯足腫 早輕晚重用草烏頭一兩以生薑一兩同研交感一宿蒼木一兩以
又法草烏一味為末以薑汁或酒糟同搗之 永類方 濕滯足腫 葱白一兩同研交感一宿各焙乾為末酒糊丸梧子大每服五十丸
酒下 艾元 除風去濕 治痺骨虛弱久積氣飲食減少用草烏頭一斤蒼木二斤以去白陳皮半斤生甘草四兩黑豆三升水一石同
英如宜方 除風去濕 煮乾口擇為木晒乾為末酒糊丸梧子大每服九丸臨卧溫酒下立効 戴古渝經驗方 久患頭風 草烏頭
方 偏正頭風 草烏頭四兩川芎第四兩蒼木半斤生薑四兩連翹生葱一把搗爛同入瓷瓶封固埋土中春五夏三秋 久患頭風 草烏頭
五冬七日取出晒乾揀去惡毒為末醋糊和丸梧子大每服九丸臨卧溫酒下立効 戴古渝經驗方 久患頭風 草烏頭

一分赤小豆三十五粒麝香二字為末每服 瘰癧頭痛 龍虛傷風停聚痰飲上厥頭痛或偏或正草烏頭炮去皮尖半兩川烏頭生去皮
半錢薄荷湯冷服更隨左右嚙鼻 指南方 瘰癧頭痛 尖一兩薑香乳香三厘子大為末每服二錢薄荷薑湯下食後服 陳言三因湯
女人頭痛 血風證草烏頭炮子等分為末自然煎汁隨左 腦洩真痛 草烏去皮半兩蒼木一兩川芎二兩並生研末醋糊 烏耳癢 如流
右調塗太陽及額上勿過眼避風 濟生方 腦洩真痛 丸綠豆大每服十九茶下忌一切熱物 聖濟總錄 烏耳癢 水及

風聲不治成聾用生烏頭搗得漿潤制如栗 喉痺口瘡 不開欲死草烏頭炮子等分為末入麝香少許擦牙并嚙鼻內牙關自開也○酒
核大塞之口易二次不三日愈 千金方 喉痺口瘡 生方用草烏大石脂等分為末每用一錢醋煮皂莢汁調稀搽入腫上流涎數次
其毒即 虛壅口瘡 滿口連舌者草烏一箇南星一箇生薑一大塊為末睡時以醋調塗 瘡口鼻 穿透者草烏頭燒灰入 風聲牙痛 草烏
破也 虛壅口瘡 手心足心或以草烏頭吳茱萸等分為末蜜調塗定心 本事方 瘡口鼻 穿透者草烏頭燒灰入 風聲牙痛 草烏

一兩細辛一錢為末搗之吐涎 寒氣心疝 三十年者射固食藥等分為末蜜調塗定心 本事方 瘡口鼻 穿透者草烏頭燒灰入 風聲牙痛 草烏
方草烏食鹽同炒黑慘之 海上方 寒氣心疝 下二九日三服則國藥所秘之方 龍江東陽方 寒氣心疝 去皮如巴豆大大東去
皮一枚搗成丸梧子大清口先發 寒氣心疝 先寒後熱寒寒虛但寒不熱而色黑者各服瘡寒多熱少白黃腹痛名脾瘡二者並宜服此
時每服一丸白湯下 肘後方 寒氣心疝 實粒老用之二十年累試有効不封草烏頭削去皮沸湯泡二七度以薑蒜良久切焙研稀

草部

三

草部

草部

草部

草部

草部

草部

草部

糊九楊子大每服三十丸薑十片棗三枚葱三根煎湯清早服以藥中癰毒客妨飲食羸瘦射周二兩板三百粒搗末雞子白和壓之如人行十里許再服絕勿飲湯便不發也 蘇東坡良方 日中癰毒丸麻子大每服一丸漸至三九以愈為度 肘後方 水泄

寒痢大草烏一兩以一半生研一半燒灰醋糊和丸綠豆大每服七丸并華水下忌生冷魚肉 十便良方 泄瀉下 三神丸治清濁不分泄瀉注下或赤或白腹脇刺痛裏急後重用草

豆大每服二十丸水瀉流水下亦煎甘草湯 結陰下 腹痛草烏頭粉炒去皮臍切一兩箇香炒三兩每用三錢 老人遺尿 不知出者下白痢薑湯下忌食腥生冷 和劑局方 水一盞入鹽少許煎八分去浮露一夜五更冷服 聖濟錄 草烏頭一

兩童便浸七日去皮同鹽炒為末酒糊 內痔不出 草烏為末津調點肛門內痔即出 外科集驗方 疔毒初起 草烏頭七箇川烏頭三箇杏仁九箇飛羅丸綠豆大每服二十九鹽湯下 普濟 乃用枯痔藥點之 外痔集驗方 疔毒初起 草烏頭一兩為末無根水調搽留口以紙蓋之

乾則以水潤之 疔毒腫生烏頭切片醋熬成膏攤貼次日根出又方兩頭 疔瘡發背 草烏頭去皮為末用葱白連鬚和搗丸豌豆大以唐瑤經驗方 疔毒腫生烏頭切片醋熬成膏攤貼次日根出又方兩頭 疔瘡發背 草烏頭去皮為末用葱白連鬚和搗丸豌豆大以

下或有惡心嘔三四口用冷水一口止之即愈 疔毒腫毒 及發背疔瘡便毒等證二烏常用草烏頭川烏頭子皮上以升華水磨以被厚益汗出為度亦治頭風 乾坤秘鑑 疔毒腫毒 疔瘡之如有口即塗四邊乾再上亦可單用草烏磨醋塗之 永類方 大風癰

瘡通身黑色肌體麻木痺痛不常覺痛頭一斤剉洗去皮極淨搗乾以清油四兩鹽四兩同入鍋內炒公深黃色傾出刺油只留鹽并藥再炒令單煙出為度取一枝擊破心內如末一點白者始好白多再炒熟料羅為末醋塗糊九楊子大每服三十九空心溫酒下草

烏性毒難制五七日間以黑豆 瘡身生瘡 陰囊兩脚尤甚者草烏一兩鹽一兩化水浸一夜炒亦為末搗腰子一具 一切諸瘡 未破者單煮粥食解其毒 繼以濟藥方 瘡身生瘡 陰囊兩脚尤甚者草烏一兩鹽一兩化水浸一夜炒亦為末搗腰子一具 一切諸瘡 未破者單

入輕粉少許搗瘡 瘡初作 未破者煮熱草烏頭半兩木蜜子二箇以米醋磨細入搗爛 瘡 腫痛急療之遲則毒深以生烏頭油和徐 普濟方 瘡初作 未破者煮熱草烏頭半兩木蜜子二箇以米醋磨細入搗爛 瘡 腫痛急療之遲則毒深以生烏頭

方 蛇蟻人 射周傳之類易血 中沙蠱毒 射周傳之類 佳千金 瘡 腫痛急療之遲則毒深以生烏頭

白附子 別錄見後發 瘡 射周傳之類 佳千金 瘡 腫痛急療之遲則毒深以生烏頭

新羅國及丹東道與附子相似時珍云 氣味辛甘大溫有小毒 毒人熊咆周景曰純陽引藥勢上行 主治心痛血痺面上青病行癰

如望烏頭之小者長寸許乾者版又有 氣味辛甘大溫有小毒 毒人熊咆周景曰純陽引藥勢上行 主治心痛血痺面上青病行癰

新羅國及丹東道與附子相似時珍云 氣味辛甘大溫有小毒 毒人熊咆周景曰純陽引藥勢上行 主治心痛血痺面上青病行癰

別錄中風急一切冷風癱瘓癱瘓明諸風冷氣足弱無力疥癬風瘡陰下濕癢頭面癢入面脂用李補肝風虛好古風痰白附子

乃陽明經絡因與附子相投故得此名實非附子類也按是國附方新十中風口喝半身不遂牽正散用白附子白薑全蝎等分生

先賢傳云孔休傷頗有麻王許賜王屑白附子香與之消服附方新十中風口喝研為末每服二錢熱酒調下楊氏家藏方

小兒驚風暑毒入心痰塞心孔昏迷搐搦此乃危急之證非此丸生料曉曉之劑不能伐之三主丸用白附子天南星風痰眩暈

不刺白附子炮去皮槌半斤石膏煨紅半斤硃砂二兩二錢半龍腦偏正頭風白附子白芷猪牙皂角土硫等分為末

錢為末粟米飯丸小豆大每服三十九食後茶酒任下御藥院方偏正頭風白附子白芷猪牙皂角土硫等分為末

荷星半夏等分生研為末生薑白芥汁浸蒸餅赤白汗斑白附子硫黃等分為末薑汁調面上疔瘡白附子為末時敷水洗面以白蜜

丸綠豆大每服四十丸食後薑湯下濟生方赤白汗斑白附子硫黃等分為末薑汁調面上疔瘡白附子為末時敷水洗面以白蜜

方耳出膿水白附子炮羌活一兩為末猪羊腎各一箇每箇入喉喉痛白附子末枯礬等分研末塗偏墜疝氣白附子一箇為末津調

五壯即愈小兒吐逆不定虛風喘急白附子猪羊腎等分為末薑汁調喉痛白附子末枯礬等分研末塗偏墜疝氣白附子一箇為末津調

楊超簡便方小兒吐逆末每米飲下半錢保初大千方慢驚風白附子半兩天南星半兩黑附子一錢並炮去皮為末每服二錢

虎掌

本經下品天南星實釋名虎掌曰華華曰其根四時有國牙看如虎掌故有此名頌曰天南星即本草虎掌也小者名由疏

時珍曰虎掌因形似之非根也南星因根圓白形如老人星狀故別錄曰虎掌生漢中山谷及宛句二月八月采陰乾託景曰近

名南星即虎掌也蘇恭說甚明白宋開寶不重出南星得今俱入虎掌通亦有形似半夏恒大而四邊有子如虎掌今用多破作三四

片方藥不甚用也華曰此是由跋而根其第一草並頭一葉枝了扶至根大者如拳小者如雞卵都似為神四時有國牙看如虎掌由跋

是新根大如半夏二三倍四時無子身闊似半夏乃由跋也華曰里頭有八九葉花生葉闊似器曰天南星生安東山谷紫如桐葉

錢制竹湯調下每日空心吐瀉天正散治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風腹慢驚天南星一箇重八九錢者去脂黃土坑深三寸

一服午時一服 經驗方 天南星一箇重八九錢者去脂黃土坑深三寸 炭火五斤煎赤入好酒半盞安南星在內仍架炭三條在上候發裂取則再炒熟為末用五錢天麻

煨熟研末一錢麝香一字和勻三歲小兒用半錢以 聖藥丸用天南星九錢九兩為末薑汁麝香各一錢小兒用半錢以 衛生寶鑑 小兒癩瘡 癩後

生薑防風煎湯調下亦治久嗽惡心 錢乙小兒方 癩瘡 服二十九人參湯下石薑蒲麥門冬湯亦可 衛生寶鑑 小兒癩瘡 癩後

能言以天南星瀉紙包煨熟末雄 治痢疾 天南星煨香一兩味砂一錢為末指心血 眼渴 斜天南星生研末自煎薑汁調 仁存方 魚弓反張

指膽汁調服二字 全幼心鑑 破傷中風 胡氏命散散又名玉真散治打撲金刀傷及破傷風陽濕發病強直如癱狀者天南星防風等

南星半夏等分為末薑汁竹葉 破傷中風 分為末水調敷出水為妙仍以溫酒調服一錢已死心尚溫者熱薑便調灌二錢開腹內湯

灌下一錢仍入印堂 摘玄方 破傷中風 生新星末水調塗四 婦人頭風 益定勿令透氣候冷研末每服一字以酒調下重者半錢 千

堅虛者酒和童便連灌三服 破傷風瘡 生新星末水調塗四 婦人頭風 益定勿令透氣候冷研末每服一字以酒調下重者半錢 千

即麝亦可煎服 三因方 破傷風瘡 生新星末水調塗四 婦人頭風 益定勿令透氣候冷研末每服一字以酒調下重者半錢 千

金瘡頭痛 不可忍天南星一兩刺芥葉一兩為末薑汁糊丸楊子大每食後薑湯下二十九丸又 癩痰頭運 目眩吐逆煩悶飲食不下

方 癩痰頭運 上清丸用天南星薑香等分生研末鹽醋煮麵糊丸如上去服 並出經効濟世方 癩痰頭運 玉壺丸用生南星生半夏

各一兩天麻半兩白麵三兩為末水丸楊子大每服三十丸以水 癩痰頭運 每服二錢茶七箇甘草五分同煎服三四服其硬物自

先煎沸入藥者五七沸煎出放溫以姜湯吞之 重民和劑局方 癩痰頭運 每服二錢茶七箇甘草五分同煎服三四服其硬物自

出腦氣流轉體湧自收以大蒜畢發末作餅隔紗貼顯 小兒風痰 執毒藥帶涼心脈驚抱龍丸利牛膽南星一兩入金錢薄荷十片丹砂

前製斗熨之或以香附藥末頻吹鼻中 直搗方 小兒風痰 執毒藥帶涼心脈驚抱龍丸利牛膽南星一兩入金錢薄荷十片丹砂

全効 壯人風痰 及中風中氣初起星香飲用南星四錢木香一錢 痰迷心竅 壽星丸治心驚驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘

心鑑 壯人風痰 水二盞生薑十四片煎六分溫服 王碩易簡方 痰迷心竅 壽星丸治心驚驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘

入酒五升參乾乃安南星在內盞蓋定以灰塞之勿令走氣次日取出為末琥珀一兩味砂二兩為 癩痰注痛 方見羊

末生薑汁打麝糊丸楊子大每服三十丸至五十丸煎入參石薑蒲湯下一日三服 和劑局方 癩痰注痛 方見羊

蒼朮等分生薑三片 癩痰注痛 方見羊 癩痰注痛 方見羊 癩痰注痛 方見羊 癩痰注痛 方見羊 癩痰注痛 方見羊

水煎服之 摘玄方 癩痰注痛 方見羊 癩痰注痛 方見羊 癩痰注痛 方見羊 癩痰注痛 方見羊 癩痰注痛 方見羊

湯下寒痰去積皮加官 清氣化痰 三仙丸治中脘氣滯痰涎煩悶頭目不清生南星去皮半夏各五錢並湯泡七次為末自然薑汁和作

宿根亦自生苗其滴露之說益不然經二年者根大如碗及子魁其外理白味亦麻人秋後采根須淨擦或搗或片段以礬灰汁煮十餘沸以水淘洗換水更煮五六過即成凍子切片以苦酒五味燉食不以灰汁則不成也切作細絲沸湯灼過五味調食狀如水母綠馬志言其苗似半夏楊慎丹鉛錄言論醫即此者皆誤也王慎農書云救荒之法山有粉芎藭粉橡栗之利則此物亦有益于民者也其斑杖即天南星之類有斑者

根氣味辛寒有毒

李廷飛曰性冷甚不益人冷氣人少食之生則殺人喉出血

主治癰腫風毒瘰癧上搗碎以灰汁煮成餅五味調食主消渴

開寶曰按三寶發元延壽書

云有人患瘰癧百物不思見陳家修論謂求食之美遂附錄苦薩草宋圖經謂曰生江浙州郡凌冬不凋秋冬有花直出赤子如弱頭冬月多食而瘰癧愈又有病肥癰者數人多食之亦皆愈

附錄苦薩草

宋圖經謂曰生江浙州郡凌冬不凋秋冬有花直出赤子如弱頭冬月多食而瘰癧愈又有病肥癰者數人多食之亦皆愈

婦人妊娠效嗽搗篩蜜丸服効

半夏

本經經年守田

本經水玉

本經地文

別和古

本經時珍曰

經記月令五月半夏生蓋

第別錄曰半夏生槐里川谷五月八日采根暴乾

白芫圓上對景曰槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者為佳不厭陳久按曰所在皆有主平澤中者名羊眼半夏圓白為勝

然江南者大乃徑寸南人特重之頃來互用功狀殊異其苗似是由疏誤以為半夏也續曰在處有之以齊州者為佳二月生苗一莖並端三葉淺綠色頗似竹葉而生江南者似有藥葉根下相重上大小皮黃肉白五月八月采根以灰煮二日湯洗暴乾蜀圖經云五月

米則虛小八月采乃實大其平澤生者甚小名羊眼半夏由疏誤類半夏而苗不同數曰白傍護子真似半夏只是咬著微酸不入藥用

修治

子末二兩鐵醋二兩燻將半夏投中洗三過用之若洗涎不盡令人氣逆肝氣怒滿時珍曰全治半夏惟洗去皮垢以湯泡浸七日逐日換湯曝乾切片薑汁拌焙入藥或研為末以薑汁入湯浸澄三日瀝去涎水晒乾用謂之半夏粉或研末以薑汁和作餅子日乾

用謂之半夏餅或研末以薑汁白礬湯和作餅焙乾置籃中待生黃衣日乾用謂之半夏餅白飛霞醫通云痰分之病半夏為主造而為餅尤佳治濕痰以薑汁白礬湯和之治風痰以薑汁及皂莢煮汁和之治火痰以

薑汁竹瀝或荆瀝和之治寒痰以薑汁薑湯入白芥子末和之此皆造題妙法也

根氣味辛有毒

別錄曰生微寒熱溫生令人吐熱令人下湯洗盡滑用元素曰味辛苦性溫氣味俱薄沉而降陰中陽也好古曰羊

柴胡為之使忌羊血海參糖元素曰熱痰佐以黃芩風痰佐以南星寒痰佐以乾薑痰痞佐以陳皮白朮多用則瀉脾胃諸血證及口渴者禁用為其燥津液也孕婦忌之用生薑則無害

喉腫痛腸鳴下氣止汗本治心腹胸膈痰熱滿結效嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫瘰癧黃悅澤面目墮胎別錄治痰下肺氣開

胃建脾止嘔吐去胸中痰滿生者摩癰腫除癰氣藥治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘧大治寒痰及形寒飲冷傷脾而效治胸中痞

膈上痰除胸塞和胃氣燥脾濕治痰厥頭痛消腫散結元治瘡癰骨痛震補肝風虛好除腹脹目不得瞑白濁夢遺帶下時珍發明權日半

虛而有痰氣宜加用之頃曰胃冷嘔噦方藥之最要咸無已曰辛者散也潤也半夏之辛以散逆氣結氣除煩嘔發音聲行水氣而潤腎燥好占曰經云腎主五液化為五濕自入為唾入肝為泣入心為汗入脾為痰入肺為涕有痰曰嗽無痰曰欬痰者因嗽而動脾之濕也

半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以為流濕潤燥也俗以半夏為肺藥非也止嘔吐為足陽明除痰為足太陰柴胡為之使故今柴胡湯中用之雖為止嘔亦助柴胡黃芩主往來寒熱是又為足少陽陽明也宗典曰今

人惟知半夏去痰不言益脾益能分水故也脾惡濕濕則濡困則不能治水經云水勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩半夏大棗各三十枚水一斗漿瓶中慢火燒為熟水時呷之便已也趙繼宗曰丹溪言二陳湯治一身之痰世醫執之凡有痰者皆用夫二陳

內有半夏其性燥烈若風痰寒痰濕痰食痰則相宜至於勞痰失血諸痰用之反能燥血液而治病不可不知機曰俗以半夏性燥有毒多以貝母代之貝母乃太陰脾經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃經之藥何可代也夫欬嗽吐痰虛勞吐血或痰中見血諸鬱咽痛喉痺

肺癰肺痿瘰癧婦人乳難此皆貝母為向導半夏乃禁閉之藥若延者脾之液美味膏梁炙煿皆能生脾胃濕熱故化為痰久則痰火上攻令人昏憤口噤偏廢僂仆塞嚔不語生肌且夕自非半夏南星葛可治乎若以貝母代之則魁首特罷矣時珍曰脾無留濕不生痰

故脾為生痰之源肺為貯痰之器半夏能主痰飲及腹脹者為其體滑而味辛性溫也涎滑能潤辛溫能散亦能潤故行濕而通大便利竅而泄小便所謂辛走氣能化液辛以潤之是矣張氏云半夏南星治其痰而效嗽自愈丹溪朱氏云二陳湯能使大便潤而小便

長聊攝成氏云半夏辛而散行水氣而潤腎燥又和劑局方用半硫丸治老人虛秘皆取其滑潤也世俗皆以南星半夏為性燥誤矣濕去則土燥痰涎不生非二物之性燥也古方治咽喉腫脾吐血下血多用二物非禁劑也二物亦能散血故破傷打撲皆主之惟陰虛勞

損則非濕熱之邪而用利數行濕之藥是乃重竭其精液醫之罪也宣藥之咎哉甲乙經用治夜不眠是果性燥者乎岐伯云衛氣行于陽陽氣滿不得入于陰陰氣虛故目不得瞑治法飲以半夏湯一劑陰陽既通其卧立至方用流水千里者八升揚之萬遍取清五升者

之炊以新大沸入秫米一升半夏五合煮一升半飲汁一盃方十五新
日三以為度病新發者覆蓋則卧汗出則已久者三飲而已方五十三
白芨一兩半溫水化浸五日焙乾以鉛白霜一錢溫水化又浸七日以紅半夏法消風熱清痰涎降氣利咽大半夏湯洗焙制如法每
漿水慢火內煮沸焙乾收之每嚼一二粒薑湯送化下御藥院方

指厚排半夏于上再以燈草蓋一指厚以炒豆焙祛風利咽辰砂半夏丸用半夏一斤湯泡七次為末篩過以水浸三日生絹
之候乾取出每嚼一兩粒溫水送下御藥院方

十九此周府消痰開胃三仙九方去胸膈壅滯斗門方用半夏湯泡乾為末白熟蜜十和作餅濕紙裹煨香以熟水二盞同
方也袖珍化痰利氣見虎掌下餅二錢入鹽五分煎一盞服之大瘰癧每夜嚼食傷極驗○經驗用半夏天南星各二兩為

末水五升入罐內浸二荷去清水焙乾中焦痰涎利咽清頭目進飲食半夏泡七次四兩枳殼一兩為末薑汁打糊或者裹肉和丸梧子
重研每服一錢水二盞薑三片煎服

老人痰大膽熟不識人及肺熱痰實不利半夏炮七次焙硝石半兩為末薑汁打糊丸梧子大每服三十丸食後薑湯送下和劑局方
為末入白麵搗勻水和丸綠豆大每薑湯下五十九普濟月聖痰半夏半斤酸漿浸一宿溫湯洗五十過去惡氣日乾為

乾漿水濃煎和丸雞頭子大紗袋盛避風處陰搜風化痰定志安神利頭目辰砂化痰丸用半夏翅三兩天南星炮一兩辰砂枯礬各
乾每服一丸好茶或薄荷湯嚼下御藥院方

厥中風省風湯用半夏湯泡八兩甘草炙二兩防風四風痰頭暈嘔逆目眩面色青黃麻痺者水煎食化丸用半夏生天南星寒水石
兩每服半兩薑二十片水二盞煎服奇効方

流出搗丸梧子大每服五十九薑湯下極効亦治風風痰涎青亞丸半夏一斤天南星半兩各湯炮晒乾為末薑汁和作餅焙乾入神
痰咳嗽二便不通風痰頭痛潔古活法機要方

下葉風痰喘逆元元欲吐眩運欲倒半夏一兩雄黃三錢為末薑汁浸蒸餅千錫湯用半夏湯洗七箇甘草炙炒各一
八方九梧子大每服三十丸薑湯下已吐者加檳榔活法機要風痰喘急寸薑三片水一盞煎七分溫服和劑局方

上焦熱痰欬嗽制過半夏一兩片黃芩末二錢薑汁打糊丸綠豆大每市熱制半夏栝樓仁各一兩為末薑汁打糊丸梧子大每
服七十九次薑湯食後服此周憲王親制方也袖珍方日熱嗽服二三九白湯下或以栝樓煎煮熱丸潛生方熱

痰欬嗽煩熱面赤口燥心痛脉洪數者小黃丸用半夏天南星各一兩黃芩一兩半小兒痰熱欬嗽驚悸半夏天南星等分為末牛膽汁和
為末薑汁浸蒸餅丸梧子大每服五十九食後薑湯下潔古活法機要

痰欬嗽煩熱面赤口燥心痛脉洪數者小黃丸用半夏天南星各一兩黃芩一兩半小兒痰熱欬嗽驚悸半夏天南星等分為末牛膽汁和
為末薑汁浸蒸餅丸梧子大每服五十九食後薑湯下潔古活法機要

痰欬嗽煩熱面赤口燥心痛脉洪數者小黃丸用半夏天南星各一兩黃芩一兩半小兒痰熱欬嗽驚悸半夏天南星等分為末牛膽汁和
為末薑汁浸蒸餅丸梧子大每服五十九食後薑湯下潔古活法機要

痰欬嗽煩熱面赤口燥心痛脉洪數者小黃丸用半夏天南星各一兩黃芩一兩半小兒痰熱欬嗽驚悸半夏天南星等分為末牛膽汁和
為末薑汁浸蒸餅丸梧子大每服五十九食後薑湯下潔古活法機要

痰欬嗽煩熱面赤口燥心痛脉洪數者小黃丸用半夏天南星各一兩黃芩一兩半小兒痰熱欬嗽驚悸半夏天南星等分為末牛膽汁和
為末薑汁浸蒸餅丸梧子大每服五十九食後薑湯下潔古活法機要

湯下三五丸 濕痰欬嗽 面黃體重胃弱兼食不消脉緩者白朮丸用半夏南星各一兩白氣痰欬嗽 面白氣促面黃體重胃弱兼食不消脉緩者白朮丸用半夏南星各一兩

摘玄方 濕痰欬嗽 米一兩半為末薄糊丸楊子大每服五七十丸薑湯下 舌法機要 小結胸痛 正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之半夏半升黃連一兩枳實大者

官桂半兩為末糊丸楊子大每服五七十丸薑湯下 舌法機要 小結胸痛 正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之半夏半升黃連一兩枳實大者

服五十九丸薑湯下 活法機要 小結胸痛 正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之半夏半升黃連一兩枳實大者

者半夏油炒為末糊丸綠豆大 服五十九丸薑湯下 活法機要 小結胸痛 正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之半夏半升黃連一兩枳實大者

每服二十九丸薑湯下 丹溪心法 急傷寒 前服 胡洽居士百病方 結痰不出 語音不清年久者亦宜玉粉丸半夏半兩桂心一字

夜卧含藥 停痰令飲 喘逆橘皮半夏湯用半夏小者熟陳橘皮各一兩每服四錢生薑七片水二盞煎一盞溫服 和劑局方 停痰留飲 胸膈滿悶氣短惡心飲食不下或吐痰水痰多半

活法機要 停痰令飲 喘逆橘皮半夏湯用半夏小者熟陳橘皮各一兩每服四錢生薑七片水二盞煎一盞溫服 和劑局方 停痰留飲 胸膈滿悶氣短惡心飲食不下或吐痰水痰多半

小一鍾半煎七分甚 支飲 嘔 嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似嘔不嘔以噦不噦心下憤憤逆耳小噦逆欲死 半夏生

之即上 瘰癧瘰癧氣 方同 嘔噦 嘔不得下 半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓半斤 金匱要略 嘔噦 嘔不得下 半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓半斤

方也 瘰癧瘰癧氣 方同 嘔噦 嘔不得下 半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓半斤 金匱要略 嘔噦 嘔不得下 半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓半斤

每服三十九丸 傷寒乾嘔 半夏熟洗研末生薑湯 嘔逆 內有寒痰半夏一升洗滑焙研小麥麴一升水和作彈丸水煮熟初吞四五

三 金匱要略 傷寒乾嘔 半夏熟洗研末生薑湯 嘔逆 內有寒痰半夏一升洗滑焙研小麥麴一升水和作彈丸水煮熟初吞四五

方也 外傷 嘔吐反胃 大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升水一斗二升和揚之一百 嘔噦 嘔不得下 半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓半斤

臺秘要 嘔吐反胃 大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升水一斗二升和揚之一百 嘔噦 嘔不得下 半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓半斤

服四錢水一盞薑七 小兒吐瀉 脾胃虛寒齊州半夏泡七次陳粟米各一錢 小兒痰吐 或風寒所致或飲飲發熱飲食即吐半夏過七次

片煎服 和劑局方 小兒吐瀉 脾胃虛寒齊州半夏泡七次陳粟米各一錢 小兒痰吐 或風寒所致或飲飲發熱飲食即吐半夏過七次

煨熟去麴為末生薑自然汁和丸麻子大 妊娠嘔吐 半夏二兩人參乾薑各一兩為末薑汁麴糊丸 霍亂腹脹 半夏桂等分為末水

每服三十九丸陳皮湯下 活幼口噤 楊子大每飲服十九日三服 仲景金匱要略 霍亂腹脹 半夏桂等分為末水

腹脹 半夏末少許酒和丸粟米大每服二九薑湯下不瘥 黃芩湯 小便利不可除熱半夏生薑各半斤水七升煮一升五合分

引飲 脾胃不利消暑丸用半夏醱煮一斤被多半斤生甘草半斤 老人虛秘 冷秘及虛秘冷氣半硫丸半夏炮炒生硫黃等分為末自然

失血喘急

吐血下血胸中帶下喘急痰喘中滿宿疾用半夏梔扇以薑汁和

白濁遺精

半夏一兩洗十次切破以木猪苓二兩同炒黃土

大母服三十九次各湯送下腎氣閉而一身精氣無所管攝妄行而遺者宜用此

八般頭風

三次見効半夏末入百草霜少許作紙糊

含衛

生痰不能言語聲不出者苦酒湯主之半夏七枚打碎雞子一枚頭開一竅去黃納苦酒令小滿

生實鑑

入半夏在內以鐵子坐于炭火上煎三沸去滓置盃中時時嗽之極驗未瘥更作

出効

骨痛在因半夏白芷等分為末水服方寸

集蘭方

當嘔出忌羊肉外臺秘要

夏末塗

面上黑氣半夏焙研末醋調敷不可見風不計遍數從早至

足心

晚如此三日是為湯洗下面堂如玉也

產以半夏末頻噴鼻中

則上也婦人良方

紫靈魏元

五絕驚風一日自縊二日墮三曰溺水四曰屍懸五日產乳並以半

君方也

夏末約大豆一丸入鼻中心溫者一日可活也

一方以末隨左右噴鼻

劉長春經驗方

入耳

生半夏末麻油調塗

耳門外

本方

莖涎

主治燥取塗髮鬢墮落者即生

數

錢相公箇中方

蚤休

下品藥名蚤休別名蚤休日重樓金線

三層草

綱目七葉一枝花

臺三層

因其葉狀也金線重樓因其花狀

臺六七葉

似王孫兒白芨麻葉葉有三層根如肥大蔓細肌脆白似升日某似鬼

也甘遂

因其根狀也紫河車因其功用也

草部

下

根氣味苦微寒有毒

大明曰冷無毒伏雄
黃丹砂蓬砂及鹽

主治頭痛牙熱氣在腹中

本
經
疔瘰癧瘻除下三蟲去蛇毒

生食一升利水唐本治

胎風手足搐能吐泄癰癩明大

去瘧疾寒熱時

三月一日摩醋博瘰癧蛇毒甚有

幼時珍曰案河車足厥陰經藥也

凡本方新服食法

車根以竹刀刮去皮以竹骰子大塊鑊裏入瓷瓶中水煮候浮漚出藥今入新布袋中懸風處待乾每服三九更初而東舍井水下
連進三服即能休根若欲食先以黑豆煎湯飲之次以藥丸煮稀粥漸食之咒曰天朗氣清金雞鳴吾今服藥欲長生吾不飢復
不渴賴得神小兒胎風手足搐搦用蚕衣即茶車為末量薑黃帶有陽證者白甘遂末即蠶衣一錢杵樓根末二錢同干慢火
仙草有靈小兒胎風每服半錢冷水下衛生易簡方上以蓮黃研細每服一字煎黃耆湯可湯周下中風

芥毒

金線重樓根磨水
服即愈

因失受戎腫痛用重

一、為赤色者川大黃炒木鼈子仁馬

身消半

鬼

白本經校正併入圖經
下品校正併入圖經

釋名曰本天曰

解毒藥綱
解毒藥綱
解毒藥綱

本善

本
獨荷草
上

山荷葉
旱荷

八角盤目

金瓶 弘景曰鬼曰根如射干白

味甘九

曰相連有毛者

良故名時珍曰

此物有毒而曰如

有鏡發而通音母詣各鄉東坡詩集云瑞田早稻唐麥既熟草兒曰止歲生一曰如帶稍根而堅瘦可以辟穀不耕創南方物質云

其自賊若有羞狀○別有羞
至所錄曰鬼曰生九真山谷及寃句二月八月采根公景曰鬼曰生山谷中八月采陰乾似射于末筆文

大草與此不同則海草也
有似蛤蚧有出錢塘近道者味甘上有茸毛最勝出會稽是興者大而味甘無茸毛力劣今馬目毒

火利大腸治瘡
時受月 瘡享曰射干屬金有不與火行太陰厥陰之積使使結核自消其瘡又治便毒此足厥陰風氣因折於少陰用
珍等曰 射干三寸與生薑同煎食前服利三兩行其效時珍曰射干能降火故古方治喉痺咽痛爲要藥孫真人千金

方治喉痺有烏鬚當仲景金匱玉函方治欬而上氣喉中作水雞聲有身于麻黃湯又治癰疽
黃芩煎丸亦用烏鬚燒過皆取其降厥陽相火也火降則血散腫消而痰結自解癰疽自除矣
附新八
喉腫痛乾乾為未吹之如

神袖
傷寒因閉
腫痛生刺于猪脂各四兩合煎令
去滓每溫裏許取瘰
麗安常傷寒論
瘰癧不通
藥水不入外臺松要用木子一升急煎汁服之置之不取服不瘰癧
根搗汁煮之大附動即解或醋研汁噙引延出亦妙○便民方用紫
珍方

蠅蝶根一錢 益母草生甘草各五
分 為末水調頓服之愈 名奪命散
二便不通 蘇線不效 穿夜扁八枚 生水
煮服 大 蠅 汁服一盃水即下 肘後方
陰腫 月 腫痛

如刺用生射干搗汁服之刀重辟竹根如傷者老同營草林煮
 取利亦可丸服 肘後方 望權本 月未蜜調傅之神効 永類方 中射毒 生肌者生肌者 升溫服以滓傅瘡上 姚僧坦集驗方

尾 本經無名。今人呼爲馬尾。

下品 一名烏圓。根如馬尾，故名。

烏圓圖 烏圓草，一名烏圓。根如馬尾，故名。

根如馬尾 此草所在有之。人家

各鳥園當作鳥圓 是一種方用烏頭當是其根體相似而木草不顯。按曰：此草所在有之。人家

亦種葉似茅干而滑不托長子莖紫黑色相似高麗草其花白如銀
名爲尾根各處頭亦謂之蒼根華以射干布地生黑根似高粱畫節大數箇相連九月十月采根日乾時珍曰此即射干之苗非別

強分陳延之小品方言東海鶯頭即由跋者亦訛也東海出之故耳

氣味苦平有毒

主治 蠱毒疔氣瘕疔諸瘡癰疽利腸去水

下三蟲殺鬼疔瘡並註錄新一升戶遊蟲摩病處令血出為佳陳藏器本草拾遺鬼牙藥牙良君子防葵為末酒服方寸匕

增一分立險不可多服 陳廷之小品方

玉簪綱目一名仙鶴花時珍曰並以集韻上紋如車前葉青白色頗嬌瑩六七月抽莖莖上有細葉中出花朶十數枚長二三寸本小末大

未開時正如白玉燈頭管形又如羊肚磨姑之狀開時微綻口出中吐黃蕊頗香不結子其根連生如鬼白射干生薑華有鬚毛舊生則根有一白新根生則舊根腐亦有紫花者葉微硬皆鬼白射干之屬

根氣味甘辛寒有毒 治瘡疥眼鮮一切毒下骨硬癰腫 時珍曰新乳癰初起內消花即玉簪花取根搗婦人斷產白鶴仙根白鳳

紫威二錢半辰砂二錢搗末蜜和丸梧子大產內三十 解斑毒 玉簪根搗水服之即 下魚骨 玉簪花根山裏紅果根同搗自蒸汁以

日以酒半盞服之不可着牙齒能損牙齒也 摘玄方 玉簪根乾者一錢白矾三分白礬七分蓬砂二分威靈仙三分單 坤生意 刮骨取牙 烏頭一分半為末以少許點瘡處即自落也 余居士退奇方

葉氣味苦 治蛇蝎螫傷搗汁和酒服以渣傳之中心留孔洩氣 時珍

鳳仙 綱目釋急子 救 旱珍珠 綱目金鳳 綱目小桃紅 救 夾竹桃 救 海狗 救 染指甲草 救 納婢 時珍曰其花頭翅尾足具翹然如鳳狀故

如小桃老則迸裂故有指甲急姓小桃諸名宋光宗李后諱 鳳宮中呼為好女兒花張范丘呼為菊婢畫眉呼為羽客 時珍曰鳳仙人家多種之極易生二月下子五月可再種宜高二三尺 間開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自變易狀如飛禽自夏初至秋盡開謝相續結實繁然大如櫻桃其形微長色如毛桃生青 熟黃犯之即自裂皮卷如拳包中有子似蘿蔔子而小褐色人采其肥莖均醃以充為笋嫩華酒浸一宿亦可食但此草不生虫蠹蜂蝶 亦不近恐亦 不能無毒也

子氣味微苦有毒 治產難積塊噎膈下骨哽透骨通氣 時珍曰鳳仙子其性急速故能透骨救急危人今魚肉硬者投

服者不可着齒也 附方 新 產難催生 鳳仙子二錢研末水服勿近身外以噎食不下 鳳仙花子酒浸三宿曬乾為末酒丸綠豆大每服因 多用亦殺人咽 兒麻子隨年數搗塗足心 集簡方 八粒溫酒下不可多用即急性子也 摘玄方

中骨哽 欲死者白鳳仙子研水一大呷以竹筒灌入咽 牙齒欲取 金鳳花子研末入碗少許小兒疳積 急性子水缸花子大黃各一兩俱 其初即軟不可經久或為末吹之 普濟方 摘玄方 生研末每味取五錢外用皮消一

兩拌勻將白鴉鴉一箇或白鴉亦可去毛屎剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用線紮定沙鍋內入水三碗重重紙封以小火煮乾將鴉鴉調焙黃色冷定早晨食之日西時疾飲三日大便下血病去矣忌冷物百日 孫天仁集効方

花氣味甘溫無毒治傷撞酒服即解又治腰脇引痛不可忍者研餅晒乾為末空心每酒服三錢活血消積 時珍方 風濕臥

床不起用金鳳花栢子仁朴消木瓜煎湯洗浴每
日二三次內服偏活寄生易 吳文秋壽精方

根葉氣味苦甘辛有小毒治雞骨哽誤吞銅鐵杖槎腫痛散血通經軟堅透骨 時珍方 新
三咽喉物便金鳳花根嚼爛含嚥貴自下雞骨尤力即以溫水漱

口免損齒也亦治誤吞打木腫痛 鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上一夜血散即愈 聖惠諸病 白鳳仙花連根葉煮膏遇馬有病
銅鐵 危氏得効方 打木腫痛 冬月收取乾者研末水和塗之 葉廷器通變要法 珠其眼四角上即汗出而愈 衛主

易為方

坐墊草 宋圖經曰生江西及滁州六月開紫花結實米其苗入樂其習行後 氣味辛熱有毒主治風痺壯筋骨兼治打撲傷損
經 因入用有効今頗貴重時珍曰按一統志云出吉安永豐縣

發明 時珍曰神醫普救方治風濕中已有用者時珍曰危氏得効方麻藥膏酒方中用之聖濟錄治脇上虛熱咽喉嚔塞小便赤澀神困多
睡有坐墊草丸用坐墊草大黃赤芍藥木香升麻麥門冬黃芩木通酸棗仁黃仁枳殼等分為末蜜丸梧子大每服二十丸麥門冬

湯附錄 時珍曰按周家榮辛雜志云吳北回回地方有草名押不盧上人以少許磨酒飲即通身麻痺而死加以刀斧亦不知至
下 三日則以少藥投之即活御藥院中亦備之貪官汚吏罪甚者則服自日丹皆用此也昔華佗能割腸祿曾豈不有此等

耶藥

曼陀羅花 綱目釋名風茄兒 山草 時珍曰去華經言佛說法時天雨曼陀羅花又道家北斗有陀羅星使者手執此 集解 時珍曰
目 花紋後人因以名花曼陀羅花言雅色也始乃因葉形而姚白聲花品呼為惡客 曼陀羅

生北土人家亦栽之春生夏長獨莖直上高四五尺生不旁引綠葉碧葉如茄葉八月開白花凡六瓣
狀如牽牛花而大橫花中折斷葉外包而朝開夜合結實圓而有丁楊中有小子八月采花九月采實

花子氣味辛溫有毒主治諸風及寒濕脚氣煎湯洗之又主驚癇及脫肛并入麻藥

耐更令一人或文武舞引之乃驗也八月采此花七月采大麻子花陰乾等分末熟酒調服三錢少頃昏如醉到瘡灸火宜先服此則不覺也

重一字天麻二錢半全蝎炒十枚天南星炮丹砂乳香各二錢半為末每服半錢酒湯調下御藥院方大腸脫工曼陀羅子連殼一對搗斗十六箇同對水

羊躑躅本經下品釋名黃躑躅綱目黃土鴿菜羊不食草拾開華花綱目老虎花綱目玉枝別錄曰羊食其葉躑躅

行山川谷及淮南山三月采花陰乾置日道通諸山皆有之花黃似鹿角不可近服曰花亦不似鹿角正似旋花已黃者也保真曰

小樹高二尺葉似桃葉花黃似瓜花三月四月采花日乾鋪曰所在有之春生苗似鹿角葉似紅花草高三四尺夏開花似凌霄花山

榴華正黃色羊食之則死今嶺南蜀道山谷過生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥時珍曰羅保昇所說似桃葉者最的其花五出

氣味辛溫有毒花相相似者識之其說似羊躑躅未知是否要亦其類耳

花氣味辛溫有毒伏丹砂礞砂雖黃是危子主治賊風在皮膚中淫淫痛濕癰惡毒瘡本經邪氣鬼疰蠱毒

如胡洽治時行赤散及治五癰四滿丸之類并治風諸酒方皆雜用之又治百病風濕等會王酒中亦用躑躅花今醫方持柳湯中多用

之南方治蠱毒下血有躑躅花散云甚勝時珍曰此物有大毒曾有人以其根入酒飲遂至於斃也和劑局方治中風癰瘡伏虎丹中亦

用之不附方風痰注痛躑躅花天南星並生時同搗作餅散上蒸四五遍以稀薑食鹽之臨時取培為末蒸

多服耳附方風痰注痛躑躅花天南星並生時同搗作餅散上蒸四五遍以稀薑食鹽之臨時取培為末蒸

石榴一名映山紅一名杜鵑花
其黃色者即有毒羊躑躅也
羊不喫草
拾遺錄曰生蜀山山谷葉細長在諸草中羊不喫者是也味苦辛溫無毒主一切
風血補益攻諸病者之亦浸酒服時珍曰此草似羊躑躅而云無毒蓋別有此也

光花
本經曰自木部移入此部
名杜光花
別錄曰光花生淮源川合三月三日采花陰乾管曰元根生即耶二月生葉青色如厚則
下品移入此部
亦光花
普去毒
別錄曰光花生淮源川合三月三日采花陰乾管曰元根生即耶二月生葉青色如厚則
移入此部
普去毒
別錄曰光花生淮源川合三月三日采花陰乾管曰元根生即耶二月生葉青色如厚則

性大戟言其似也俗人因其氣惡呼為
頭痛花山海經云首山其草多花是也
華有紫赤白者三月實落毒藥乃生三月采花五月采葉八月九月采根陰乾採其白近道
處處有之苗高三二尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑根正月二月花紫碧色葉未生時收采日乾葉生花落即不堪用也
有之宿根舊枝葉長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花
而細今絳州出者花黃謂之黃花時珍曰顧野王玉篇云元木出豫章葉似鐵果及卵不壞洪遵齊民要術云今饒州參云元木用
處處有之莖幹不純是木小入爭聞者取其葉按擦皮膚腫如被傷以証人至和鹽擦卵則又染其外若橘色也
可近眼時珍曰光花留數年陳久者良用時以好醋煮十數
沸去醋以水浸一宿晒乾用則毒滅也或以醋炒者次之
氣味
辛溫有小毒
別錄曰苦微溫管曰神農黃帝雷公云有毒扁鵲岐伯
苦李當之有大毒多服令人洩之才曰決明為之使反

甘
主治欬逆上氣喘鳴喘腫短氣毒瘡癰腫殺蟲
經本
消胸中痰水毒唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒根療

疥瘡可用毒
別錄治心腹脹滿去水氣寒痰涕唾如膠通利血脉治惡瘡風濕濕一切毒風四肢攣急不能行步
大
增療欬嗽瘡瘡明治水

飲痰辟脇下痛
時珍曰張仲景治傷寒太陽證表不解心下水氣乾嘔發熱而欬或喘或利者小青龍湯主之若夫已解有時
珍發明
頭痛出汗惡寒心下水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者十棗湯主之益小青龍治未發散表即使水氣自毛裏

而出乃內經所謂開鬼門法也十棗湯驅逐寒邪使水氣自大小便而洩乃內經所謂潔淨府去陳莖法也夫飲有五皆由內吸水漿外
受濕氣鬱蓄而為留飲流于肺則為支飲令人喘欬寒熱吐沫皆寒流于肺則為懸飲令人欬唾痛引肋脇兩脇流于心下則為伏飲令
人胸滿嘔吐寒熱重流于腸胃則為痰飲令人腹鳴吐水胸脇支滿或作泄瀉忽忽肥忽瘦流于經絡則為溢飲令人沉重注痛或作水
氣肘腫元花大戟甘遂之性逐水洩濕能直達水飲巢元方陰陽之處但可徐徐用之取効甚捷不可過劑洩人真元也陳言三因方以十
棗湯藥為末用棗肉和丸以治水氣喘急浮腫之證益喜變通者也楊士瀛直指方云破癰須用光花行水後便養胃可也
肺腎脾三經所生有五臟六腑十二經之部分上而頭中而四肢下而腰腳外而皮毛中而肌肉內而筋骨脉有尺寸之殊浮沉之別不

可輕當知病在何經何臟方可用之若誤投之則害深矣花與甘草相反而湖洽居士
方治痰癖飲癖以甘遂大戟花大黃甘草同用蓋欲其大吐以泄濕因相反而相激也
時珍曰花乃下品毒物豈堪各
服此方外迂怪之言不足信也 附方 舊五新
卒得效嗽 花一升水三升煮汁一升以棗十

酸鹹物 張 暴傷寒冷喘嗽失音取花連根一虎口切暴乾令病人以薦自裹吞令反
文 中備急方 喘嗽失音 飛揚八其七孔中當眼淚出口鼻皆辣待花根盡乃止病即愈 古今錄驗 乾嘔脇痛 傷寒有時頭痛心下痞滿
不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之花花煎甘遂大戟各等分爲散以大棗十枚水一升半煮取
八合去渣納樂強人服一錢載人半錢平旦服之當下利病除如不除明旦更服 中景傷寒論 水腫支飲 及腐飲用十棗湯加大黃

枝同煮如法服一方加芒 天行煩亂 凝雪湯治天行事病七八日執積胸中煩亂欲死用花一斤水三升煮取
硝一兩 胡洽百病方 一升半清故布薄胸上不過再三薄刺則除當溫四肢護厥逆也 千金方 久瘧結 瘧在腹脇堅痛

兩味砂五錢爲末密丸梧子 水蠱脹滿 花枳殼等分以醋煮花至爛乃下枳殼煮 發黃心懊痛足脛滿花椒目等
大每服十丸漿湯下 直棗 水蠱脹滿 爛橘丸梧子大每服三十九白湯下 普濟方 酒澹尿黃 發黃心懊痛足脛滿花椒目等

間痛 一點痛不可忍者花根根末米醋調傳之如 諸般氣痛 烏梅湯下婦人血氣痛當歸酒下諸氣痛香附湯下小腸氣痛茴香湯下
仁 鬼胎瘕瘕 經候不通花根三兩炒炒黃爲末每服一 催生胎 花根根刺皮以綿裹點腐香合入 產後惡 勿不下花當歸等分炒

存 鬼胎瘕瘕 錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈 聖惠方 痛生妙用方 產後惡 勿不下花當歸等分炒
集 心痛有蟲 花一兩醋炒雄黃一錢爲末每 牙痛難 諸藥不効花末擦之令熟 白兔頭瘡 花末末猪脂和 癰腫刀起 花末末和膠

癰腫已潰 花根皮皮作摺插入則不 痔瘡乳核 花根一握洗淨入木臼搗爛入少水絞汁於石器中慢火煎成膏將絲線於膏內度過
一夜用不得 生合令膠易竭也 集簡方 痔瘡乳核 以線繫痔當微痛候痔乾落以紙懸懸膏納數內去根常永除根也一方只搗汁浸線
使水 經驗癰疽走 平黃州陳大用所傳 瀕湖集簡方 仁毒初起 花根搗水服以連傳之得下即消 替釐法 甘草煎膏拮

用花大戟甘遂等分爲末醋調別以筆粧其中勿近甘草次日縮小 一切毒 因蛇虫毒氣重染所致用花生研新
又以甘草膏粧小量三次如前仍上此藥自然焦縮 危氏得効方 危氏得効方

又以此甘草膏粧小量三次如前仍上此藥自然焦縮 危氏得効方 危氏得効方

又以此甘草膏粧小量三次如前仍上此藥自然焦縮 危氏得効方 危氏得効方

又以此甘草膏粧小量三次如前仍上此藥自然焦縮 危氏得効方 危氏得効方

又以此甘草膏粧小量三次如前仍上此藥自然焦縮 危氏得効方 危氏得効方

又以此甘草膏粧小量三次如前仍上此藥自然焦縮 危氏得効方 危氏得効方

又以此甘草膏粧小量三次如前仍上此藥自然焦縮 危氏得効方 危氏得効方

諸樣之其具如椒散曰凡用葉勿用尖及學生
青時珍曰范子計然云芥草出三輔青色者善

葉參 藥曰凡使取葉細剉以生甘草水浸二味同盛
人生稀絹袋中數日去二件熬乾用

氣味辛溫有毒 晉曰神農本草公桐君若有毒時珍曰芥草制雖黃雄黃而有
毒誤食害人惟紫河車磨水服及黑豆煮汁服可解其汁澆其

根即爛性
相制也 **主治** 風頭腫乳癰疔瘰癧除結氣疥癩殺蟲

本經療喉痺不通乳雞頭風癢可用沐勿令入眼
別錄治風疽疔氣腫癰血治瘰

癰除濕風不入湯服主頭瘡白是瘰癧與白飲赤小豆為末雞子白調如糊煬毒腫乾更易二甄
權治反膚麻痺煎濃湯淋風蟲牙痛明發

咀頤曰古方治風毒瘰癧諸酒皆用同草今醫家取葉煎湯執含少頃吐之治牙齒風虫及喉痺甚效宗典曰濃煎湯淋滯皮膚麻痺固
曰檀前除毒除毒物以同草重之則死時珍曰古方治小兒傷寒有芥草湯及瑣碎錄云思村王氏之子生七日而兩腎縮入二晉云此

受寒氣而共也以硫黃末沒大研盡其附方舊四賊風腫痺 風入五臟恍惚宜芥草膏主之芥草一斤烏頭附子躑躅各二兩切以水
腹以筒草蛇床子燒烟熏其下部而愈也新五賊風腫痺 和醋一升漬一宿猪脂一斤煎三上三下絞去滓向火以手摩病上三百

度應手即瘥若耳鼻疾可以綿裹
塞之疥癬雜瘡並宜摩之 肘後小兒風疳 疳瘕瘰癧極者日數十發又治大人賊風芥草雷丸各一雞子黃大化頭風之痛 芥草煎湯
入目 風蟲牙痛 肘後方用芥草煎湯熱飲吐之加山椒皮一加獨活一加郁李仁一加芫花一加川椒細辛各等分煎

聖惠方 風蟲牙痛 湯熱漱冷吐之聖惠用芥草半兩皂角三挺去皮子漢椒七粒為末桑肉丸芥子大每以丸塞孔中吐涎取功
應吉核 兩草一兩為末雞子白調塗常上 癰瘡未潰方同上得 乳腫不消芥草小豆等分為末苦
貼之日二易取効止 聖惠方 癰瘡未潰方同上得 乳腫不消芥草小豆等分為末苦

茵芋 本經下品 藥曰凡使取葉細剉以生甘草水浸二味同盛
別錄時珍曰茵芋本因預 別錄曰茵芋生太山川谷三月三日采葉陰乾紅景曰好者出彭城今近

曰出自海鹽形似石南樹生葉厚五六七月未頽曰今雍州絳州華州杭州亦有之春生苗高三
四尺莖赤葉似石榴而極厚之似石南葉四月開細白花五月結實三月四月七月采葉日乾

莖葉氣味苦溫有毒 別錄曰微溫有毒
惟日苦辛有小毒 **主治** 五臟邪氣心腹寒熱瘰癧如瘻狀發作有時諸關節風濕痺痛 本經療之風濕走四肢脚弱

莖葉氣味苦溫有毒 別錄曰微溫有毒
惟日苦辛有小毒 **主治** 五臟邪氣心腹寒熱瘰癧如瘻狀發作有時諸關節風濕痺痛 本經療之風濕走四肢脚弱

治男子女軟腦毒風拘急攣痛

權類

一切冷風筋骨怯弱顛入樂灸用

明考日

因類酒治婦人產後中風有茵類膏風濕諸方多用之

茵陳石南并草香古人治風妙劑

方

治賊風手足枯痺拍擊床茵并附子天雄黃頭風治女暴閉風日名齒痛並治行氣

品而近世罕知亦醫家所缺也

三

治風氣積滯成脚氣發則痛者茵芋葉炒薑以仁各半兩加杏仁一兩羣生子三兩生研末

治居士百病方

五

半兩名為末煉瓦如梧子大每服二十九更重囊漫下即未未再月月耳耳性性本本重重方方

中風 茵芋五兩木防已半斤苦酒
斤煎三上三下膏成每服執

九磨

升清一宿持服四
十遍 千金方

方本經文正併入

也

其本
天豆
別白
能別
會果
能別
水蓮
吳普
音謹
蓮
佳
蓮
葵
郭月
叔
殺
良
另
金
陽
景
臣
生
上
其
葉
肉
短
小
故

石龍

中品

部水董各也木經

春

錄石錄
錄會果錄
錄水錄

又音斤

苦
雅

王璞古木

吾到首甘

上其葉而

為短小故

名菜曰實如桑椹坡地相連錫口頗狹云蟹苦羞也郭璞云即苦羞也未嘗言味甘而此云苦者古人言蟹行如蟹之狀而故名也甚以下皆子名也水羞以下皆畜名也羞作饒食味辛而滑故有椒葵之名唐本草菜部水羞條東

出今依吳善本。年別錄曰石龍生大山川澤石邊五月五日采子二月八月采皮陰乾煎藥曰今出近道子形粗似蛇狀子而扁

草合併為一
 實真好者人言是藥米子也東山石上所生者其葉冷薄短小其子狀如掌庵者色而小辛此乃藥草也
 實真下子者以寸許口藥甚生下羅也五同熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如掌庵氣力劣於山南者陶以細

者俗名水蓬蒿似敗絮女真名三游土人集之曰
者爲真末爲通論又曰蓬菜野生非人所種葉似
散花紫色藏器曰爾雅云蓬菜注云烏頭苗也蘇
恭注天雄亦云石龍芮葉似蓬菜

故石水堂據此則筆端是言頭面水草定是石龍內更非別草也解曰今惟生宛州一輩草堂並書名色雖二三詩人亦未所見乃謂水草非石龍肉也宛州所王者正與本草及陶氏說合爲得其具崇興曰石龍內有兩種水中生者葉先

女子圖墜地生者葉毛而子親入鑪頂水生者陸生者又謂之天灸而補不足葉冷失精時珍曰鮮菜言水韭即石龍而鮮頌非之非矣

漢是善本望石龍為一石水望其說明唐本草萊部所出水望言其苗也生經石龍於二月子也范宗師言阿拉木枝不長王

毒不可食水豆豉名在蘇合散中二葉生五六月一
三葉多細缺江淮人三四月采苗過兩葉葉色為疏四五月開細黃花結小實大如豆狀如初生桑椹青綠色糕散則子甚細如羊

子即石龍崗也宜半走時采之泡子

草部

[illegible]

本草綱目

卷十七下

十四

子

根皮

氣味辛平無毒

晉曰神農本草岐伯酸扁鵲大寒雷公鹹無毒才曰大戟為之使畏茶更蛇蛻皮

治風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿久服輕身明目不老

本經

腎氣補陰氣不足失精惡冷人皮膚光澤有子

別錄

逐諸風除心熱燥

大明

時珍曰石龍芮乃平補之藥古方多用之其功與枸杞覆盆子相埒而世人不知用何哉

水氣味

甘寒無毒

時珍曰微旱苦澆

主治搗汁洗馬毒瘡并服之又塗蛇蝎毒及癰腫

唐本

久食除心下煩熱主寒熱瘧癰瘕瘡結聚氣下瘀血止

霍亂又生搗汁半升服能殺鬼毒即吐出

孟詵

時珍曰葉止霍亂與香豨莨同功香豨即香薷也

附方

舊二

結核氣

葦菜日乾為末油煎成膏摩之日三五度便瘥

孟詵食療 蛇咬傷瘡

梓汁塗之

萬葉術

惡虫不起

胡椒菜葉按之

毛茛

音良

校正

併入毛茛

建草

名毛建草

拾遺

水茛

目毛茛

音

天茛

義

目

綱目

時珍曰

良乃草為頭之苗此章形狀及毒皆似之故為附

莖而有毛也山人截瘰癧葉按貼寸口

集解

藏器曰蘭注鉤吻云或謂毛茛蘇茶云毛茛是有毛石龍芮內也有毒與鉤吻無干葦洪百一夜作泡如火燎故呼為天灸自灸

單汁解之又曰毛建草生江東地田野澤畔葉如芥而大上有毛花黃色子如瘰癧時珍曰毛建草莖即今毛茛也下濕處即多春生苗高者尺餘一枝三葉葉有三尖及細缺與石龍芮葉樣但有細毛為別四五月開小黃花五出其光艷結實狀如欲旋青紫樣如有尖峭與石龍芮子不同人以為鵝不食草者大誤也方士取汁煮砂伏硫沉存中筆談

所謂石龍芮有兩種水生者葉光而末圓陸生者葉毛而末銳此即葉毛者宜辨之

命生海中亦色者未悉其

子有大毒令無的識者

葉及子氣味辛溫有毒主治惡瘡癰腫疼痛未潰搗葉傳之不得入瘡令肉爛又瘡人以一握微碎縛於臂上男左女右勿

令近肉即使成瘡和薑搗塗腹破冷氣

藏

牛扁

本經下品。藥為特。別錄曰牛扁生佳陽川分弘廣。今人不復識此。今曰此藥似玉草石龍。其根如桑。而細生。平

等二月八月。本根日乾。謂曰今路州一種。便特六月有花。八月結實。其氣味苦微寒。無毒。主治身皮瘡。熱藥可作浴湯。殺牛虱。小蟲。又

根節。糯米油調。殺蟻。虱。主瘡。大都。相似。即扁特也。但聲近。而字訛耳。氣味苦微寒。無毒。主治身皮瘡。熱藥可作浴湯。殺牛虱。小蟲。又

療牛病

本經下品。藥為特。別錄曰牛扁生佳陽川分弘廣。今人不復識此。今曰此藥似玉草石龍。其根如桑。而細生。平

蕁麻

本經下品。藥為特。別錄曰牛扁生佳陽川分弘廣。今人不復識此。今曰此藥似玉草石龍。其根如桑。而細生。平

冬不凋。按。氣味辛。苦。寒。有大毒。吐利。人。不止。治。蛇。毒。搗。塗。之。項。瘰。初。起。以。此。點。之。一。夜。皆。失。時

格注草

唐本。集解。曰。出。魯。山。澤。間。葉。似。酸。棗。根。紫。色。若。紫。草。根。一。株。氣。味。苦。溫。有。大。毒。治。瘰。癧。諸。毒。瘡。癰。等。本

海芋

本經下品。藥為特。別錄曰牛扁生佳陽川分弘廣。今人不復識此。今曰此藥似玉草石龍。其根如桑。而細生。平

俗呼為觀音蓮。方士號為阿仙。云可變金。其根似芋。魁大者如升。莖長六七寸。莖野芋之類也。更芋玉冊云。蓋天草。陰草也。生江廣。深

谷。潤。達。其。葉。極。大。可。以。禦。雨。其。葉。紫。色。花。如。蓮。花。根。葉。皆。有。大。毒。可。燉。粉。霜。味。小。者。名。野。芋。宋。祁。海。芋。贊。云。木。鈴。芋。葉。極。肥。厚。晨。露

弗。載。可。氣。味。辛。有。大。毒。生。治。瘰。癧。毒。腫。癰。伏。砂。時。珍。附。錄。海。芋。根。金。昔。有。人。采。藥。誤。斫。此。草。刀。刃。黃。軟。成。金。也。又。唐。辛。玉。冊。云。透。山。根

出。武。都。取。汁。熬。鐵。立。成。黃。金。有。大。毒。人。誤。食。之。化。為。紫。水。又。有。金。與。草。亦。生。蜀。中。狀。如。馬。齒。見。而。色。紅。模。鐵。成。金。亦。有。大。毒。入。口。殺。人。須

史。為。紫。水。也。又。何。遠。春。者。紀。聞。云。劉。均。父。吏。部。龍。圖。閣。成。金。以。草。煎。之。亦。成。金。又。臨。安。僧。法。堅。言。有。毒。過。於。晉。山。中。見。一。蛇。腹。脹。滿。一。草。以。腹。磨。之。而。消。念

此。草。必。能。消。脹。取。置。羅。中。夜。宿。宿。間。時。為。有。人。病。腹。脹。叩。吟。以。釜。煎。藥。一。盃。與。服。頂。之。不。復。聞。聲。急。已。矣。矣。至。旦。視。之。其。人。血。肉。俱。化

鈎吻

本紅
下品

本
經

吳同

經方易學

經
目
黃
茶
目
經

火把花之

也時珍曰

此草雖名曰

人唯功也

根之野者

或作治易

王充論衡

云治地名也在東南山說其通處名謂之胡蔓草亦曰新楊草人畜腹內即粘腸上集至時珍曰鉤吻生傳高山谷及會稽東野折之

半日則煙燭又名爛勝子其製法用人把花因其花紅而性熱如火也出外謂之燒花其青煙出者名爲活二月八月未嘗三秦鉅

一名降卒幸越山入其石山或越州城望赤里大將軍而奔其色正乃牙之至三聖曹生杜州以善村期老屋居有年久遠矣

則者頂下成之新者斤之無差氣煙手以交則前臺起煙骨之細孔中出今新句記根亦然本草言折之青烟起者名固汚為良亦不違

月者歲可之歲也。二八月女食之。以爲子。其言也人誤食其藎者致死而羊食其藎大肥。物有相伏如此。博物志云。狗吻蔓生葉似鬼葵是也。時珍曰。稽含荀方草木狀云。野葛之

生葉如羅勒光而厚一名胡蔓草人以雜生蔬中毒人半日輒死段成式酉陽雜俎云胡蔓草生邕州容州之間叢生花扁如卮子而稍

大不成果多黃白其葉稠厚又接續而衛主方云胡蔓草葉如茶其花黃而小一葉入口自覺清血人無復生也時珍又訪之蜀人云釣

叨即胡蔓草今人謂之斷腸草是也蔓生葉圓而大春夏嫩苗甚秋冬枯老後綴五六月開花紅樺柳花數十朵正吳弘景曰五月經

作穗生。幸者花黃生。幸者花紅。此二種皆屬雜種。合陰陽氣而生。分判主正于下。

三、示言。曰。是更

由是黃色切主頭黃青丈人未多或之遂致死生之反武云胡物是毛良參錯不同未詳云何我曰凡使審精勿用鈎吻直似黃精只

是葉有毛鉤子二個若摘葉似竹葉又曰凡使鉤吻勿用地精連苗相同鉤吻治人身上亞毒瘡其地精殺人也不曰鉤吻蔓生葉如柿

聞言飛鳥不集豈要也黃精直生葉似柳及龍膽草殊非比類色淺乃有毛石龍泊與鉤吻何子頌曰王勃人說黃精莖苗稍類鉤吻曰

鉤吻菜頭極大而根細與蘇茶所說不同恐南北之產異也禹錫曰陶說鉤吻似黃精者當是蘇說似柿菜者別是一物也又言苜蓿名鉤

吻根名野薑者亦非通譯珍曰神農本草鉤吻一名野薑一句曰草本狀又名胡蔓草縣是據生吳普鮪所記正合李文隱氏

韓生爲野葛又指小蛇爲蛇吹微疑是瓦良刀在重寶之說諸家遂無定見不如其養生小學朴去遠也其陰雷所說乃是一種有毒

普曰聖藥最有毒殺人特珍曰其性大熱毒藥止云有大毒三豆毒山毒云氣次毒二氣之重是也

氣味辛溫大有毒
此獨變文曰大有毒可見其毒之甚常也之才曰半夏為之使惡黃芩
主治金瘡疔瘡中惡屢效逆上奔冲腫痛

三聖事 本史文責余即恭宣而曰支句筆之來其後乃狀篇十八書中不入易次別主接軍因墨是書變吳愛曰藏器曰鈎吻食某飲

痘毒經年，癰疽疔瘡，月形痛，口四月，不食，是病所乘。六十二歲，二月廿三日，口雲舌赤，等症。日冷水即愈，冷水發重。

毒也彼土毒死人懸尸樹上汁滴地上生菌子收之各因藥列於野葛也羅米揭汁解野葛毒取汁滴野葛苗即垂死初人先食羅米後食野葛二物相伏自無害魏武帝噉野葛至尺先食此菜也薛珍曰按李石續博物志云胡蔓草出二廣廣人負債急母食此草而死以証人以急水吞即死急慢水吞死稍緩或取毒蛇殺之覆以此草澆水生菌為毒藥害人葛洪肘後方云凡中野葛毒口不可開者取大竹筒洞節以頭柱其兩脇及胸中灌冷水入筒中數易水須臾口開乃可下藥解之惟多飲甘草汁人尿汁白鴨或白鵝斷頭漉血入口中或羊血灌之嶺南衛生方云即時取雞卵抱未成雞者研爛和麻油灌之吐出毒物乃生稍遲即死也

本草綱目草部第十七卷下終

本草綱目草部目錄第十八卷

草之七

蔓草類七十三種

附十九種

菟絲子

本經
雞火蘭附

五季

本經

蓬蘽

本經

覆萼

別錄

懸鉤子

拾遺

蛇莓

別錄

使君子

開寶

木鼈

開寶

蒼木鼈

綱目

馬兜鈴

開寶即土
青木香

榼藤子

開寶

預知子

開寶

牽牛子

別錄

旋花

本經太乙金
鎖即鼓子花

紫葳

本經
即凌霄花
骨路支附

營醬

本經

月季花

綱目

桔梗

本經即
天花粉

王瓜

本經即
土瓜

葛

本經

黃環

本經即
鼓跋子

天門冬

本經

百部

別錄白
并附

何萵

別錄

草薺

別錄

菝葜

別錄

土茯苓

綱目

白飯

本經

女萎

李當之

楮魁

本經

穉范

圖經

伏雞子

拾遺仰盆
人肝藤附

千金藤

開寶陳
鬼炭附

九仙子

綱目

山豆根

開寶

黃鱉

開寶

解毒

唐本即苦藥子
奴會子藥實根附

白蘼

唐本
陳甘白藥
會州白
衝洞根
突厥白附

威靈仙

開寶

黃蘗本經 血藤附

蔓草日華

芎藭本經

通草本經

通脫木法象天 毒根附

鉤藤別錄倒 桂藤附

黃蘗綱目

白朮本經

白花藤唐本

白英本經即鬼 目排風子

蘿藦唐本

赤地利唐本

紫葛唐本

烏斂唐本即 五葉藤

雀草唐本

羊桃本經

絡石本經

木蓮拾遺地 錦附

扶芳藤拾遺

常春藤拾遺

千歲藥別錄

忍冬別錄即 金銀花

甘藤嘉祐 甘露附 甜藤

含水藤海藥

天仙藤圖經

紫金藤圖經

南藤開寶 烈節附

清風藤圖經

百稜藤圖經

省藤拾遺

紫藤開寶

落鴈木唐本 延母 折傷木 風 每始王木附

千里及拾遺即 千里光

藤黃拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤二十九種

本草綱目草部第十八卷上

草之七

蔓草類七十三種附一十九種

菟絲子

本經上品釋名菟絲別錄菟蘿經菟蘿廣赤綱別錄玉女蘭雅慶爾雅火燒草綱目野狐絲綱金線草禹錫曰按呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是

也抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得生於上然實不屬也伏菟抽則菟絲死又云菟絲初生之根其形似菟握故割其血以和丹服立能變化則菟絲之名因此也○弘景曰舊言下有茯苓上有菟絲不必爾也○頌曰抱朴所說今未見豈別一類乎孫奕釋爾雅云唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本草唐蒙為一名詩云蒿與女蘿毛長云女蘿菟絲也而本草菟絲無女蘿之名惟松蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫漏乎震亨曰菟絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而生不相關涉皆承誤而言也時珍曰毛詩註女蘿即菟絲吳普本草菟絲一名松蘿陸佃言在木為女蘿在草為菟絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以為一物故也張揖廣雅云兔耳菟絲也女蘿松蘿也陸機詩疏言菟絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見不部松蘿下又菟絲茯苓說見茯苓別錄曰菟絲子生朝鮮川澤田野蔓延草木之上九月果實暴乾色黃而細者為赤綱色淺而大者為菟蘿功用並同弘景答下集解曰田野墟落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上其實仙經俗方並以為補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮大明曰面望似黃絲無根株多附田中草被纏死或生一葉開花結子不分明子如碎黍米粒八月九月以前采之頌曰今近道亦有之以菟句者為勝夏生苗初如細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄生空中或云無根假氣而生信然時珍曰按盧獻王庚辛玉冊云火燒草即菟絲子陽草也多生荒園古道其子入地初生有根及長延草物其根自斷無葉有花白色微紅香亦與人結實如粒豆而細色黃生於梗上尤佳惟懷孟林中多有之入藥更良

子修治

微曰凡使勿用天碧草子真相似只是味酸澇并粘也菟絲采得去殼了用苦酒浸二日漉出以黃精自然汁相對沒一宿至再研末或云曝乾時入紙條數枚同搗即刻成粉且省力也

氣味

辛甘平無毒之才曰得酒浸善隨主治續絕傷補不足益氣力肥健

人本

經養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘港口苦躁渴寒血為積久服明目輕身延年別治男女虛冷添精益髓去腰疼膝冷消

霜一重其味酸鹹苦辛甘皆全者為真也時珍曰五味今有南北之分南產者色紅北產者色白

黑入滋補藥必用北產者乃良亦可取根種之當年就旺若二月種十次年乃壯旺以架引之

時珍曰入補藥熟氣味酸溫無毒好古曰味酸微苦鹹味厚氣輕陰中微陽入手太陰血分足少陰氣分時珍曰酸鹹入

用入嗽藥生用氣味酸溫無毒肝而補腎辛苦入心而補肺甘入中宮益脾胃之才曰提提為之使惡惡變勝馬頭

上氣傷癰瘰補不足陰益童子精本養五臟除熱生陰中肌治中下氣止嘔逆補虛令人體悅澤

消食反胃霍亂轉筋瘧疾冷熱消水腫心腹氣脹止渴除煩解酒毒大生津止渴治渴痢補元氣不足收耗散之氣腫子散

治喘嗽壯水鎮陽好威無已曰肺欲收急食酸以收之以酸補之芍藥五味之酸以收逆氣而安肺果曰收肺氣補氣不足升也

外和者不可驟用恐閉其邪氣必先發散而後用之乃良有痰者以半夏為佐喘者阿膠為佐但分兩少不同耳宗爽曰今華州以西至

秦多產之方紅熱時彼人采得蒸爛研濾汁熬成稀膏量酸甘入蜜煉白待冷收器中肺虛寒人作湯時飲之作果可以寄逸本經言

其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其除熱氣曰華子謂其暖水臟除煩熱後聖至此多感今既用治肺虛寒則更不取其除

熱之說唐李時珍曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非除熱乎補腎非暖水臟乎乃火熱嗽必用之藥應氏所謂食之多致虛熱

者蓋收補之勝也何哉之有又黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五味子倍子欽而降之愚選曰五六月宜常服五味子湯以益

肺金之氣在上則滋源在下則補腎其法以五味子一大合木白搗細蕪棗中以百沸湯投之入少蜜封置火邊良久湯成任飲元素曰

孫真人千金月令言五月常服五味以補五臟之氣過夏月季夏之蘭國之無力無氣以動與黃芩麥門冬少加生薑煎湯服之使人

精神頓加兩足筋力涌出也蓋五味子之酸補人參能瀉而火而補庚金收斂耗散之氣好古曰張仲景八味丸用此補腎亦東垣類象

形也機曰五味治喘嗽分南北生津止渴潤肺補腎勞教宜用北者風寒在肺宜用南者價微白范附方新久嗽肺脹五味二兩

朴子云五味者五行之精其子有五味淮南公美門子服之十六年面色如玉女入水不害火火不灼附方新久嗽肺脹五味二兩

妙過半而為末白鰈丸彈子大每服一丸水煎服衛生家腎方久欬不止丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風化消各二錢為末乾嚙攝生方用五味子

服一丸水煎服衛生家腎方久欬不止丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風化消各二錢為末乾嚙攝生方用五味子

服一丸水煎服衛生家腎方久欬不止丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風化消各二錢為末乾嚙攝生方用五味子

服一丸水煎服衛生家腎方久欬不止丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風化消各二錢為末乾嚙攝生方用五味子

上可御十女四時勿絕 腎虛精 北五味子一斤洗淨水浸投去核再以此水洗核取盡餘味通置砂鍋中布濾過入好冬蜜二斤藥功能知 千金方 腎虛精 北五味子一斤洗淨水浸投去核再以此水洗核取盡餘味通置砂鍋中布濾過入好冬蜜二斤

及兩臂并背脊骨痛五味子一兩炒赤為末醋糊丸梧子大每醋湯下三十九 經驗良方 五重腎泄 凡人每至五更即溲泄一二次經年不止者名曰腎泄蓋陰虛而然脾虛濕

吳美史以除脾濕則泄自止矣五味子去便二兩末更湯泡七次五錢同炒香為末每日陳米飲服二錢 許叔微本事方 女人陰冷 五味子四兩為末以口中玉泉和丸 爛玄風 五味子蔓荊子前

翁種 赤遊風丹 漸漸腫大五味子焙研熟酒服 服一錢自消相效 保如大全

蓬蘽 音榮口本 校正 白果部 移入此 蓬蘽 別錄曰蓬蘽生則山平澤及荒甸私景曰蓬蘽是根名方家不用乃昌客所服以易顏者也蓬蘽是實名李當之

也其實八月始熟 傳 蓬蘽 別錄曰蓬蘽生則山平澤及荒甸私景曰蓬蘽是根名方家不用乃昌客所服以易顏者也蓬蘽是實名李當之

根也李云母子者近之矣然生處不同沃地則子大而甘瘠地則子細而酸此乃子有酸味根無酸味陶以根酸子甘列入果部重出二

條殊為孟浪志曰蓬蘽乃覆盆之苗蓬蘽盆乃蓬蘽之子也按切韻每音茂其子覆盆也蔓者藤也則蓬蘽明是藤蔓矣陶言蓬蘽是根

蘇言是子一物異名皆非矣謂曰蓬蘽是覆盆盆處處有之秦吳尤多苗短不過尺蔓葉皆有刺花白子亦黃如半彈丸大而下有蒂

之如柿蒂小兒多食之五月果實其苗葉米無時江南謂之毒然其地所生差晚三月始有苗八九月花開十月實開則同士良曰今

采取之家說蓬蘽似覆盆子紅色而大其味酸甘葉似野薔薇有刺覆盆子小其苗各別諸家本草不識故皆說蓬蘽是覆盆子之根天

明曰母子是蓬蘽子也樹海是覆盆子也常與曰蓬蘽非覆盆也別是一種雖苦敗而枝梗不散今人不見用此誠器曰其類有三種

四月熟狀如覆盆而味甘美者為是覆盆子餘不堪入藥機曰蓬蘽藏人謂之寒海沿聖作蔓蔓生蔓小葉密多刺其實四五十顆作一

覆盆子陶雅所謂蓋缺盆也此二種者俱可入藥一種蔓小於蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名蔣田廬即爾雅所謂蘘者也故郭璞註云蘘即每也子似覆盆而大赤色酢甜可食此種不入藥用一種樹生者樹高四五尺葉似櫻桃葉而狹長四月開小白花結實與覆盆子一樣但色紅為異俗亦名蘘即爾雅所謂山莓陳藏器本草所謂懸鉤子者也詳見本條一種就地生蔓長數寸開黃花結實如覆盆而鮮紅不可食者本草所謂蛇母也見本條如此辨析則蓬蘽覆盆自定矣李當之陳士良陳藏器寇宗奭汪機五說近是而久明志陶弘景以蓬蘽為根覆盆為子焉上蘇頌以蓬蘽為苗覆盆為子蘇恭以為一物大明以樹生者為覆盆皆臆說不可據

氣味酸平無毒
別錄曰鹹生良曰甘酸微熱
主治安五臟益精

氣長陰令人堅強志倍力有子久服輕身不老

本經瘰癧中風身熱大驚

別錄益顏色長髮耐寒濕

發明見覆盆子

附方新長髮不落

蓬蘽子榨油日

塗之
聖惠方

苗葉

同覆盆

覆盆子

別錄曰自果部移入此
釋名
蓋
爾雅
缺盆
爾雅
西園草
爾雅
畢楞伽
爾雅
大麥
爾雅
母
插覆
爾雅
烏蘘子
爾雅

狗屎如此取名也時珍曰五月子熟其色烏赤故俗名烏蘘大麥集解曰五月采藏器曰佛說蘇悉那陀點燈正言此花也此花有蔞插田廬亦曰栽秧蘘艸權本草一名馬廐一名淫制殊無義意三種以四月熟狀如覆盆味甘者為是餘不堪入藥令人取芽蒔當覆盆誤奏宗奭曰處處有之秦州永興華州尤多長條四五月紅熟山中人及時采采實其味酸甘外如荔枝大如櫻桃較紅可愛失時則就枝生蛆食之多熟收時五六分熟便可采烈日曝乾今人取汁作煎為果米時着水則不堪煎時珍曰蓬蘽子以八九月熟故謂之割田蘘覆盆以四五月熟故謂之插田蘘正與別錄五月采相合二蘘熟時色皆烏赤故正吳說曰覆盆江東名懸鉤子大小形狀能補精其四五月熟而色紅者乃蔞田廬也不入藥用陳氏所謂以蔞當覆盆者蓋指此也

正氣
氣味功力同北土無懸鉤南地無

盆是土地有前後生非兩種物也時珍曰南土度盆陸多懸鉤是樹生

修治
說曰覆盆子五月采之烈日曝乾不爾易爛當曰凡使用東

覆盆是藤生子狀雖同而覆盆色烏赤懸鉤色紅赤功亦不同今正之

流
流水淘去黃葉并皮蒂取子以酒拌蒸一宿以東流水淘兩

遍入晒乾方用時珍曰采得搗作

氣味甘平無毒
性微熱

主治
氣弱身令髮不白

別錄補虛續絕強陰健陽悅澤肌膚安和五臟

中

益力療勞損風虛補肝明目並宣揚師每旦水服三錢志男子腎精虛竭陰痿能令娶長女子食之有子相食之令人好顏色榨汁塗髮

不自藏蓄臟縮小便取汁同少蜜煎為糖膏點眼治肺無虛寒時珍曰覆盆子酒浸焙研為末每

可混采附方新陽重不起覆盆子酒浸焙研為末每者也一陽重不起旦酒服三錢集簡方

葉氣味微酸鹹平無毒主治按紋取汁滴目中去膚赤出蟲如絲線藏明目止淚收濕氣時珍曰覆盆子酒浸焙研為末每

日暗等疾取西園草一名單枋加一名覆盆子日曝乾搗極細以薄綿裹之用飲男乳汁浸如人行八九里人用點目中即仰卧不過三

四日視物如少年集酒澆油物時珍曰按洪邁夷堅志云漳州趙太尉母病癰疽疳眼二十年有老嫗云此中有虫吾當除之入山取草

蔓葉咀嚼留汁入筒中選以皂紗蒙眼滴汁漬下弦轉盼間虫從紗上出數日下弦附方新牙疼點眼用覆盆子微葉搗汁點目皆三四

乾復如法滴上弦又得虫數十而愈後以治人多驗乃覆盆子葉也蓋治眼妙品附方新牙疼點眼用覆盆子微葉搗汁點目皆三四

乾者煎濃汁亦可即大麥每也摘玄方腫瘡潰爛覆盆葉為末用酸漿水洗後擦之日一次以愈為度直指方

根主治痘後目翳取根洗搗澄粉日乾蜜和少許點於翳丁上旦三次自散百日內治之久即難療時珍曰活

懸鉤子拾自果部遺校正移入此釋名憑鉤子日許商雅山木郭璞樹毒日華藏器曰蔓上集解藏器曰生江淮林澤間莖上有刺其子如

有刺頭類金櫻四五月結實如覆盆子采之擊蒂而中實味酸覆盆則常脫而中虛味甘為異時珍曰懸鉤樹生高四五尺其莖白色有

刺刺其葉有細齒青色無毛背後淡青頗似櫻桃葉而狹長又似地棠花葉四月開小白花結實色紅今人亦通呼為蕁子爾雅云葍山

葍也郭璞注云今之木葍也實似蕁子而大可食並說大明並以此為覆盆誤矣氣味酸平無毒主治醒酒止渴除痰去酒毒搗汁服解射工沙虱毒時珍

根皮氣味辛無毒
治死腹中不下破血婦人赤帶下久患赤白痢膿血腹痛殺蟲卒下血並濃煮汁飲之
藏附方新

不正
木毒根四兩酒一盞煎七分
空心溫服 臍間乾坤生意
婦人痢下
治婦人痢中及下痢日夜數十起欲死者以此入腹即活懸鈎根薤根柿根拔與各一斛
剖入金中水淹上四五寸煮減三之一去滓取汁煎至可丸九梧子大每溫酒服十九日三

服法
金真

蛇莓
別錄下品釋名蛇蘆音地莓會編
蛇蘆
機曰近地而生故曰地莓瑞曰蠶老時熟紅於地其中空
者為蠶毒中實極紅者為蛇殘毒人不敗之恐有蛇殘也
集韻似莓子而不可食亦無以此為藥者

保昇
曰所在有之生下濕地莖頭三葉花黃子赤儼若覆盆子根似敗醬四月五月采子二月八月采根宗典曰田野道旁處處有之附
地生葉如覆盆子但光潔而小微有皺紋黃花比葵藿花差大春末夏初結紅子如荔枝色機曰蛇莓莖長不盈尺莖端惟結實一顆小
而光潔誤食服人非若覆盆莖長大而結實數顆微有黑色也時珍曰此物就地引細蔓節節生根每枝三葉葉有齒刻四五月開小黃
花五出結實鮮紅狀似覆盆而面與帶則不同也其根甚細本草用汁當是取其莖葉並根也仇遠得史訛作蛇繆草言有五葉七葉者
又言俗傳食之能殺人
亦不然上發冷涎耳

汁氣味甘酸大寒有毒
治胸腹大熱不止
傷寒大熱及溪毒射工毒甚良
景通月經協瘕瘰癧傳蛇傷大
明主孩子口噤以汁灌之
蛇莓根

傳湯火傷痛即止
時珍附方新
口中生瘡
天行熱甚者蛇每自然汁半
升稍嗽之 傷寒類要
傷寒下蠱
生瘡以蛇每汁服二合日三服仍水
清烏梅合濃入犀蜜飲之 肘后方
水中毒病
蛇莓根

之并導下部亦可飲汁一二升夏月飲入水先以少未投中流則
更無所畏又辟射工家中以器貯水浴身亦宜投少許 肘后方

使君子
宋開寶釋名留求子
留求子
志曰俗傳潘州郭使君療小兒多是獨用此物後醫家因號為使君子也時珍
曰按稽含南方草木狀謂之留求子療嬰孩之疾則自魏晉已用但名異耳
集韻志曰生交廣等州形如
危子核解深而兩頭尖

似訶梨勒而較碩曰今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其莖作藤如手指大其葉如兩指頭長二寸三月生花淡紅色久乃深紅有
五瓣七八月結子如拇指大長一寸許大類危子而有五棱其壳青黑色內有仁白色七月采之宗典曰其仁味如椰子醫家亦兼用殼

時珍曰原出海南交趾今閩之紹武蜀之眉州皆栽種之亦易生耳藤如葛繞樹而上葉青如五加葉五月開花一簇一十葩紅色輕盈如海棠其實長寸許五瓣合成有較先時半黃老則紫黑其中仁長如樞仁色味甘如栗久則油黑不可用

氣味甘溫無毒 治小兒五疳白濁殺蟲療癰痢 實健脾胃除虛熱治小兒百病瘡癰 時珍曰凡殺蟲藥多是苦辛惟使君柑子甘而殺蟲亦異也凡大人小兒有出病但每月上旬侵晨

空腹食使君子仁數枚或以鼓煎湯嚥下次日虫皆死而出也或云七生七殺食亦良忌飲熱茶犯之即瀉此物味甘氣溫既能殺虫又益脾胃所以能敏虛熱而止瀉痢為小兒諸病要藥俗醫乃謂殺虫至盡無以消食都理之言也樹有蠹屋有蟻國有盜福耶禍耶修養

者先去三尸 附方新 小兒脾疳 使君子虛會等分為末米 飲每服一錢 佛門事親 小兒瘡塊 腹大肌瘦面黃漸成疳疾使君子仁三錢木鼈子仁五錢為末水丸

可類惟矣 楊起簡 小兒蛔痛 口流涎米使君子仁為末米飲 五史調服一錢 全幼心鑑 小兒虛腫 頭面陰囊俱浮用使君子一兩去殼蜜五錢 頭瘡面瘡 使君子仁以香油

便單方 臥時細嚼香油送下 蟲牙疼痛 使君子煎湯頓 久而自愈 普濟方 集驗方

木鼈子 宋開 校正 自本都 移入此 木鼈 志曰其核似鼈 蟹狀故以為名 春生苗作藤生葉有五極狀如山藥青也面光四月生黃花六月結實似桔

槩而極大生青熟紅黃色肉上有軟刺每一實有核三四十枚其狀扁而如鼈八九月采之嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食宗輿曰木鼈子蔓歲一枯但根不死春旋生苗葉如蒲萄其子一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合麻纆定及其生也則去雄者方結實時珍曰木

鼈核形扁端大如蘭基子 其仁青綠色入藥去油者

仁氣味甘溫無毒 時珍曰苦微 甘有小毒 主治打傷消結腫癰瘡生肌止腰痛除粉刺野蠻婦人乳癰肛門腫痛 醋磨消腫毒 大治痔積瘰癧

利大腸瀉痢痔瘡癰瘡 時珍曰微 按劉續雲雪錄云木鼈子有每不可食青刺門有人生二子恣食成瘡其父得一方以木鼈子煮猪

食之無恙則其毒未應至此或者與猪肉 附方 舊一新 酒疸脾黃 木鼈子磨醋服一二盞見 脚氣腫痛 木鼈子仁每個作兩邊麤炒過切

不相得或犯他物而禁不可盡替木鼈也 附方 十九 劉長春濟急方 碎再炒去油盡為度每兩入厚桂

半兩為末熟酒服二錢令醉得汗愈等秘授方也 永類方 濕癰脚腫行履難者木鼈子四兩去皮甘遂半兩為末以猪腰子一個去膜切片用藥四錢在中濕紙色

陰疽偏癰痛甚者木鼈子一個磨醋調黃藥 久瘡有母木鼈子穿山甲炮等分為末每服 腹中痞塊木鼈子仁五兩用豬腰子二副批

末三錢蒸餅和丸綠豆大每 小兒疳疾木鼈子仁使君子仁等分搗泥米飲丸芥子大 疳積目瞤不見物用木鼈子仁二錢胡黃連一錢

雞子食之為 倒睫拳毛因風入脾經致使風痒不住手擦日久赤爛拳毛入內將木鼈子仁極爛以絲帛包 肺虛久嗽木鼈子欬冬花各

錢焚之吸煙良久吐涎以茶潤喉如此五六次後服 小兒驚風大木鼈子三四個磨水飲以雪糕壓 水瀉不止木鼈子仁五個母丁香五個

補肺藥一方用木鼈子一個雄黃一錢 聖濟錄 小兒驚風大木鼈子三四個磨水飲以雪糕壓 水瀉不止木鼈子仁五個母丁香五個

膏納膽中貼之外以膏藥 疾痢禁口木鼈子仁六個研泥分作二分用麵燒餅一個切作兩半只用半餅作一敷納藥在內 腸風瀉血木鼈子

桑葉燒存性候冷為末每服一錢喉急 月日瘡痛孫用秘寶方用木鼈子三枚砂盆搗如泥入百沸湯一盞煎熟先重後洗日用三次仍

白酒空心服之名烏金散 普濟方 月日瘡痛孫用秘寶方用木鼈子三枚砂盆搗如泥入百沸湯一盞煎熟先重後洗日用三次仍

每以一丸嚥化開貼痔上其痛即止一夜一丸自消也 江夏鍾 瘰癧經年木鼈子仁二個去油研以雞子白和入瓶內 兒丹瘡木鼈子仁

佛寺察和尚病此痛不可忍有人傳此而愈用治數人皆有效 瘰癧經年木鼈子仁二個去油研以雞子白和入瓶內 兒丹瘡木鼈子仁

調傳之一日三五 耳熱腫木鼈子仁一兩赤小豆大黃各半兩為 風牙腫痛木鼈子仁磨醋

上效 外科精義 耳熱腫木鼈子仁一兩赤小豆大黃各半兩為 風牙腫痛木鼈子仁磨醋

番木鼈

網釋名馬錢子網苦蜜把豆網火失刻把都時珍曰狀似馬之 隼解時珍曰番木鼈生回國今西土印州諸處皆有之蔓生

小於木鼈而色白彼人言治一百二十種病每證各 有湯引或云以豆腐制過用之良或云龍馬狗至死

仁氣味苦寒無毒主治傷寒熱病咽喉痺痛消痞塊並含之嚥汁或磨水嚥時 附方新喉痺作痛番木鼈青木香山豆根等分

風腫者木實仁一個木香三分同磨水調服膽三分以雞毛掃患處取效唐臨經驗方瘰癧入目苦實把豆兒即馬錢子半個輕粉水花銀硃各五分片腦麝香枯病欲去

胎苦實把豆兒研膏納入牝戶三四寸集簡方

馬兜鈴宋蘭校正併入唐本草獨行根釋名都淋藤時獨行根唐本土書木香唐本雷根綱目三百兩銀藥宗典曰蔓生附木而上葉脫時其實尚垂

利人微有香氣故有獨行木香之名嶺南人用治瘰癧隱其名為三百兩銀藥肝后方作都淋蓋誤傳也集解志曰獨行根生古堤城旁所在平澤叢林中皆有之山南名為土青木香一名

則頭開四系若囊其中實薄而似榆莢其根而長尺許作葛根氣亦似漢防己二月八月采根頌曰馬兜鈴今關中河東河北淮寧浙

州部皆有之春生苗作蔓繞樹而生葉如山積葉而厚大皆白六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實如大棗狀似鈴作四五瓣其根名雲南根微似木香大如小指亦黃色七八月采實暴乾

實修治微曰凡采得實去葉及蔓以生絹袋盛於氣味苦寒無毒權曰平時珍曰微苦辛果曰味主治肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘡

開實肺氣上急坐息不得欬逆連連不止甄權清肺氣補肺去肺中濕熱元發時珍曰馬兜鈴體輕而虛熱則懸而四開有肺之象故能入

散用之非取其補肺乃取其清熱降氣邪去則肺安矣其中所用何膠糯米則正附方舊三水腫腹大日服之千金方肺氣喘急馬兜鈴

補肺之藥也湯劑中用多亦作吐故崔氏方用以吐蟲其不能補肺人可推矣新二水腫腹大日服之千金方肺氣喘急馬兜鈴

兩去殼及膜酥半兩入盃內拌勻慢火炒乾甘草炙一兩一切心痛不拘大小男人大馬兜鈴一個燈上解蛇蠱毒飲食中得之咽中如

為末每服一錢水一盞煎六分溫呷或噙之簡要濟眾一切心痛不拘大小男人大馬兜鈴一個燈上解蛇蠱毒飲食中得之咽中如

心下熱悶兜鈴一兩煎水服疔瘰癧痛以馬兜鈴於瓶中燒烟即吐出崔行功要方重病處良日華本草

獨行根氣味辛苦有毒大明曰無毒志曰有毒主治鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨為泥封之曰三四次立瘥水煮一二兩取

汁服吐蠱毒搗末水調塗腫大效

唐本治血氣明利大腸治頭風瘰癧瘡

附方

五種蠱

附方云瘰癧刺史言嶺南人入多於食中蠱人漸不能

食胸背漸脹先寒似瘧用都淋藤十兩水一斗酒二升煮三升分三服毒逐小便出十日慎食毒物不瘳更服

中草蠱

此術在西良之西及嶺南人中

土人呼為三百兩銀藥又支太醫云覺鈴根一兩為末水煎頓服當吐蠱出未盡再服或為末水調服亦驗

此毒入咽欲死者用覺鈴苗一兩為末溫水調服一錢即消化蠱出神效

聖惠方

腸風漏血

馬兜鈴藤殼精草刺三枝川烏頭炒過三味各等分煎水先重後洗之

普濟方

所傷青木香半兩煎湯飲之袖珍方

楮藤子

宋開寶校正

自木部移入此

釋名豕豆

開寶

楮藤子

拾遺時珍曰其子象楮形故名之

集解

藏器曰按廣州記云楮藤子生廣南山林間作藤着樹如通草藤其實三年方熟角如弓案子若雞卵其外紫黑色

其殼用貯丹藥經年不壞取其中仁入藥又用時珍曰子紫黑色微光大一二十圓而扁人多剔去肉作藥散垂於腰間也

仁氣味滑甘平無毒主治五痔蠱毒飛尸喉痺以仁為粉微熬水服一二七亦和大豆漂面去黠曾藏器治小兒脫肛血痢瀉血並燒灰

服或一枚割瓢熬研空腹熱酒服二錢不過三服必效

開寶解諸蠱毒時珍

附方

喉痺腫痛

楮藤子燒研酒服一錢

五痔下血

楮藤子燒存性

米飲服二錢有冠氏行義

腸風下血

華陀中藏經用楮藤子二箇不蛀皂炙子四十九箇燒存性為末每服二錢溫酒下少頃再飲酒一盞起口服極效

聖惠方用楮藤子三枚厚重者微炙七重白煨熟去殼取肉為末每服一錢食前黃蘗湯下日一服

附錄本草

拾遺藏器曰子及葉有小毒主蠱毒及蛇咬搗傳瘡上蔓生岸旁葉如火花白子中有兩片如合子

預知子

宋開寶

釋名聖知子

華

聖知子

華

仙沼子

日華志曰相傳取子二枚綴衣領上遇有蠱毒則聞其聲當預知之故有諸名時珍曰仙沼疑是仙棗之訛

集解

皮殼其實如皂

英子頗易不著所出州土今淮蜀黔陝諸州皆有之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房生青熟者四面皆深紅色每房有子五七枚如皂英子班褐色光潤如飛蛾今蜀人極貴重之云亦難得采無時其根冬月采之陰乾治蠱其功勝於子也

山民目為聖無憂

子仁

氣味苦寒無毒

大明曰溫嬰仁者可帶

主治殺蟲療毒治諸毒去皮研服有效開治一切風補五勞七傷其功不可備述治瘡瘻氣塊消

宿食止煩開利小便催生惡失音墮落天行溫疾塗一切蛇蟲露咬治一切病每日吞三七粒不過三十粒永瘥

治心氣不足精神恍惚語言錯忘忪悸煩鬱憂愁慘憾喜怒多恐健忘少睡夜多異夢驚即驚厥或發狂眩暴不知人並宜服此預知子去皮白茯苓枸杞子石菖蒲伏神柏子仁人參地骨皮遠志山藥黃精熟地砂水飛等分為末煉蜜丸大者每前一丸人參湯下

和劑局方耳聾聾八九月取石榴開一孔留蓋入米醋滿中蓋定燒火中煨熟取出入少許仙沼子黑李子末取水滴耳中臆痛勿驚如此二夜又點一耳聖惠方

一斗銀鑄實至五升入二末熬成膏瓶盛之每服一匙溫酒調下有虫如尾隨大便而出聖惠方

根氣味苦冷無毒主治解毒石白搗篩每角三錢溫水服之

牽牛子

別錄下品釋名黑丑綱目草金鈴炮炙

金匱草綱目狗耳草

救荒本草曰此藥始出田野人牽牛謝藥故以名之時珍曰近人隱其名為黑丑白者為白丑蓋以丑屬牛也金鈴象子形金匱狗耳象掌形段成式西

陽雜俎云金匱草蔓如薯蕷葉如桑葉亦不似藤豆須曰處處有之二月種子三月生苗作藤蔓繞籬牆高者或二三丈其葉青有三尖角七

月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裏作毬每毬內有子四五枚大如薔麥有三棱有黑白二種九月後收之

日花朵如鼓子花但碧色日出開日西萎其核如木猴梨子而色黑謂子似薔麥非也時珍曰牽牛有黑白二種黑者處處野生尤多其

莢有白毛斷之有白汁葉有三尖如楓葉花不作瓣如旋花而大其實有蒂聚之生青結白其核與棠李子核一樣但色淺黑而白者人

多種之其莢微紅無毛有柔判斷之有濃汁葉圓有斜尖並如山藥莖葉其花小於黑牽牛花淺碧帶紅色其實蒂長寸許生青枯白其核白色稍粗人亦采嫩實蜜煎為果食呼為天茄因其蒂似茄也

子修治

凡子胎乾水洩去等音再抽詳酒養後已至未晒乾收之臨用
春去黑皮時珍曰今多只銀取頭末去皮麩不用亦有半生熟用者

氣味苦寒有毒

懷白甘有小毒說曰多食稍冷果曰
辛熱難烈泄人元氣天明曰味食得

青木香

主治下氣療脚滿水腫除風毒利小便

治瘴癘無地利大小便除虛腫落胎
錄

取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯明和

山茱萸服去水病

益除氣分濕熱三焦壅結

逐痰消飲通大腸氣秘風秘殺蟲達命

時珍發明

可久服亦行脾胃氣故也好古曰牽牛

以氣藥引則入氣以大黃引則入血利大腸下水積色白者為氣分濕熱上攻喘滿破血中之氣震亨曰牽牛屬火善走黑者屬水白者屬金若非病形與證俱實不脹滿不大便秘者不可輕用驅逐致虛先哲戒之曰牽牛非神藥也名蓄續注云味苦寒能除濕氣利小便治下注脚氣此說氣味主治俱誤矣何也凡用牽牛少則動大便多則泄下如水乃瀉氣之藥其味辛辣久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安在哉夫瀉者水之別稱有形者也若肺先受濕瀉氣不得施化致大小便不通則宜用之蓋牽牛感南方熱火之化所生火能平金而泄肺瀉去則氣得周流所謂五臟有邪更相平也今不問有濕無濕但傷食或有熱證俱用牽牛化之藥豈不誤哉況牽牛止能泄氣中之濕熱不能除血中之濕熱濕從下受之下焦主血血中之濕宜苦寒之味反以辛藥泄之傷人元氣且牽牛辛烈比之諸辛藥泄氣尤甚其傷人必矣經云辛泄氣辛走氣辛泄肺氣病者無多食辛況飲食失節勞役所傷是胃氣不行心火乘之腸胃受火邪名曰熱中脾胃主血當血中泄火以黃芩之苦寒泄火當歸身之辛溫和血主地黃之苦寒涼血益血少加紅花之辛溫以泄血絡桃仁之辛溫除燥潤腸仍不可專用須於補中益氣泄陰火之藥內加而用之何則上焦元氣已自虛弱若反用牽牛大辛熱氣味俱陽之藥以泄水泄元氣利其小便竭其津液是謂重虛重則必死輕則天人故張文聲云牽牛不可耽嗜脫人元氣見人有酒食病者多服牽牛九散取快一時藥過仍病隨服隨效後復瘡以致久服脫人元氣猶不知悔也張仲景治七種濕熱小便不利無一藥犯牽牛者仲景豈不知牽牛能泄濕利小便乎為濕病之根在下焦是血分中氣病不可用辛辣之藥泄上焦太陰之藥是血病瀉氣使氣血俱損也經云母盛母虛虛母絕人長命此之謂也周者戒之白牽牛亦同時珍曰牽牛自宋以後北人常用取快及劉守真張子和出又倡為通用下藥李明之目擊其事故著此說極力闡之然東漢時此藥未入本草故仲景不知假使知之必有用法不應指景況仲景未用之藥亦多矣執此而論蓋論枉過中矣牽牛治水氣在脾喘滿腫脹下焦鬱遏腰背脹重及大腸風秘氣秘卓有殊功但病在血分及脾胃虛弱而痞滿者則不可取快一時及常服暗傷元氣也一宗室大人年幾六十平生苦腸結病旬日一行甚於生產服養血潤燥藥則泥隔不快服消黃通利藥則若罔知如此三十餘年矣時珍診其人體肥膏粱而多憂鬱曰吐酸痰盜汗乃實又多火病此乃三焦之氣壅滯有升無降津液皆化為痰故不能下滋腸肺非血燥比也潤劑留滯消黃徒入血分不能通氣俱為痰阻故無效也乃用牽牛末皂莢膏丸與服

本草綱目

卷十八

七

即便通利自是但覺腸結一服就順亦不妨食且復精爽蓋牛牛能走氣分通三焦氣順則痰涎敗消上下通快矣外甥柳喬素多酒色病下極腹痛二便不通不能坐卧立哭呻吟者七晝夜醫用通利藥不效遣人叩子子思此乃氣熱之邪在精道壅積腸路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也乃用陳實苗香穿山甲諸藥入牽牛加倍水煎服一服而減三服而平牽牛能走右腎命門走精隨人所不知惟東垣李明之知之故明之治下焦陽虛天真丹用牽牛以鹽水炒黑入佐沉香杜仲破故紙官桂諸藥深得補瀉兼施之妙方見醫學發明又東垣治脾濕太過身浮腫喘不得卧腹如附五新搜風通滯風氣所攻臟腑積滯用牽牛子以童尿鼓海金沙散亦以牽牛為君則東垣不盡棄牽牛不用但貴施之得道耳

風寒令乾每日鹽湯下三十粒極能搜風

亦消虛腫久服令人體清瘦 斗門方 三焦壅塞 胸膈不快頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽利膈凡用牽牛子四兩半生半炒不蛀豈

方一切積氣 宿食不消黑牽牛頭為末四兩用蘿蔔剉空安米蓋定紙封蒸熟取出人男婦五積 五般積氣成聚用黑牽牛一斤生搗末

白豈竟末一錢搗凡梧子大每服一二九白湯下名順氣凡 普濟方 每服二三十丸食後隨所傷湯下儒門事親 氣藥奔衝不

蜜凡梧子大至重者三十五凡陳橘皮生薑煎湯卧時服半夜未動 胸膈食積 牽牛末一兩已豆霜三個研末水凡梧子大

再服三十丸當下積聚之物尋常行氣每服十九甚妙 博濟方 腎氣作痛 黑白牽牛等分炒為末每服三錢用猪腰子切縫入茴香百粒

忍牛即凡用黑牽牛半兩炒檳榔二錢 追蟲取積 方同上用酒 腎氣作痛 黑白牽牛等分炒為末每服三錢用猪腰子切縫入茴香百粒

半為末每服一錢葉蔽湯下 普濟方 大便不通 簡要方用牽牛子半生半熟為末每服二錢薑湯下未通

出惡物效 楊 傷寒結胸 心腹硬痛用牽牛頭末一錢白 再以此茶服 〇一方加大黃等分 〇一方加生檳榔等分 大腸風秘

仁齋直指方 糖化湯調下 鄭氏家傳方 水蠱脹滿 白牽牛黑牽牛各取頭末二錢大麵客四兩和作塊 諸水飲病 張子和云

結滿牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁去皮尖炒半 水蠱脹滿 白牽牛黑牽牛各取頭末二錢大麵客四兩和作塊 諸水飲病 張子和云

兩為末熟蜜凡梧子大每湯服三十九 寇氏衍義 餅卧時焙食之以茶下降氣為驗 河間宣明方 諸水飲病 病水之人

如長川泛溢非孟杓可取必以神禹決水之法治之故名禹功散用黑牽牛頭末四 陰水陽水 黑牽牛頭末三兩大黃末三兩陳米飯搗

兩箇香一兩炒為末每服一二錢以生薑自然汁調下當轉下氣也 儒門事親 陰水陽水 黑牽牛頭末三兩大黃末三兩陳米飯搗

湯下欲利服百 水腫尿瀉 牽牛末每服方寸七以 濕氣中滿 足脰微腫小便不利氣急數嗽黑牽牛末一兩厚朴制半兩為 水氣浮腫

九 醫方捷徑 水腫尿瀉 小便利為度 千金方 未每服二錢薑湯下或臨時水凡每服湯下三十丸 普濟方 水氣浮腫 促

坐卧不得用牽牛子二兩微炒搗末以烏牛尿浸一宿平旦 脾濕腫滿 方見海 風濕脚氣 檢之沒指者牽牛子搗末蜜凡小豆大每服七

入葱白一握煎十餘沸空心分二服水從小便中出聖應方 金少下 風濕脚氣 九生薑湯下取小便利乃止亦可吞之其子黑

子劉錄曰旋花生豫州平澤五月米陰乾孫真曰此旋蔓花也所在川澤皆有蔓生葉似薯蕷而線長花紅色根無毛節處莖堪啖味
 美名筋根二月八月根曰紫宗輿曰今河北汴西關陂田野中甚多最難鋤艾治之又生四五月開花其根寸截置土灌溉涉旬苗生

韓偓昇說是玄時珍三旋花田野墟墾陰生遼節蔓延葉如濃菜葉而小至秋開花如白蠟半之花殼紅色正景別錄有千葉者其根白色大如筋不結子頌曰蜀南施州出一種旋花粗莖大葉無花不作蔓恐別是一物也正景別錄花一名金

為山蔓南人呼為美草根似杜若亦似高良薑腹中冷痛服其莖作丸散服之愈止飲酒有人從江寧遠州此物與人薑薑望得半日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似蓼花赤色味辛狀如荳蔻此旋花即其花也今山東甚多又註旋覆花曰別有旋覆根出

河南來北國亦有赤條莖葉惟合旋蕙膏用之鮮無所入恭曰根花不似薑也隨訪人言薑山薑以省
非此類又因旋覆花名金沸遂作此花別名皆誤矣又云從北國來者根似薑與高良薑全無彷彿亦誤也

時珍曰花根莖葉
甘滑微苦能制雄黃
主治面黃色嬌好藥根主腹中寒熱邪氣
利小便久服不飢輕身續命金瘡
搗汁服之丹毒

時珍自京師還見北上車夫每載之云暮歸而渴飲可補損傷則益氣續筋之說尤可徵矣

便以此方出蘇景中療奴有效者 王勣外臺秘要 禾米 子化三兩五月五日米之雞頭子仁一百顆並為末以金櫻子二百枚去

凡服之至百日永不泄如要世以冷水調車前米半合服之忌葷菜 陸廉齋瑞竹堂方
俗謂赤艷曰紫葳藏此花

中品校正
移入此

日星曜參方相至少博物志云却悔行太行山北得紫威華必當奇異今曜零處處有之不應乃在太行山恭曰紫威曜參皆本經

體性既乖生處亦不相聞爾雅云茗一名陵茗郭璞注云一名陵時又名凌霄此為真也爾雅曰孔頴達詩疏亦云茗一名陵時今本草無陵時之名惟鼠尾草有之豈所傳不同抑陶蘇之誤耶時珍曰按吳氏本草紫萁本草別錄曰景歲生西海川谷及山陽茶曰此凌霄花

一名瞿陵陶弘景誤作瞿麥字爾鼠尾止名陵翹無陵時蘇頌亦誤矣並正之
若黃華華白華爰山中亦有白花者頌曰今處處皆有多生山中人家園圃亦或栽之初作蔓生依大木久延至顛其花黃赤夏中乃盛

今醫家多采花乾之入女科藥用時珍曰凌霄野生蔓繞數尺得木而上即高數丈年久者藤大如杯唇似生枝一柱蔓葉大長有齒

紫威本經
中品校正
移入此
釋名奏雲
恭勝經
勝時郭
女威甄
權華本
武威英
豐普
鬼英
鬼英
赤艷故
名附木
而上高
數大故
司奏
實言

曰是翟家根方用至字博物志云祁嶺行太行山北得紫華必當奇異今體零處處有之不飛石在太行山北上學覽覽多也然
體性既乖生處亦不相聞爾雅云落一名陵莖郭璞注云一名陵時又名凌雷此為真也頌曰孔祖達詩疏亦云莖一名陵時今本草無

陵時之名惟鼠尾草不之豈所傳不同抑蘇頌之誤耶時珍曰按吳氏本草紫羅一名瞿陵陶弘景誤作瞿麥字爾鼠尾止名陵翹無陵時蘇頌亦誤矣並正之

集解 別錄云鼠尾草生山石上。葉如鼠尾。花如小豆。實如小豆。其根如鼠尾。故名。連莖葉用。時云有慈之華云其黃矣。爾雅云陵

蒼黃華萼白華羞山亦有白花老婦巨今處處皆有登山中人家園亦豆蔻之和氣也
今醫家多采乾之入女科藥用時珍曰凌雲野生蔓繞數尺得木而上即數數丈年久有藤大如杯唇初生枝一枝數葉又長有齒深

主治婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎

三時
時珍曰凌霄

莖葉氣味辛無毒主治瘰癧瘰癧血帶下花及根以明洗喉痺熱瘡涼血生月珍_{一名花及根甘酸}

而寒襲藥帶苦手足厥除經藥也。行血分能去血分。中火致主產乳崩漏諸疾及血熱生風之證也。
婦人血崩。後服四物湯。丹溪纂要。下血。飲之。普濟方。清湯飲之。

交雪花一兩搗碎水一盞半
嬰兒不乳 百日內小兒無故口青不飲乳用交雪花大藍葉芒硝大黃等分爲末以羊乳和凡楊子大母
乳以乳乳下便可嬰兒乳熟者可服或者勿服昔有人休官後雲遊湖相修合此方救危甚多

煎一盞分二服
聖針
夜膏花或根葉為末每服三錢溫酒下服畢解髮不任手梳口噙冷水溫則吐
魚身風痺
凌宵花為末酒服
大風癘疾

久近疔痛 去再塗再梳至二十口乃止如此四十九日根絕百無所忌○方關奇效方 王璆百一選方用凌霄花山梔子等分為末母

家珍用砂蜜佐五錢酒黃火外煎成膏。此藥功
先以藥湯浴過服此出臭汗為效。儒門事親加蟬蛻五品各九箇作一服。
鼻。疳。查服二錢日二服數日除根。臨川曾子仁用之有

楊氏家藏方用凌霄花半兩硫黃一
兩月洗四箇臘鈴一錢研膏生絹包楷
走皮趨瘡瘡癰漏頂漫漶膿血久不收口者
悲辛瘡用凌霄花并葉煎湯日日洗之○楊仁齋直指方
婦人陰癢魚腦或膽調塗

摘
耳聾
女經不行
凌霄花為末每服二錢食
前溫酒下
徐氏胎產方

本學堂教別士疎別士疎本
 綱目時珍曰此草蔓柔依壁援而生故名墻蘿其莖多棘刺動人

實地 經上品 藥之香露錄 東錄二束經二年餘 豆一牛喜食之故不山中生華記其一人採之

集角徐昇曰所在有之蔓生莖間多刺其花有百葉八出六出或赤或白子若杜棠子時珍曰薔薇野生林壑間春相續續小兒

卷下 上 草音

去皮刺食之既長則成叢似蔓而莖硬多刺小葉尖薄有細齒四五月間花四出黃心有白色粉紅二者結子成簇生青熟紅其核有白毛如金櫻子核八月采之根采無時人家栽玩者莖細葉大延長數丈花亦厚大有白黃紅紫數色花最大者名佛見笑小者名木香皆香艷可人不入藥用南番有薔薇露云是此花之露水香襲異常

營實氣味酸溫無毒別錄曰微寒**主治**癰疽惡瘡結肉跌敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節經本久服輕身益氣別錄**治**寒有熱好瞑珍時**附方**

新眼熱昏暗營實枸杞子地膚子各二兩為末每服三錢溫酒下 聖惠方

根氣味苦溫無毒**主治**止洩痢腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癰諸惡瘡金瘡傷搥生肉復肌別錄**治**熱毒風除邪氣止赤白痢腸風濕

血通結血治牙齦痛小兒疳蟲肚痛癰疽疥癬頭瘡白疔甄權除風熱濕熱縮小便止消渴時珍曰營實薔薇根能入陽明經除風熱濕熱生肌殺蟲故癰疽瘡疥古

方常用而洩痢消渴遺精舊七尿好瞑亦皆陽明病也附方新五消渴尿多薔薇根一把水煎日服之 千金方小便失禁 薔薇根煮汁飲或為末酒服聖惠方 小尿床薔薇根五錢煎酒夜飲 外台秘要

瘡頻數用生薔薇根洗切煎濃汁細飲以愈為度 千金方 口咽癢痒語聲不出薔薇根皮射干一兩甘草炙 口舌糜爛薔薇根避風打去土煮濃汁溫含冷吐冬用根皮夏用枝葉口瘡日久延及胸中生

瘡三年已上不瘡小兒月蝕薔薇根四兩地榆二錢為末先以鹽湯洗過傅之 全幼心鑑 癰腫瘡毒潰爛疼痛用薔薇皮更炙之 千金方 筋骨疼痛因患楊梅瘡服輕粉毒藥成者野薔薇根白皮先三斤水酒十斤煮

一炷香每日任飲以愈為度○鄧筆峰雜興方用刺薔薇根三錢五加皮木瓜當歸茯苓各二錢以酒二盞煎一盞日服一次 金瘡腫痛薔薇根燒灰每白湯服方寸七一日三服 抱朴子 箭刺入肉膿裏不出以薔薇根末搽之服麻糍十日即穿皮出

也 外骨更不出 薔薇根末水服方寸七 同上

葉主治下疳瘡研洗傳之黃花者更良攝生方

月季花

綱目釋名有月紅見臘春。瘰癧。開雪紅集

時珍曰處處人家多栽插之亦甚微類也青里長皮微刺

葉小於薔薇而花深紅千葉厚斯逐月開故不結子也

氣味甘溫無毒主治

活消腫傳毒

時珍附方新

瘰癧未破用月季花頭二錢沉香五錢芫花炒三錢碎劉入大罇魚腹中就以魚腸封固酒水各一

盞煮熟食之即愈魚須安糞水內遊死者方効此是家傳方活人多矣

謾筆新試驗方

時珍曰

桔樓

本經中品校正併入圖經

釋名果藏音小蔓綱目

天瓜別錄黃瓜別錄地樓本經

澤姑別錄根名白藥

天花粉綱目瑞雪上曰果地下曰脈此物蔓生

時珍曰

附本欲得東名詩云果藏之實亦施於字是矣桔樓即果藏二字音轉也亦作冰麻後人又轉為瓜蔓會轉食失其真矣古者瓜姑同音故有澤姑之名齊人謂之天瓜象形也雷敷炮炙論以圓者為核長者為梗亦出聲強但分雌雄也可其根作粉潔白如雪故謂之天花

粉絲頌國經重出天集別錄曰桔樓生於農川谷及山陰地根入土深者良生園地者有毒二月八月未根者乾三十日成乾景曰出花粉譯矣今削之集近道藤生狀如土瓜而葉有叉入土六七尺大二三圍者服食亦用之實入厚皮用漿曰出陝川者白實最佳

頌曰所在有之三四月生苗引藤蔓蔓如甜瓜蔓而窄作叉有細毛七月開花似壺蘆花淺黃色結實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色其形有正圓者有銳而長者功用皆同根亦名白藥皮黃肉白時珍曰其根直下生年久者長數尺秋後掘者結實有粉夏月掘者

有筋無粉不堪用其實圓長青時如瓜黃時如熟柿山家小兒亦食之內有扁子大如絲瓜子殼色褐仁色綠多脂作食無妙乾搗爛水煎取油可點燈

實修

藥曰凡使皮子蔓根其效各別其枯圓黃皮厚者小樓則形長赤皮者粗陰入服擇陽入服枯並去殼皮

革膜及油用根亦取大二三圍者去皮搗爛以水澄粉用時珍曰

桔樓古方全用後世乃分于數各用

氣味苦寒無毒

時珍

甘不苦

主治

治肺燥降火治嗽痰結利咽喉止消渴利大腸消癰腫瘡毒

時珍

子妙用補虛勞口乾渴心肺治吐血腸

風瀉血赤白痢手面皸

明發

今得甘緩潤下之助則痰自降宜其為治痰之要藥也且又能先勝胸膈中垢積熱為治消渴之補藥

風瀉血赤白痢手面皸

明發

今得甘緩潤下之助則痰自降宜其為治痰之要藥也且又能先勝胸膈中垢積熱為治消渴之補藥

時珍曰

張仲景治胸痺痛引心背數喘喘急及結胸滿痛皆用桔樓實乃取其甘寒不犯胃氣能降

附方舊十二

痰嗽不止小蔓仁一兩

上焦之火使痰氣下降也成無已不知此意乃云苦寒以瀉熱蓋不審其味原不苦而隨文傳會爾

未以薑汁澄濃脚凡強

乾效無痰

熟瓜蔓搗爛絞汁入蜜等分加白礬

一錢熬膏頭含藥汁

楊起簡便方

效嗽有痰

熟瓜蔓十箇明礬二兩搗和餅陰乾研末糊

蘇蘇二箇明礬一大棗同燒存性研末

以熟藥煎食藥盡病除

普濟方

熱嗽不止 用濃茶湯一鐘蜜一鍾大熟瓜一箇去皮將瓢入茶湯洗去市熱痰效胸膈塞滿

半夏湯泡七次焙研各一兩薑汁打麵糊丸梧子大每服五十九食後薑湯下

嚴用和治生方 **肺痿效血** 為末每用一捻以猪肺一片切薄絲末入肉炙熟冷嚼嚥之日二服 聖濟

酒痰效嗽 用此救肺瓜葉仁青黛等分研末薑汁

蜜丸父子大每嚥一丸 丹溪心法 **飲酒痰熱** 即上方研膏日食數匙一男子年

總炒半兩為末每服二錢 小兒痰喘 效嗽熱久不瘥瓜葉實一枚去子為末以寒食麵和作餅子炙熟

黃再研末每服一錢溫水化下日三服效乃止 劉河間宣明方 **婦人夜熱** 痰嗽月經不調形瘦者

附重尿浸晒一兩五錢為末 聖惠方 **胸膈痰嗽** 胸膈微背心腹痞滿氣不得通及治痰嗽大瓜葉去瓢取子炒熟

用葱白湯下 聖惠方 **胸中痺痛** 引背喘急效嗽短氣

用大枳椇實一枚切蘆白半斤以白酒七斤浸

二升分再服加半夏四兩更甚 仲景金匱方 **清痰利膈** 治嗽嗽用肥大枳椇洗取子切焙半復四十九箇湯洗十次挺焙等分為末用

中風喝斜 用瓜葉絞汁和大麥麵作餅炙熟

聖惠方 **熱病頭痛** 發熱遺退用大枳椇一枚取瓢細割置盆中時疾發 狂悶煩熱不識人者大

汲水九合浸淘取汁入蜜半合朴消八

分盞分再服便痊 蘇頌經驗本方 **小兒黃疸** 眼黃脾熱用青瓜葉焙研每服一錢水半盞七分

研每服二錢熟酒下頻服以通為度紹興劉駐云

魏明府病此御醫用此方治之得效 聖惠方 **消渴煩亂** 黃枳椇一箇酒一盞洗去皮子取瓢煎成膏入白

葛粉銀石器中慢火炒熟為末食後復

吐血不止 枳椇泥固煨存性研三錢為粉 **腸風下血** 枳椇一箇燒灰亦小豆半兩為

一箇煨存性出火毒為末作一服溫酒服之胡大卿

一僕患痢半年杭州一道人傳此方而愈 本事方 **大腸脫肛** 生枳椇搗汁溫服之以猪肉汁洗

枳椇五錢在內固濟煨存性為末糊丸

牙齦疼痛 瓜葉皮露蜂房燒灰搗牙以烏桕根

梧子大每米飲下二十丸 固宜方 **咽喉腫痛** 詩聲不出經進方用枳椇皮白僵蠶炒甘

或以錦粟半錢含嚥一日二
服名發聲散 御藥院方 堅
大枯樓一箇開頂人青鹽二兩杏仁去皮尖三七粒原頂合扎定蚯蚓泥和鹽固火煨存性
研末每日搽牙三次令熱百日有驗如先有白頰按去以藥投之即生黑者其治口齒之功未易

具陳 聖令白 枯樓熟三兩杏仁一兩猪脂一具同研如膏 胞衣不下 枯樓實一箇取子細研以酒與童子小便各半盞
每夜塗之令人光潤冬月不皸 聖濟錄 煎七分溫服無實用根亦可 陳良甫婦人良方 乳汁不下 瓜

子淘洗控乾炒香瓦上會令白色酒服一 乳癰初發 大熟枯樓一枝熟搗以白酒一斗煮取四 諸癰發背 初起微赤枯樓搗末并華
錢七合面卧一夜流出 姚僧坦鼻驗方 升去滓溫服一升日三服 子母秘錄 水服方寸七 梅師方 便毒

初發 黃瓜葉一箇黃連五錢水煎 風瘡癰癤 生枯樓一二箇打碎酒浸一 熟遊丹腫 枯樓子仁末二大兩醋煎 楊梅瘡 小如指頂過身
連服即效 李仲南永賴方 日夜熱飲 腫仙乾坤秘記 調塗 楊氏產乳集驗方 梅瘡 者先服敗毒散

後用此解毒皮膚風熱不過十服即愈用枯樓
皮為末每服三錢燒酒下日三服 集驗方

根修治天花粉 周處王曰秋冬采根去皮寸切水浸逐日換水 氣味苦寒無毒 時珍曰甘微苦酸微寒之才曰枸杞 去消渴身熱煩
四五日取出搗泥以絹衣濾汁澄粉晒乾用 為之便惡乾薑煨牛膝此漆反烏頭

滿大熱補虛安中續絕傷本 經除腸胃中痼熱八瘕身面黃唇乾口燥短氣止小便利通月水 別錄治熱狂時疾通小腸消腫毒乳癰發背痔

瘰癧排膿生肌長肉消瘰癧瘰癧血 明發 非此不能除與辛酸同用導氣成無已曰津液不足則為渴枯樓根味苦微寒潤枯燥而
通行津液是為渴所宜也詳珍曰枯樓根味甘微苦酸其苦味酸酸能生津 附方 舊十二 消渴飲水 千金方作粉法取大枯樓根去皮

感召之理故能止渴潤枯微苦降火甘不傷胃昔人只言其苦寒似未深察 新十二 寸切水浸五日逐日易水取出搗
研濾過澄粉晒乾每服方寸七水化下日三服亦可入粥及乳酪中食之○肘后方用枯樓根薄切炙取五兩水五升煮四升意飲之

○外臺祕要用生枯樓根三十斤以水一石煮取一斗半去滓以牛脂五合煎至水盡用煖酒先食服如雞子大日三服最妙○聖惠方
用枯樓根黃連三兩為末蜜丸梧子大每服三十丸日二服○又至聖 傷寒煩渴 思飲枯樓根三兩水五升煮一升分二服先以淡竹葉

丸用枯樓根人參等分為末蜜丸梧子大每服三十丸零門冬湯下 一斗水二升煮好銀二兩半冷飲汁飲後服此 外臺
傳 秘 百合病渴 枯樓根牡蠣殼等分為散 瓜瓞根一斤搗汁六合頓服隨有黃水小兒發黃 皮肉面目皆黃用生枯樓根搗取汁

飲服方寸七 永類方 黑瘰癧瘰癧 從小便出如不出再服 楊起簡便方 二合蜜二大匙和勻暖服日一服

廣利 **小兒熱病** 壯熱頭痛用桔梗根末乳 虛熱欬嗽 天花粉一兩入參三錢為末 偏頭痛極 劫之立住用綿絮包暖陰囊取天花粉五錢 汁調服半錢 聖惠方 每服一錢米湯下 集簡方 以醇酒一盞浸之自卯至午微煎露一夜

次早低凳坐定兩手撐膝飲下 即愈未下再服 本草玄鑑 **小兒囊腫** 天花粉一兩入甘草一錢半 耳卒烘烘 桔梗根削火以臘猪脂煎三沸 耳聾未入 桔梗根三十 斤細切以水 煮汁如常釀酒久 腹硬疼痛輕則為妬乳重則為乳癰用桔梗根末一 服甚良 肘后方 兩乳香一錢為末溫酒每服二錢 李仲尚永類方 乳汁不下 桔梗根晚存性研末飲服方寸七 或以五錢酒水煎服 楊氏產乳 癰腫初起

孟說食療用桔梗根苦酒熬燥搗篩以苦酒和塗紙上貼 之○楊文蔚方用桔梗根赤小豆等分為末醋調塗之 **天泡濕瘡** 天花粉滑石等分為末 楊梅天泡 天花粉川芎各四兩桃花一兩 湯下七八十丸 折傷腫痛 桔梗根搗塗重布裹之熱 水調搽之 普濟方 為末米糊丸梧子大每空心淡薑 效 簡便方 除痛即止 葛洪肘后方 箭鏃不出 桔梗根搗傳之日三易 鍼刺入肉 方同 瘡後回障 天花粉蛇蛻洗焙等分 在內米泔汁煮熱切食次女病此 服之旬餘而愈 周密齊東野語 為末羊子肝批開入藥

莖葉氣味酸寒無毒主治中熱傷暑 別錄

王瓜 本經 中品 釋名主瓜 經 鉤鉤 郭 老鴉瓜 經 馬鹿瓜 電 赤雹子 衍 野甜瓜 目 師姑草 土 宿 公 公 頤 頤 日月令四月王瓜生即此也均房間人 郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之酸姑又名鉤鉤則芰瓜別是一物也又曰芰非謂之土瓜別是一物非此土瓜也異類同名甚多不 可不難時珍曰土瓜其根作土氣其實似瓜也或云根味如瓜故名土瓜王字不知何義瓜似電子熟則色赤鴉喜食之故俗名亦當老 鴉瓜一葉之下一鵝故俚人呼為公 集 別錄曰生魯地平澤田野及人家垣牆間三月采根陰乾弘景曰今土瓜生雞院間子熟時亦 公類與地黃苗名葉連奶可為屬對 集 如彈凡其根不入大方正單行小小爾鄭玄注月令四月王瓜生以為獲安殊謬案案曰四月 生苗延蔓葉結樓葉但無入缺有毛刺五月開黃花下結子如彈凡生青熟赤根似葛而細多稜謂之土瓜根北閩者其子常帶相 連大如棗皮黃肉白苗子相似根狀不同若療瘡疔破血面者大勝也 案 輿曰王瓜其殼徑寸長二寸許上微圓下尖長七八月熟紅赤 色殼中子如螳螂頭者令人又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根上又生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用時珍曰王瓜三 月生苗其蔓多蟻嫩時口品其葉圓如馬蹄而有尖面青背淡黃而不光六七月間五出小黃花成簇葉子繁熟時有紅黃二色皮亦

服之旬餘而愈 周密齊東野語

在內米泔汁煮熱切食次女病此 服之旬餘而愈 周密齊東野語

服之旬餘而愈 周密齊東野語

服之旬餘而愈 周密齊東野語

服之旬餘而愈 周密齊東野語

服之旬餘而愈 周密齊東野語

服之旬餘而愈 周密齊東野語

根氣味苦寒無毒

權曰平藏器曰有小毒
能吐下人取汁制雄汞

主治消渴內痺瘕血月閉寒熱酸疼益氣愈聲
經本療諸邪氣熱結鼠癭故癰腫留血婦人帶

下不通下乳汁止小便數不禁遂四肢骨節中水治馬骨刺人瘡

天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶熱勞排膿消癰損瘀血破癰瘕落胎

大主蠱毒小兒閃瘰癧滿痰瘰并取根及葉搗汁少服當吐下明

藏利大小便治面黑面瘡時珍方小兒發黃土瓜根生搗汁三合與服不過三次愈

蘇頌
圖經
黃疸變黑

醫所不能治用土瓜根汁平旦溫服一
小升午刻黃水當從小便出不出再服
小便如汨乃腎虛也土瓜散用土瓜根一兩白石服二兩兔絲子酒搗二兩
桂心一兩牡蠣粉一兩為末每服二錢大麥粥飲下
衛生寶鑑

不通
土瓜根推
筒吹入下

大便秘不通
 上方吹入肛門內二便不通
 乳汁不下
 土瓜根煮酒服一錢
 日二服 楊氏產乳方
 經水不利
 前方少腹滿經
 一月再見者土瓜

根散主之土瓜根芍藥桂枝廬虫各三兩婦人陰癰方同
為末酒服方寸七日三服仲景金匱方

一切漏疾
土瓜根搗傳燥則易千金方
中諸毒
土瓜根大如指長三寸以酒半升浸一宿服當吐下
外台秘要
面上瘰

瘡 土瓜根搗末漿水和勻入夜別以漿水洗面塗藥且復之百日光彩射人夫妻不相識也曾用有效 肘后方

耳聾灸法 濕土瓜根半寸塞耳內以艾炷七壯每旬一炷愈乃止 聖濟錄

子氣味酸草無毒主治生用潤心肺治黃病炒用治肺痿吐血腸風瀉血赤白痢

主蠱毒反胃吐食
時珍附方
新消渴飲水
雷氏

每食後嚼二三兩五
傳戶勞瘵 赤電兒俗名王瓜焙為末
七度瘧 聖惠方 每酒服一錢 十藥神書

馬雷兒燈上燒存性一錢人好衆肉平胃散末二錢
 酒服食即可下即野甜瓜北方多有之 丹溪要
 丹 痰熱頭風 懸枵 樓一

箇亦寬兒七箇焙大力子即牛旁子焙四兩為箇膏痛變
末每食後或茶酒服三錢忌動風發熱之物

馬靈兒子炒開口為末酒
服一錢日二服 集簡方
赤白痛瀉 不可忍小圓粒數粒上大如彈及紅色皮
上有刺者九月十月采日乾槐花炒赤芍

藥等分為末每服二錢臨
卧溫酒下 衛生家寶方
瘀血作痛 赤電兒燒存性研末
酒空心服二錢 集

無反
大腸下血
王瓜一兩燒存性地黃二兩黃連半兩為末蜜丸梧子大米飲下三十丸 指南方

葛

本經中品校正

併入開名雞齋

鹿藿別錄

草此其一種故曰鹿藿黃斤未詳

舊錄

即今之葛根人皆蒸食之當取入土深大者破而

日乾之南康廬陵間最勝多肉而少筋甘美但為藥不及耳本曰葛雖除毒其根入土五六寸已上者名葛根腫者腥也服之令人吐以

有微毒也本經葛根即是其實也須曰今處處有之江浙猶多春生苗引藤蔓長一二丈葉色葉頗似楸葉而小色青七月着花粉紫色

似豌豆花不結實根形大如手臂紫黑色五月五日午時采根曝乾以入土深者為佳今人多作粉食京與曰濃鼎之問冬月取生葛搗爛入水中揉出粉澄成塊入沸湯中良久色如勝其體甚軟以蜜拌食條入生薑少許尤妙又切入茶中待宿雖甘而無益又將生葛根

煮熟作果實賣吉州南安亦然時珍曰葛有野生有家種其蔓延長取治可作絛給其根外紫內白長者七八尺其葉有三火如楓葉而長面青背淡其花成穗紫紅紫色其笑如小黃豆莢亦有毛其子綠色扁扁如藍梅子核生嚼腥氣八九月米之本經所謂葛根是也唐蘇恭亦言葛穀是實而宋蘇頌謂葛花不結實誤矣其花晒乾亦可煇食

葛根

氣味甘辛平無毒

別錄曰生根汁大寒好古曰氣平味甘升也陽也陽明經行經的藥也

主治消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒

本經療傷寒中風頭痛解肌

發表出汗開腠理療金瘡止脇風痛

別錄

治天行上氣嘔逆閉胃下食解酒毒

甄權

治胸膈煩熱發狂止血痢通小腸排膿破血傳蛇蠱瘡

毒傷

明殺野葛巴豆百藥毒

不生者噎膈食酒毒可斷穀不饑作粉猶妙

藏器

作粉止渴利大小便解酒去煩熱摩丹石傳小兒熱

瘡搗汁飲治小兒熱瘡

開寶

獬狗傷搗汁飲并末傳之

蘇恭

散發火

時珍

治斷血為要藥亦療瘡及瘡至良頃曰張仲景治傷寒有葛根湯

以其主大熱解肌發腠理故也元素曰升陽生津脾虛作渴者非此不除勿多用恐傷胃氣仲景治太陽陽明合病桂枝湯內加麻黃

葛根又有葛根黃芩黃連解肌湯是用此以斷太陽入陽明之路非即太陽無也頭顱痛如破乃陽明中風可用葛根意白湯為陽明仙

藥若太陽初病未入陽明而頭痛者不可便服升麻葛根發之是反引邪氣入陽明為引賊破家也實亭曰凡痘症已見紅點不可用葛根升麻湯恐未虛反增厥爛也景曰乾葛其氣輕浮鼓舞胃氣上行生津液又解肌熱治脾胃虛弱泄瀉聖藥也徐用誠曰葛根氣味俱薄輕而上行浮而微降陽中陰也其用有四止渴一也解酒二也發散表邪三也發瘡疹難出四也時珍曰本草十劑云輕可去實麻黃葛根之屬蓋麻黃乃太陽經藥兼入肺經肺主皮毛葛根乃陽明經藥兼入脾經脾主肌肉所以二味藥皆輕揚發散而所入迥然不同

附方 舊十五 數種傷寒 庸人不能分別今取一藥兼治天行時氣初覺頭痛內熱脈洪者葛根四兩水二升入豉一升煮取半升服生薑汁尤佳 傷寒類要 **時氣頭痛** 壯熱生葛根洗淨搗汁一大盞豉

末汗再服若心熱加芎 傷寒頭痛 二三日發熱者葛根五兩香豉一升以童子小便子仁十枚○聖惠方 三服食葱粥取汁 梅師方 **妊娠發熱** 葛根汁二升分三服 預防熱病 急黃賊風葛

黃一升香豉半升為散每食後米飲服方 辟瘴不染 生葛根汁一小盞服去 煩躁熱渴 葛粉四兩先以水浸粟米半升一夜流寸七日三服有病五服 龐安常傷寒論 聖惠方 出拌勻煮熱以糜飲和食 食醫心鏡 **小兒熱渴**

久不止葛根半兩 乾嘔不食 葛根搗汁服一 小兒嘔吐 壯熱食痢葛粉二錢水二合調勻傾入錫罐 心熱吐血 不止生葛根汁半升水煎服 聖惠方 升虛 時後方 中重湯蓋熱以糜飲和食 皆服食醫心鏡 外臺秘要 **既腰疼痛** 生葛根搗之嚙汁取

不止 生葛根汁服三服 熱毒下血 因食熱物發者生葛根二斤搗汁 傷筋出血 葛根搗汁飲乾者煎服仍 效乃止 肘后方 金創中風 瘡強欲死生葛根四大兩以水三升煮取一升去滓分服口嚙者灌 服藥過劑 苦煩生葛汁飲之乾 酒醉不醒 生葛汁飲二升

之若乾者搗末調三指撮仍以此及竹瀝多服取效 貞元廣利方 服藥過劑 苦煩生葛汁飲之乾 酒醉不醒 生葛汁飲二升 諸藥中毒 發狂煩悶吐下欲死葛根中鴆毒 氣欲絕者葛粉三合水三盞 虎傷人瘡 生葛煮濃汁洗之仍搗末水服 根復汁服 肘后方 調服口嚙者灌之 聖惠方 方寸七日夜五六服 梅師方

葛穀氣味甘無毒 治下痢十歲已上 本經 解酒毒 時珍 葛花氣味同 治酒酒 別錄 景目同小豆花 乾末酒服飲酒不醉也 腸風下血 時珍

葉圭治金瘡止血 傳之 錄 蘇消癰腫 時珍 新婦人吹乳 葛蔓燒灰酒服二錢三 癰子初起 葛蔓燒灰水調傳 之即消 千金方 小兒口噤 病在

蔓圭治喉痺燒研水服方寸七 蘇消癰腫 時珍 新婦人吹乳 葛蔓燒灰酒服二錢三 癰子初起 葛蔓燒灰水調傳 之即消 千金方 小兒口噤 病在

如麻豆許令兒吐沫不能乳食葛蔓燒 附錄 鐵葛 健久服治風發偏風生山南峽中葉似枸杞根如葛黑色 反一字和乳汁點之即瘥 聖惠方

本草綱目 卷之八上 草部 十三

黃環

本經

下品

狼跋子

別錄

下品

釋名

大就

本經

就葛

本經

生葛

普根

非

黃實

狼跋子

別錄

度

唐本

時珍曰

此物

葉黃而

圓故名

黃環如

蘿摩

其葉似之故

集解

別錄曰

黃環生

蜀郡山

谷三月

采根

陰氣

黃環一

名生

蜀二

月生

苗正

赤高

二尺

葉黃

端大

經日

葉有

汁黃

定非矣

用其稀

市人

豈有

識者

又曰

狼跋子

出交

廣形

扁扁

制搗

以雜

木投

水中

魚無

大小

皆浮

出而

死

案曰

黃環

惟襄

陽大

有餘

有亦稀

巴西人

謂之

就葛

今園

庭亦

種之

作藤

生大

者葉

徑六

七寸

根亦

葛類

陶云

似防

已者

近之

取葛

根誤

食之

吐利

不止

土漿

此真黃環也

今太常

收銀

面來

者乃

雞屎

葛根

非黃

環也

其花

紫色

其子

名狼

跋子

角生

似皂

英交

廣送

入太

常者

正

是黃環

子也

花實與

黃環

根

氣味

苦平

無毒

普曰

神農

黃帝

有毒

桐君

扁鵲

苦權

曰大

寒有

主治

蠱毒

鬼魅

邪氣

在

臟中

除

寒熱

治上

氣急

及百和

治瘰癧

消水腫

利小便

附方

新

水腫

黃環

根乾

每服

五錢

水煎

服小

便利

為效

儒門

事親

天門冬

本經

上品

釋名

冬

音勣

本經

冬

音勣

冬

音勣

冬

音勣

冬

音勣

冬

音勣

冬

音勣

冬

音勣

冬

音勣

冬

音勣

在北岳

名無不

愈在

南岳

名百

部在

京陸

山阜

名顛

動在

越人

名洗

草雖

處處

有之

其名

不同

其實

一也

別有

百部

草其

根有

百許

而苗小

異其

物二根沉垢集津門冬泥草五名也銘音命目之也頌曰處處有之春生難是大如飯股高至丈餘葉如葡萄極大細而疏滑有逆刺亦有濕而無刺者甚多如絲而細散寄名天門冬夏生細白花亦有黃色及紫色者我結黑子在根枝旁入伏後無花暗結子具根白或黃紫已大如手指圓實高長二三寸大者為勝一科一二十枚同根與百部根相類洛中出者大者粗幹殊不相類廣南者無花餘無他異為錄曰抱朴子言生高地根短味甜氣香者為上生水側下地紫似細繩而微黃根長而味多苦氣甘者次之若以服食令人下氣為益又選也入山便可養養之斷根或為散仍取汁作酒服散猶佳時珍曰生苗時亦可以沃地栽種子亦堪種但晚成

根修治

景目門冬采得根剉去皮食之甚甘美止飢雖曝乾諸脂難竭必須曝於日中或火烘之今人呼為練刺實作飲宜人而終非直練刺也頌曰二三八月采根蒸剉去皮四破去心曝乾用數日不得去皮心用柳木籠及柳木葉蒸一伏時酒過

令過更添火蒸作小架去地二尺攤於上曝乾用

氣味

性平無毒。剉錄曰甘大毒好古曰氣寒味微苦而平氣薄味厚陽中之陰入乎太陰足少陰經氣分之藥之才且垣衣地黃貝母為之使畏曾青指之曰服天門冬禁食腥魚誤食中毒者子母汁解之

黃綱砂

主治諸風濕偏痺筋骨腫殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年不飢。本保定肺氣去熱氣養肌膚利小便冷而能補肺氣

效逆喘急促肺痿生癰吐膿除熱通腎氣止消渴去熱中風治濕疥宜久服煮食之令人肌體滑澤白淨除身上一切惡氣不潔之疾

甄鎮心潤五臟補五勞七傷吐血治嗽消痰去風熱頌曰大主心病噎乾心癰渴而欲飲屢覺昏臥足下熱而痛好治燥熱陰清金降火

時珍陽事不起宜常服之

思發曰權曰天門冬冷而能補虛人五虛而熱者宜加用之和地黃為使服之奈老頭不白者與曰治肺熱之功為多其味苦專泄而不專收寒多人禁服之元素曰苦以泄滯血甘以助元氣及治血妄行此天門冬之功也保定肺氣治血熱侵肺上氣喘促宜加人參黃芪為主用之神效嘉謨曰天門冬並入乎太陰祛煩解渴止飲消痰而麥門冬兼行入乎少陰清心降火使肺不犯邪故止效立效天門冬行足少陰滋腎助元金其母氣故清痰功蓋腎主津液燥則癆而為度得潤則化所謂治癆之本也好古曰手太陰足太陰經營衛枯酒宜以濕潤潤之天門冬人參五味枸杞子同為生脈之劑此上焦獨取寸口之意趙德宗曰五藥雖為生脈之劑然生地黃貝母為天門冬之使地黃車前為麥門冬之使茯苓為人參之使若有君無使是獨行之取足以斷報若有力可餌之或作散酒服或搗汁作液膏服至百日丁壯兼倍服於虎及黃精也二百日強壯駐顏色與陳成松脂

同蜜丸服尤善杜紫微服之御八十妻一百四十歲日行三百里慎微言所仙傳云赤松子服天門冬為壽更生細髮復出太原甘始服天門冬在人間三百餘年聖化經云以天門冬佐冬等分為末日服方寸七則不長寒大寒時單衣汗出也時珍曰天門冬清金降火益水之上源故能下通腎氣入滋補方合群藥用之有效若脾胃虛寒人單餌既久必病腸滑反成痼疾此物性寒而潤能利大腸故也

中益氣治虛勞結傷年老衰損枯不隨風濕不仁冷痺虛癆瘵疾羸瘦壯敗爛者服之皮脫虫出醲酒服去癰病精散風度顛狂三虫伏尸除濕痺輕身益氣令人不飢百日還年耐老醲酒和熱微飲久停則香美諸酒不及也忌鯉魚○體仙神隱云用乾天門冬十斤杏仁一斤搗末蜜漬每服方寸七名仙人糧

辟穀不餓 天門冬二斤熟地黃一斤為末煉蜜丸彈子大每溫酒化三九日三服居山遠行辟穀良方服至十日身輕目明二十日百病愈顏色如花三十日髮白更黑齒落重生五十日行及奔馬百日延年 又法天門冬搗汁微火煎取五斗八白蜜一斗胡麻炒末二升合煎至可丸即止火下大豆黃末和作餅徑三寸厚半寸一服

餅一日三服百日已上有益 又法天門冬末一升松脂末一升蠟蜜一升和煎丸如梧子大每日早晚各服三十丸 天門冬酒補臟調六腑令人無病天門冬三十斤去心搗碎以水二石煮汁一石糯米一斗細麴十斤如常炊醲酒熟日飲三盃

天門冬膏 去積聚風痰補肺療嗽失血潤五臟殺三虫伏尸除虛度輕身益氣勿令大沸以十斤為率熬至三斤却入蜜四兩煎至滴水不散再風埋土氣令人不飢以天門冬流水泡過去皮心搗爛取汁砂鍋文武炭火中一七去火毒每日早晚白湯調服一匙若動大便以酒服之 署方摘要 肺痿咳嗽 吐涎沫心中溫溫咽燥而不渴生天門冬搗汁一

杏仁大一九日 陰虛火動 有痰不堪用燥劑者天門冬一斤水浸洗去心取肉十二兩石白搗爛五味子水洗三服 肘后方 陰虛火動 去核取肉四兩晒乾不見火共搗丸梧子大每服二十九茶下日三服 簡便方 滋陰養血 溫補下元三才心生地黃二兩二味用柳甑單以酒洒之九蒸九晒待乾秤之人參一兩為末

蒸藥肉搗和丸梧子大每服三十丸食前溫酒下日三服○聖古活法機要 虛勞體痛 天門冬末酒服方寸七肺勞風熱 止渴去熱天

煮食或曝乾為末蜜丸服尤佳亦可洗面 孟詵食療 婦人骨蒸 煩熱發汗口乾引飲氣喘天門冬十兩麥門冬八兩並去心為末以生地黃三斤煎發作則吐耳

引脇牽痛天門冬去心皮曝乾為末酒服方寸七日三服久服良 外臺秘要 小腸偏墜 天門冬三錢烏藥五錢以日用洗面 聖濟總錄 口瘡連年 不愈者天門

去心玄參等分為末煉蜜丸彈子大每噉一著 聖濟總錄 新掘天門冬三五兩洗淨沙金搗細以好酒浸汁噴服丸乃僧居索所傳方也 齊德之外科精義 補腎壯陽 天門冬末酒服方寸七

百部

別錄中品

釋名還婦草

日野門冬

綱目時珍曰其根多者百十連屬如部伍然故以名之

集解

弘景曰山野處處有之其根數十相連似天門冬而苦強但苗葉爾博物志云凡真一種草似百部但長大爾懸火上令乾夜取四

五十切短合嚙汁主暴嗽甚良名為嗽藥疑此即百部也其土肥潤是以長大也藏器曰天門冬根有十餘莖圓短實潤味甘百部多者五六十莖長尖肉虛味苦不同苗葉亦別今人以門冬當百部說不明也頌曰今江湖淮陝齊魯川郡皆有之春生苗作藤葉大而尖其葉似竹葉面青色而光根下一撮十五六枚黃白色二三八月米爆乾用時珍曰百部亦有細葉如蘭香者其葉青肥微時亦可食其根長者近尺新時亦肥實但乾則虛度無脂潤爾生時擊開去心曝之難焦通志言葉如蘭香者其葉青肥

根修治

微曰凡米得以竹刀劈去心皮花作數十條懸屋下風乾却用酒浸一宿微寒有小蟲時珍曰苦微甘無毒

氣味甘微溫無毒

微寒有小蟲時珍曰苦微甘無毒

主治欬嗽上氣火災酒漬飲之

別錄治肺熱潤肺

治傳尸骨蒸勞治瘡殺蟲寸白燒蟲及一切樹木蛀蟲燼之即死殺虱及蠅

日作湯洗

火災酒浸空腹飲治疥癬去蟲

時珍曰百部亦天門冬之類故皆治肺病殺蟲但百部氣溫而不寒寒宜之天門冬性寒而不熱熱嗽宜之此為異耳

附方

傷五暴欬

張文仲方用百部根漬酒每溫服一升日三服

葛洪方用百部生薑各搗汁等分煎服二合

續十全方用百

部根九用百

部根

部根

節各七錢半為末杏仁去皮尖炒仍以水畧煮三五沸研泥

入熟蜜和凡皂子大每服二三丸溫水下

錢乙小兒方

三十年嗽

百部根二十斤搗取汁煎如飴服方寸七日三

服深師加蜜二斤外臺加飴一斤千金方

洗搗薑臍上以糯米飯半升擇水酒半合搗軟盒在藥上以帛包住待一二日後口內作酒氣則水從小便中

出腫自消也百部根一名野天門冬一名百奴狀如蔥頭其苗葉赤細一根下有百餘個數

楊氏經驗方

誤吞銅錢

百部根四兩酒

一斤漬一宿溫

服一升日再服

外臺秘要

百蟲入耳

百部炒研生油調一序

熏衣去蟲

百部奉尤為末入竹籠燒煙熏之

附錄白并

別錄曰味苦無毒主肺欬上氣

一名前齡生山陵葉如小竹根黃皮白三月四月采

根曝乾時珍曰此物氣味主治俱近百部故附之

何首烏

宋開

釋名藥藤

本

傳地精

本陳知白

馬肝石

綱目桃柳藤日九真藤

綱目赤葛

綱目瘡毒

綱目紅內消

大明曰其藥本草無名因

何首烏見藤夜交何即米

本草綱目

卷之八

草部

上

本草綱目

卷十八

十五

食有人因以采人為名備時珍曰漢武時有馬肝石能灌人髮故後人隱此名亦曰馬肝石集解頌曰何首烏本出順州南河縣今隨處

赤者能消腫毒外科呼為瘡常紅肉消斗門方云取根若獲九數者服之乃仙故名九真集解有之嶺外江南諸州皆有以西洛嵩山

及河南栢城縣者為勝春生苗蔓延竹木端壁間莖紫色葉葉相對如善慎而不光澤夏秋開黃白花如葛勒花結子有核似蓂華而難

小饒如東大秋冬取根大者如拳各有五枝辨似小甜瓜有赤白二種赤者雄白者雌一云春采根秋采花九蒸九曝乃可服此藥本名

交藤因何首烏服而得名也唐元和七年僧文秀過茅山老人遂傳此事李翱乃者何首烏傳云何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父

名延秀能嗣本名田兒生而鬻狗年五十八無妻子常慕道術隨師在山一日醉卧山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方

解離了又文田兒驚訝其異且遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之答曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不

之遂許為末空心酒服一錢七日而思人道數月似強健因此常服又加至二錢經年舊疾皆痊髮烏容少十年之內即生數男乃改名

能嗣又與其子延秀服皆壽百六十歲延秀生首烏首烏服藥亦生數子年百三十歲髮猶黑有李安期者與首烏鄉里親善得方服

其書亦長遂飲其事傳之云何首烏味甘性溫無毒茯苓為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年腎度瘕癖風虛敗劣長筋力益精壯

氣駐顏黑髮延年婦人患血瘕黃瘦後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五

名何首烏本出處州江南諸道皆有苗如木葉葉有光澤形如桃柳其背偏皆單生不相對有雌雄雄者苗色黃白雌者黃亦根遠不過

三尺夜則苗蔓相交或隱化不見春未夏中秋初三時候暗明日兼雌雄采之乘潮以布帛拭去泥生勿損皮烈日曝乾密器貯之每月

再曝用時去皮為末酒下最良遇有疾即用茯苓湯下為使凡服用偶日二四六八日服訖以衣覆汗出導引尤良忌猪肉血羊血無鱗

魚觸藥無力其根形大如拳連珠具有形如馬獸山岳之狀者珍也掘得去皮生喫得味甘甜可休粮讚曰神效助道者在仙書雌雄相

交夜合晝疏服之去穀日居月諸返老還少變安病軀有緣者遇最爾白如明州刺史李逢附錄云何首烏以出南河縣及嶺南恩州

韶州潮州賀州廣州潘州四會縣者為上邕州桂州康州春州高州勒州循州普興縣出者次之真仙草也五十年者如拳大號山奴服

之一年髮鬚青黑一百老者如盤大號山哥服之一年顏色紅悅一百五十年者如盤大號山伯服之一年齒落更生二百年者如斗

棧大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年者如三斗棧棧大號

山精純陽之體久服成地仙也時珍曰凡諸名山深山產者即大佳也

根修治志曰春秋夏采其根雌雄共用東瀝以布拭去土曝乾臨時以苦竹刀切米泔浸經宿曝乾木杵臼搗之忌鐵器微火方用

新采者去皮銅刀切薄片入瓶內以瓷鍋蒸之旋以熱水從上淋下勿令滿溢直候無氣息乃取出曝乾用時珍曰近時古法

用何首烏亦白各一斤竹刀刮去粗皮米泔浸一夜切片用黑豆三斗每次用三升三合三勺以水泡過沙氣味苦微溫無毒時珍曰

鍋內鋪豆一層首烏一層重鋪盡蒸之豆熟取出豆將何首烏晒乾再以豆蒸如此九蒸九晒乃用

之使忌諸血無鹹魚雞狗蒜蔥等並鐵器同於地黃能伏硃砂

主治癰腫消腫瘰癧頭面風瘡疥癩止心痛益血養髮悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦

治婦人產後及帶下諸疾

久服令人有子治腹臟一切宿疾冷氣腸風大瀉肝風古方時珍曰何首烏足厥陰少陰藥也白者入氣

溫味苦澀苦補腎溫補肝能收斂精氣所以能養血益肝固精益腎使筋骨烏髮髮為滋補良藥不寒不燥功在地黃天門冬諸藥之上氣血太和則風虛癰腫癰瘰諸疾可知矣此藥流傳雖久服者尚寡嘉靖初邵應節真人以七寶美髯丹方上進

世宗肅皇帝服餌有效連生

皇嗣於是何首烏之方天下大行矣懷州知州李治與一武臣同官恰其年七十餘而輕健面如渥丹能飲食叩其術則服何首烏凡也乃

傳其方後治得病臥者中半體無汗已二年竊自憂之造丸服至年餘汗遂決體其活血治風之功大有補益其方舊四新七寶美

用赤白何首烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石白為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十九亦可末服附方十二

耳烏髮壯筋骨固精氣續嗣延年用赤白何首烏各一斤米泔水浸三四日瓷片刮去皮用淘淨黑豆二升以砂鍋水煎鋪豆及首

烏重鋪蓋蒸之豆熟取出去豆暴乾煨豆再蒸如此九次曝乾為末赤白茯苓各一斤去皮研末以水淘去筋膜及浮者取沉香

捻塊以人乳十盤浸勻晒乾研末牛膝八兩去苗酒浸一日同何首烏第七次蒸之至第九次止晒乾當歸八兩酒浸晒枸杞子八兩酒

浸晒兔絲子八兩酒浸生芽研爛晒補骨脂四兩以黑芝麻炒香並忌鐵器石白為末煉蜜和丸彈子大一百五十九每日常服三九清晨溫

酒下午時薑湯下卧時薑湯下其餘並九梧子大每服食滋補和劑局方何首烏丸專壯筋骨長精髓補血氣久服黑髮堅陽道令人

日空心酒服一百九久服極驗忌見前積善堂方服食滋補多子輕身延年月計不足歲計有餘用何首烏三斤銅刀切片乾者以米

泔水浸軟切之牛膝去苗一斤切以黑豆一斗淘淨用木甌鋪豆一層鋪藥一層重重鋪蓋瓦鍋蒸至豆熟取出去豆曝乾換豆又蒸如

此三次為末桑葉肉和九梧子大每服三十五九空心溫酒下忌見前○鄭巖山中丞方只用赤白何首烏各半斤去粗皮陰乾石白料

末每旦無灰酒服二錢○積善堂方用赤白何首烏各半極大者八月采以竹刀削去皮切片用米泔水浸一宿晒乾以壯婦男兒乳汁

拌晒三度候乾末白春為末以蜜雲菓肉和杵為丸如梧子大每服二十丸每十日加十九至百丸止空心溫酒薑湯任下一方不用人

乳○筆峯雜興方用何首烏雌雄各半斤分作四分用當歸汁浸一分生地黃汁浸一分旱蓮汁浸一分骨軟風痿腰膝痛行步不得通身

分人乳浸三日取出各曝乾凡煨石白為末桑葉肉和九梧子大每服四十丸空心百沸湯下忌見前

花紋者同牛膝各一斤以好酒一升浸七宿曝乾末白杵末寬筋損何首烏十斤生黑豆半斤同煎熟皂莢一斤燒存性牽牛十兩炒

藥肉和九梧子大每一服三五十九空心酒下經驗方取頭末算荷十兩木香牛膝各五兩川烏頭炮二兩為末酒糊丸

草部

梧子大每服三十丸 皮裏作痛 不問何處用何首烏末薑汁調成膏塗之 經驗方 自汗不止 何首烏末津調封 腸風臟毒 下血不止何首烏二兩為茶湯下 永類方 之以帛裹住火炙鞋底熨之 集韻方 腸中 聖

方 小兒驚 龜尿調紅內消貼背 破傷血出 何首烏末傳之即止 癰瘡結核 或破或不破下至胸前者皆治之用九真藤一名赤葛即何

并取葉搗塗之數服即止其藥久 癰疽毒瘡 紅內消不限多少瓶中文武火熬煎熟入好無灰酒相等再煎數沸時時飲之其滓焙研服延年更製用之神效 斗門方 為末酒煮煙糊丸梧子大空心溫酒下三十九丸疾退宜常服之即赤何首烏也建昌產者良

陳自明 大風癰疾 何首烏大而有花文者一斤米泔浸一七九蒸九晒胡 疥癬滿身 不可治者何首烏艾葉等分水煎濃湯外科精要 麻四兩九蒸九晒為末每酒服二錢日二服 聖惠方 洗浴甚能解痛生肌肉 王象博濟方

莖葉主 治風瘡疥癬作痒煎湯洗浴甚效 珍

本草綱目草部第十八卷下

草之七 蔓草類

草薺

別錄名藥節百枝吳普竹木炮炙中品釋名藥節百枝論

時珍曰草薺名義未詳日華本草言時人呼為白薺莢象形也亦節百枝與狗脊同名

集解別錄曰草薺生真定山谷二月八月采根曝乾引景曰今處處有之根似

荻莢而小異根大不甚有角節色小淺紫曰此有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟者為勝莖生葉似薺類節曰今河峽下東荆蜀諸郡皆有之作蔓生苗葉俱青葉作三叉似山薯又似綠豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者根黃白色多節三指許大春秋采根曝乾今成德軍所產者根亦如山薯而體硬其苗引蔓葉似薺麥子三稜不拘時月采根利刀切片曝乾用時珍曰草薺生葉似接莢而大如莢其根硬大者如商陸而堅今人皆以上莢為草薺誤矣莖葉根苗皆不同吳普本草又以草薺為狗脊亦誤矣詳狗脊下宋史以懷慶之草薺充貢

下宋史以懷慶之草薺充貢

根氣味苦平無毒

別錄曰甘之才曰慈故為之使畏於根大黃柴胡胡

主治腰脊痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘰熱氣本經傷中惡陰痿失溺老人五緩關

節老血

別錄冷風癰瘰腰脚癱緩不遂手足驚掣更子腎腰痛久冷腎間有膀胱宿水頭眩旋痛疾補水臟堅筋骨益精中風失音大補肝

虛治白濁第痛痔瘻壞瘡

時珍曰草薺足陽明厥陰經藥也厥陰主筋屬風陽明主肉屬濕草薺之功長于去風濕所以能治白濁第痛痔瘻壞瘡珍發明治緩弱瘰癧遺濁惡瘡諸病之屬風濕者草薺拔莢上茯苓三物形雖不同而主治之功不相遠

豈亦一類數種乎雷斅炮炙論序云囊囊旋多夜煎竹木竹本草薺也旋多白濁皆是濕熱下流草薺能治陽明之濕而固下焦故能去濁分清楊俊家藏方治真元不足下焦虛寒小便頻數白濁如膏有草薺分清飲正此意也又楊子建萬全護命方云凡大小便頻數不計度數使莖內痛不可忍者此疾必先大腑秘熱不通水液只就小腸大腑愈加乾竭甚則渾身熱心躁思凉水如此即重症也此疾本因食酒色積有餘毒腐物瘀血之類隨虛水入於小腸故便時作痛也不飲酒者必平生過食辛熱膩之物又因色傷而然此乃小便頻數而痛與淋證澀而痛者不同也宜用草薺一兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽為末每服二錢用附子新三腰脚痺軟行履不穩者水一盞煎八分分兩服之使水道轉入大腸仍以葱湯頻洗穀道令氣得通則小便數及痛自減也

本草綱目卷之八

分杜仲八分搗篩每旦溫酒服三錢
七禁牛肉 唐德宗貞元廣利方
服四錢水一盞入鹽一捻煎七
分食前溫服日一服効乃止
小使頻數 川草薺一斤為末酒糊丸梧子
大每鹽酒下七十丸 集五方
白濁頻數 旋面如油澄下如膏乃真元不足下焦虛寒草
解分清飲用草薺石菖蒲益智仁烏藥等分每

腸風痔漏 如聖散用草薺貫眾去土等分為末每服三
錢溫酒空心服之 孫尚藥傳家秘寶方
頭痛發汗 草薺旋覆花虎頭骨酥炙等分為散飲
發時以溫酒服二錢暖卧取汗立瘥聖

濟錄

拔契

上蒲八切下葉八切 別錄中品

釋名拔契同 金剛根

鐵菱角 王瓜草

日華時珍曰拔契猶短結也短結短也此草莖蔓強堅短小故名拔契而江浙人謂之拔契根亦曰金剛根楚人謂之鐵菱角皆狀其堅而有

尖刺也鄭惟通志云其葉頗近王瓜故名王瓜草 集解別錄曰生山野二月八月采根曝乾乾景曰此有三種大畧根苗並相類拔契莖紫而短小多刺小減草細長而白色拔契根作塊結黃赤色殊非狗脊之類領曰今近道及江浙州郡多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉而差大秋生黃花結黑子如櫻桃大其根作塊人呼金剛根時珍曰拔契山野中甚多其莖似蔓而堅強植生有刺其葉圓大狀如馬蹄光澤似柿葉不類冬青秋開黃花結紅子其根甚硬有硬鬚如刺其葉煎飲酸瀉野人采其根葉入染家用名鐵菱角吳普本草以拔契為狗脊非矣詳見狗脊下

根氣味甘酸平溫無毒

治腰背寒痛風痺益血氣止小便利

治時疾瘟疫

補肝經風虛

治消渴月崩下利

藥氣溫味酸性膏而收與華薺彷彿孫真人元旦所飲辟邪屠蘇酒中亦用之領曰取根浸赤汁煮粉食辟瘴

附方新

小便滑數

沙石淋疾

重者取去根本用拔契二兩

椒煎湯浴腰腹須臾即通也 聖濟錄

消渴不止

拔契即拔契咬咀半兩水三盞為

下痢赤白

金剛根蠟茶等分為末白梅肉搗丸艾子大每服五七丸

毒脚弱 痺滿上氣田舍貧家用此最良拔契洗剉一斛以水三斛煮取良

土茯苓

目校正

併入拾遺

釋名土草薺

刺猪苓

山猪薺

目草薺餘糧

拾仙遺糧

網冷飯團

網硬飯

網山地栗

網目時珍曰按陶弘景注石部為餘糧云

南中平澤有一種藤生葉如孩髮根作塊有節似孩髮而色赤味如薯蕷亦名高飯糧言昔為行山乏食采此充飢而棄其餘故有此名
觀陶氏此說即今土茯苓也故今尚有仙遺糧冷飯團之名亦具遺意陳藏器本草草蕒餘粒穀碾細豬苓下刺猪苓皆此物也今皆
併之茯苓猪苓山地果皆屬之蘇頌曰草蕒餘粒生海畔山谷根如盛連綴半在土上皮如茯苓肉赤味濕人取以當穀食不飢頌曰
形也俗又名過岡龍諺稱也施州一種刺猪苓蔓生春夏根削皮焙乾彼土人用俾瘡毒研粉時珍曰土茯苓楚蜀山等中甚多
蔓生如蔓莖有細點其莖不對狀頗類大竹葉而質厚滑如瑞香葉而長五六寸其根狀如孩髮而圓其大若雞鴨子連綴而生遠者難
尺許近或數寸其肉鮮可生啖有赤白二種入藥用白者良按中山經云鼓鍾之山有草焉名曰樂羊其葉如柳其本如雞卵食之已風
恐即此也昔人不知周此近時弘治正德間因楊梅瘡盛行幸用輕粉藥取効毒留筋骨清爛終身至人用此遂為要
藥諸醫無從考證往往指為草蕒及孩髮然其根迥然不同宜參考之但其功用亦頗相近蓋亦草蕒孩髮之類也

根氣味甘平無毒

時珍曰

主治食之當穀不飢調中止渴健行不睡

器

健脾胃強筋骨去風濕利關節止泄瀉治拘攣骨痛惡瘡癰

腫解聚粉銀朱毒

時珍曰

近有奸淫之人多病楊梅毒瘡瘰癧用輕粉愈而復發久則服體拘攣變為癰漏延綿歲月竟致廢篤惟此
土草蕒三兩或加皂莢半各一錢水六盞煎三盞分三服不數劑多痊蓋此疾始由毒氣干於陽明而發加

以輕粉燥烈久而水衰肝挾相火來旁脾土土屬濕主肌肉濕熱鬱蒸于肌膜故發為癰腫甚則拘攣內經所謂濕氣害人皮肉筋骨是
也土草蕒甘淡而平能去脾濕濕去則替衛從而筋脈柔肌肉實而拘攣漸愈矣初病服之不効者火盛而濕未鬱也此藥長于去濕
不能去熱病久則熱衰氣耗而濕鬱為多故也時珍曰楊梅瘡古方不載亦無病者近時起于嶺表傳及四方蓋嶺表風土卑交嵐瘴重
氣飲啖辛熱男女淫猥濕熱之邪積蓄既深發為毒瘡遂致互相傳染自南而北遍及海宇然皆淫邪之人病之類有數種治之則一也
其毒多屬陰陽明二經而兼乎他經邪之所在則先發出如兼小陰則發于咽喉兼太陽少陽則發于頭耳之類蓋相火寄于厥
陰肌肉屬于陽明故也醫用輕粉銀朱初劑五七日即愈蓋水銀性走而不守加以益鬱升為輕粉銀朱其性燥烈者逐痰涎乃脾之
液此物入胃氣歸陽明故涎被劫隨之上升從咽喉齒縫而出故瘡即乾瘻而愈若服之過劑及用不得法則毒氣竄入經絡筋骨之間
莫之能出痰涎敗去血液耗竭筋失所養營衛不從變為筋骨骨痛較為難愈痛久則生虫為瘡手足皸裂遂成廢痼惟土茯苓氣平
味甘而淡為陽明本藥能健脾胃去風濕脾胃健則營衛從風濕去則筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今醫家有搜風解
毒湯治楊梅瘡不犯輕粉病深者月餘淺者半月即愈服輕粉藥筋骨骨痛癰瘡不能動履者服之亦効其方用土茯苓一兩薏仁金
銀花防風木木瓜通白薢各五分皂莢子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分附方新楊梅毒瘡
用水二大盞煎飲一日三服惟忌飲茶及牛羊雞鵝魚肉燒酒法施房勞蓋秘方也

以身中執行為候十日便覺忌豬肉

千金方 言療不效 用葱白漿水洗淨固之 瑞竹堂方

瑞竹堂方

女萎

本草

集解 蘇曰女萎葉似白欒蔓生花白子細荊襄之間名為女萎亦名蔓蔓用苗不用根與萎
本全別今太常謬以為白頭翁者是也時珍曰諸家誤以女萎解嚴挺正誤見嚴挺下
酒蒸之從已 氣味辛溫無毒主治止下痢消食 風寒酒霍亂瀉痢腸鳴避氣上下無常痛寒熱自汗 唐附方
至未出晒乾 切一升燒熏之 女萎實各一兩川烏頭二兩桂心五錢為末蜜 雞古香木香各二分為末臘猪脂七合和煎入麝

楊氏產乳方 馬下不止 女萎實各一兩川烏頭二兩桂心五錢為末蜜 雞古香木香各二分為末臘猪脂七合和煎入麝
香一錢以浮石磨破 日擦之 古今錄驗

赭魁

本經

時珍曰其根如魁有汁 集解 別錄曰生山谷中二月采弘景曰狀如小羊肉白皮黃近道亦有恭曰赭魁大者如斗小者
下品 藥名 如赭故名魁乃酒器名 集解 如升蔓生草木上葉似杜衡陶所說乃土卵也土卵不堪藥用誤漢人美食之名黃獨非赭

魁也保昇曰苗蔓延生葉似蘿摩根若菰莢皮紫黑肉黃赤大者輪困如升小者如拳所在有之時珍曰赭魁閩人用之染青紙中云易
上色沈括筆談云本草所謂赭魁皆未詳審今南中極多膚黑肌赤似何首烏切破中有赤理如檳榔有汁赤如赭彼人以染皮製靴關
人謂之餘糧本草石部禹餘糧陶氏所引乃此物也謹按沈氏所說赭魁甚明但謂是禹餘糧者
非禹餘糧今乃之土茯苓可食故得糧名赭魁不可食豈得稱糧耶土卵即土芋也見菜部

根

氣味平無毒 集解 小者

主治心腹積聚除三蟲 本經

鵝抱

宋圖

集解 頌曰生宜州山林下附石而生作蔓似大豆其根形似菜 氣味苦寒無毒主治風熱上癰咽喉腫痛及解絲絲毒根末
經 藥大者如三升器小者如拳二月八月采根切片陰乾用 氣味苦寒無毒主治風熱上癰咽喉腫痛及解絲絲毒根末

酒服有效亦消風熱結毒酒摩塗之立愈 蘇頌

伏雞子根

拾遺

集解 蘇曰生四明天台山蔓延生 氣味苦寒無毒主治解百藥毒諸熱煩悶惡黃天行黃疸瘧瘴中惡
遺釋 蘇曰生四明天台山蔓延生 氣味苦寒無毒主治解百藥毒諸熱煩悶惡黃天行黃疸瘧瘴中惡

寒熱頭痛瘡馬黃牛瘡水磨服之新者尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功 藏附錄 拾遺 飛尸喉痺亦磨傅皮膚患腫生東陽山谷苗似

承露仙根圓如仰人肝膝拾遺藏器曰主解諸藥毒遊風手脚軟痺並生研服之塗之生嶺南山石間引蔓而生葉有三極盆狀大如雞卵花紫色與伏雞子同名承露仙而伏雞子葉圓時珍曰以根三兩磨汁或煎濃汁服並解蠱毒

千金藤宋開寶校正自木部移入此集解藏器曰千金藤有數種南北名樣不同大畧主療相似或是皆近于藤也生北地者根大如指色似漆草生華顯有漚子似鶴膝葉如柳亦名千金藤又一種似荷葉只大如錢詩亦呼為千金藤又名古藤主痢及小兒大腹千金者以貴為名豈俱一物亦狀異而名同耶若取的稱未知孰是又云嶺南有陳思炭亦名千金藤氣味主一切血毒

諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧疾嗽不利癰腫大毒藥石發癰癩瘰癧之藏附錄陳思炭拾遺藏器曰出嶺南山野蔓生如小豆根及葉毒解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蠱毒並磨汁服之亦磨塗瘡腫均曰味甘平浸酒服治風補益輕身

九仙子綱目釋名仙女孺孺時珍曰九仙子出均州太和山一根連蔓九枚大者如雞子小者如半夏白色二月生苗蔓高六七尺葉細而光葉如烏柏葉而短扁不圓每葉梗生子枝或一或二葉裏下垂六七七月開碎青黃色花隨即結實碎子叢簇如穀精草子狀九月采根氣味苦涼無毒主治咽喉腫散血以新汲水或醋磨汁含嚥甚良時

山豆根宋開寶釋名解毒綱目黃結綱目豆根因其蔓如大豆根山豆根生劔南及宜州果州山谷今廣西亦有以忠州萬州者為佳故嶺南人捕鼠取腸胃曝乾解毒攻熱効氣味甘寒無毒時珍曰按沈括筆談云山豆根味極苦本草言味甘大誤矣主解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱嗽治人及馬急黃殺小蟲

含之嚥汁解咽喉腫毒極妙錄研末湯服五分治腹脹喘滿酒服三錢治女人血氣腹脹又下寸白諸蟲丸服止下痢磨汁服止卒患熱

厥心腹痛五腫痔痛研汁塗諸熱腫瘡蛇狗蜘蛛傷時珍附方新三解中藥密取山豆根和水研服少許未定再服已覺聲者亦愈五般急黃山豆根末水服二錢若帶蠱氣以酒下霍亂吐利山豆根末橘皮湯下三錢赤白下痢山豆根末蜜丸梧子大每服二十九空水蠱腹大有聲而皮色黑者山豆根半盞服入口

下霍亂吐利山豆根末橘皮湯下三錢赤白下痢山豆根末蜜丸梧子大每服二十九空水蠱腹大有聲而皮色黑者山豆根半盞服入口

下霍亂吐利山豆根末橘皮湯下三錢赤白下痢山豆根末蜜丸梧子大每服二十九空水蠱腹大有聲而皮色黑者山豆根半盞服入口

下霍亂吐利山豆根末橘皮湯下三錢赤白下痢山豆根末蜜丸梧子大每服二十九空水蠱腹大有聲而皮色黑者山豆根半盞服入口

下霍亂吐利山豆根末橘皮湯下三錢赤白下痢山豆根末蜜丸梧子大每服二十九空水蠱腹大有聲而皮色黑者山豆根半盞服入口

下霍亂吐利山豆根末橘皮湯下三錢赤白下痢山豆根末蜜丸梧子大每服二十九空水蠱腹大有聲而皮色黑者山豆根半盞服入口

即豆風熱痛 山豆根末油 頭上白屑 山豆根末浸 油日塗之 牙齦腫痛 山豆根一片含于痛 喉中發癰 山豆根末醋膏之追涎即愈勢重不能言者 定豆風熱痛 調金兩太陽 頭上白屑 油日塗之 牙齦腫痛 所已上並備急方 喉中發癰 山豆根末醋膏之追涎即愈勢重不能言者 類聚 煩熱甚者水研山豆根 疥癬瘡 山豆根末臘猪脂 風濕證 牙關緊閉水穀不下山豆根白藥等分水 方 癰疽 汁服少許 經驗方 調塗 備急方 喉風 煎當之嚥下三二口即愈 楊青叟外科

黃藥子

宋開 校正 自本部釋名水藥子 綱目大苦 綱目赤藥 綱目紅藥 時珍曰按沈括筆談云本草甘草注引郭璞注爾雅云蓋大苦者云 藥也其味極苦故 集解 綱目黃藥原出嶺南今楚陝州郡及明越秦隴山中亦有之以忠州萬州者為勝藤生高三四尺根及莖似小桑 曰大苦非甘草也 十月采根秦州出者謂之紅藥子施州謂之赤藥葉似蒼桑枝梗赤色七月開白花其根濕時紅赤色曝乾即黃 本經有藥實根云生蜀郡山谷蘇恭云即藥子也用其核仁疑即黃藥之實但言葉似杏其花紅白色子肉味酸此為不同時珍曰黃藥 子今處處裁之其莖高二三尺柔而有節似藤實非藤也葉大如拳長三寸許亦不似桑其根長者尺許大者圍二三寸外褐內黃亦有 黃赤色者肉色頗似羊蹄根人皆憐其根入藥監服中云易變色也唐蘇恭言藥實根即藥子采藥須遂以 為黃藥之實然今黃藥之枯春生開辟花無實種藥所謂藥子亦不專言黃藥則藥實所言亦未可憑信也

根氣味苦平無毒

大明曰涼治 馬心肺熱疾 主治諸惡腫瘰癧瘰癧蛇犬咬毒研水服之亦含亦塗 開 涼血降火消癰解毒 時珍曰孫思邈千 金月令方療 生癰疾一二年者以萬州黃藥子半斤須繁重者為上如輕虛即是他州者力慢須用加倍取無灰酒一斗投藥入中因濟瓶以糠火燒 一復時待酒冷乃開時時飲一杯不令絕酒氣經三五日後常把鏡自照膿消即停飲不爾便令人項細也劉禹錫傳信方亦著其効云 得之邕州從事張蒼蒼目擊有幼復試其驗如神其方並同惟小有 附方 舊三項下癰氣 藥黃子一斤洗剉酒一斗浸之每日早晚常服 異處是燒酒候香出外瓶頭有津出即止不待一宿火不可得猛耳 新三項下癰氣 藥黃子一斤洗剉酒一斗浸之每日早晚常服 知其効也 吐血不止 藥子一兩水煎 聖惠方 哈血吐血 藥子一兩水煎 聖惠方 產後血暈 惡物冲心四肢冰冷唇青腹脹昏迷紅藥子一兩頭紅花一錢水二盞 手集方以新汲水磨汁一盞頓服 簡要濟眾方 婦人油飲二隻同煎一盞服大小便俱利血自下也 禹講師經驗方

泡水瘡

黃藥子末搽 集簡方 草部 四

本草綱目

卷十八下

解毒子

唐本

釋名地不容

唐本

經集解

恭曰地不容生川西山谷采無時鄉人呼為解毒子也頃曰出戎州蔓生葉青如杏葉而

州與元府出苦藥子大抵與黃藥相類春采根曝乾亦入馬藥用時珍曰四川志云苦藥子出忠州性寒解一切毒川蜀諸處皆有即解毒子也或云邛州苦藥子即黃藥子也方言稱呼不同耳理亦近之

根氣味苦大寒無毒主治解熱毒煩熱辟瘴癘利喉閉及疫毒

唐本

治五臟邪氣清肺壓熱

唐本

消痰降火利咽喉退目赤

時珍

附方

新

一咽

喉腫痛

水漿不下苦藥山豆根甘草消石各一分射干

聖惠方

眉稜骨痛

熱痛攻眼頭痛眉痛壯熱不止解毒子木香川大黃

各三分為末漿水調膏攤貼乾即易之

普濟方

附錄

又會早

海

藥

頭目赤辛平無毒主小兒無毒冷疳虛渴肚脫骨立瘦損脾

胃不磨劉五狼方月為煎服生西國諸戎大小如苦藥子

海藥膏

本經曰味辛溫無毒主邪氣諸痺痰酸續絕傷補骨髓一名連木

別錄曰生蜀郡山谷采無時恭曰此藥子也當今感用胡名那疏

出通州渝州其子味辛平無毒主破血止刺消腫除蠱蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸止用其仁本經誤載根字時珍曰此藥

子雖似黃藥苦藥子而稍有不同二藥子不結子此則樹之子也為洪肘後方云澄羅門名那疏樹子中國人名藥子去皮取中仁細研

服治諸

病也

服治諸

病也

服治諸

病也

服治諸

白藥子

唐本

集解

恭曰白藥子出原州三月生苗葉似苦苣四月抽赤莖長似壺盧莖六月開白花八月結子亦名瓜萼九月葉落枝

折采根洗切日乾根皮黃色名白藥子頃曰今變施合州江西嶺南亦有之江西出者葉似烏柏子如綠豆至六月

變成赤色治

馬熱方用之

變成赤色治

馬熱方用之

變成赤色治

馬熱方用之

變成赤色治

馬熱方用之

變成赤色治

根氣味辛溫無毒

權曰

主治金瘡生肌

唐本

消腫毒喉痺消痰止咳治渴并吐血大治喉中熱痛不通咽中常痛腫

雅

解毒子

生金

色

白

藥

子

根

皮

藥毒乃斧折傷乾未傳之能止血痛

馬

散火降血消痰解毒

時珍

附方

新

天行熱病

白藥為末漿水一盞冷調二錢服仰臥少頃心門或

腹鳴痛當吐利數行如不止喫冷粥一盞止之

喉中熱塞

腫痛散血消

聖濟

心痛解熱

白藥根野猪尾二味洗去粗皮焙乾

聖濟

心痛解熱

白藥根野猪尾二味洗去粗皮焙乾

等分傷師酒服一錢甚効數人用之

風熱上壅

咽唯不利白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去牽一

半為末防風三兩和勻每茶服一錢

聖惠方

喉中熱塞

腫痛散血消

聖濟

心痛解熱

白藥根野猪尾二味洗去粗皮焙乾

等分傷師酒服一錢甚効數人用之

風熱上壅

咽唯不利白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去牽一

半為末防風三兩和勻每茶服一錢

聖惠方

喉中熱塞

腫痛散血消

聖濟

心痛解熱

白藥根野猪尾二味洗去粗皮焙乾

等分傷師酒服一錢甚効數人用之

風熱上壅

咽唯不利白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去牽一

半為末防風三兩和勻每茶服一錢

聖惠方

喉中熱塞

腫痛散血消

聖濟

心痛解熱

白藥根野猪尾二味洗去粗皮焙乾

等分傷師酒服一錢甚効數人用之

風熱上壅

咽唯不利白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去牽一

半為末防風三兩和勻每茶服一錢

聖惠方

喉中熱塞

腫痛散血消

聖濟

心痛解熱

等分為末吹之日
四五次 直指 咽喉腫痛 白藥末一兩龍腦一分蜜和丸
聖惠方 吐血不止 白藥燒存性糯米飲
服三錢 聖惠方 血血不止 紅雪白藥各燒存性等分為末
米飲服或煎湯洗鼻頻頻縮藥全

人經 胎熱不安 鐵軍散用白藥子一兩白芷半兩為末每服二
錢紫蘇湯下心煩熱入沙糖少許 聖惠方 一切瘡眼 赤爛生醫白藥子一兩甘草半兩為末猪肝
良方 胎熱不安 鐵軍散用白藥子一兩白芷半兩為末每服二
錢紫蘇湯下心煩熱入沙糖少許 聖惠方 一切瘡眼 赤爛生醫白藥子一兩甘草半兩為末猪肝

上 諸噎 白藥煎米醋細嚼在上即吐 癰腫不散 生白藥根搗貼乾則易之無生
出在下即下出 普濟方 癰腫不散 者研末水和貼乾易之 圖經 附錄陳家白藥 拾遺藏器曰味苦寒無毒主解諸藥
毒水研服入腹與毒相攻必吐出未

吐盡更服亦去心胸煩熱天行瘟疫出蒼梧陳家故有陳家之號明山有之蔓及根並似土瓜葉如錢根似防已緊小者良人亦采食之
與陳羅門白藥及赤藥功用並相似時珍曰按劉向嶺表錄云陳家白藥善解毒諸藥不及之救人甚多封州康州有種之者廣府
中每歲充上貢按此藥當時充貢今無 復有或有不之古今名謂有不同耳 甘家白藥 拾遺藏器曰味苦大寒有小毒解毒藥水研服即吐出未盡再吐與陳家白藥功相
似二物性冷與霍亂下利人相反出藥州以南生陰處華似車前根如半夏其汁飲之

有如蜜因入而名嶺南多毒物 會州白藥 拾遺藏器曰主金瘡生肌止血 衡洞根 拾遺藏器曰味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒出
物亦多解毒物宜天資之乎 碎末傳之出會州葉如白欒 嶺南惠州取根陰乾功用同陳家白藥而苗蔓不相似
均曰苗蔓如土瓜根亦相似味辛溫主平完毒 突厥白 宋開寶藏器曰味苦主金瘡生肌止血補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石炭
氣及蛇傷取根磨水服之諸毒悉皆吐出也 諸藥合或者志曰今所用者出潞州其根黃白色狀如茯苓而虛軟苗高三四尺

香真葉如蓮荷花似牽牛而紫 上有白粉二月八月采根曝乾

威靈仙 宋開寶 時珍曰威言其性猛 集解 志曰出嵩州上洛山及華山并平澤以不開水聲者良生先於眾草方並數葉相對冬月
實 釋名 也靈仙言其功神也 集解 志曰出嵩州上洛山及華山并平澤以不開水聲者良生先於眾草方並數葉相對冬月
東河北汴東江湖州郡皆有之初生作蔓蔓如釵股七月內生花六出淺紫或碧白色作穗似葶藶子亦有似菊花頭者實青色根稠密
多須似穀每年朽敗九月采根時珍曰其根每年旁引年深轉茂一根葉鬚數百條長者二尺許初時黃黑色乾則深黑俗稱鐵腳威靈
仙以此別有數種根鬚一樣 但色或黃或白皆不可用

根氣味苦溫無毒 元素曰味甘統陽人太陽經果曰可升可降 陰中陽也時珍曰味微辛鹹不苦忌茗藟湯 主治諸風宣通五臟去腹內冷滯心隔痰水久積癰瘰瘰癧氣塊膀胱

本草綱目 卷十八下 草部

五

五

五

五

宿腫寒腰膝冷疫癘折傷久服無有濕疫瘧開寶推新舊精滑胸中痰唾散皮膚大腸風邪景發明頌曰唐貞元中嵩陽子周君巢作

二經脈朝服暮効踈宣五臟冷膿宿水瘕病微利不瀉人服此四肢輕健手足微暖並得清涼此時商州有人病手足不遂不履地者數十年良醫彈技其能療所親置之道旁以求救者過一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否為之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊知已遂傳其事此藥治丈夫婦人中風不語手足不遂口眼喎斜言語蹇澀初起即風連勝風胎風頭風暗風心風風狂大風皮膚風痒白癩風熱毒風瘡頭旋目眩手足頑痺腰膝疼痛久立不得曾經損聲腰膝痛腎臟風瘕信寒瘕氣喘寒壯熱頭痛流涕黃疸黑頭面浮腫腹內宿滯心頭痰水勝狀口口中涎水冷熱氣壅肚腹脹滿好喫茶滓一痛注氣服氣冷氣攻衝脾前諸氣痰熱欬嗽氣急上卧不安氣衝新眼赤攻耳成膿陰汗盜汗大小腸秘服此立通氣痢痔疾瘰癧疥癬婦人月水不來動運多日氣血衝心產後秘塞孩子無辜並皆治之其法米得根陰乾月餘搗末調一錢七空腹服之如人本性較藥可加及六錢利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麴湯以甘草厄子代飲可也又以一味洗焙為末以好酒和令微濕入在竹筒內緊塞九蒸九曝如乾漆酒酒之以白蜜和丸梧子大每服二十至三十九丸溫酒下崔元亮海上集驗方著其詳如此藥曰腰腎脚膝積服之尤効其性好走亦可橫行故崔元亮言其去眾風通十二經脉朝服暮効凡采得醴流水聲者知其性好走也須不聞水聲者乃佳時珍曰威靈仙氣溫味微辛鹹辛泄氣鹹泄水故風濕痰飲之病人氣壯者服之有捷効其性大抵疎利久服恐損真氣氣弱者亦不可服

附方舊四新脚氣入腹張問喘急用威靈仙末每服二錢酒下腰脚諸痛千金方用威靈仙末空心溫酒服一錢逐日以微利為度服之一十六脚氣入腹痛減一分則藥亦減一分簡便方

大以浸藥酒腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大溫酒服八十九丸平明微利惡物如膏膠膠即是風毒積因患楊梅瘡每服二十丸腎臟風壅滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服溫補藥孫兆方名枚杖丸集驗筋骨痛服輕粉毒藥桂香土火毒逐日飲之以愈為度集簡方破傷風病威靈仙半兩獨頭蒜一個香油一錢同搗時發痲痺或打撲傷痛痛不五兩生川烏頭靈脂各四兩為末醋糊丸梧子大每服七丸用鹽湯下忌茶普濟方男婦氣痛不拘久近威靈仙五兩生韭根二錢半烏藥五分好酒一盞難子一個灰火煨一塊刺痛是其驗威靈仙一把醋審各半盞煎五分宿痰宿飲喘欬嘔逆全不入食威靈仙焙半斤薑汁浸焙為末用皂角水熬也摘玄方噎塞膈氣服之吐出宿痰愈唐陸龜陸方

服之一十六脚氣入腹痛減一分則藥亦減一分簡便方

大以浸藥酒腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大溫酒服八十九丸平明微利惡物如膏膠膠即是風毒積因患楊梅瘡每服二十丸腎臟風壅滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服溫補藥孫兆方名枚杖丸集驗筋骨痛服輕粉毒藥桂香土火毒逐日飲之以愈為度集簡方破傷風病威靈仙半兩獨頭蒜一個香油一錢同搗時發痲痺或打撲傷痛痛不五兩生川烏頭靈脂各四兩為末醋糊丸梧子大每服七丸用鹽湯下忌茶普濟方男婦氣痛不拘久近威靈仙五兩生韭根二錢半烏藥五分好酒一盞難子一個灰火煨一塊刺痛是其驗威靈仙一把醋審各半盞煎五分宿痰宿飲喘欬嘔逆全不入食威靈仙焙半斤薑汁浸焙為末用皂角水熬也摘玄方噎塞膈氣服之吐出宿痰愈唐陸龜陸方

服之一十六脚氣入腹痛減一分則藥亦減一分簡便方

大以浸藥酒腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大溫酒服八十九丸平明微利惡物如膏膠膠即是風毒積因患楊梅瘡每服二十丸腎臟風壅滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服溫補藥孫兆方名枚杖丸集驗筋骨痛服輕粉毒藥桂香土火毒逐日飲之以愈為度集簡方破傷風病威靈仙半兩獨頭蒜一個香油一錢同搗時發痲痺或打撲傷痛痛不五兩生川烏頭靈脂各四兩為末醋糊丸梧子大每服七丸用鹽湯下忌茶普濟方男婦氣痛不拘久近威靈仙五兩生韭根二錢半烏藥五分好酒一盞難子一個灰火煨一塊刺痛是其驗威靈仙一把醋審各半盞煎五分宿痰宿飲喘欬嘔逆全不入食威靈仙焙半斤薑汁浸焙為末用皂角水熬也摘玄方噎塞膈氣服之吐出宿痰愈唐陸龜陸方

服之一十六脚氣入腹痛減一分則藥亦減一分簡便方

大以浸藥酒腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大溫酒服八十九丸平明微利惡物如膏膠膠即是風毒積因患楊梅瘡每服二十丸腎臟風壅滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服溫補藥孫兆方名枚杖丸集驗筋骨痛服輕粉毒藥桂香土火毒逐日飲之以愈為度集簡方破傷風病威靈仙半兩獨頭蒜一個香油一錢同搗時發痲痺或打撲傷痛痛不五兩生川烏頭靈脂各四兩為末醋糊丸梧子大每服七丸用鹽湯下忌茶普濟方男婦氣痛不拘久近威靈仙五兩生韭根二錢半烏藥五分好酒一盞難子一個灰火煨一塊刺痛是其驗威靈仙一把醋審各半盞煎五分宿痰宿飲喘欬嘔逆全不入食威靈仙焙半斤薑汁浸焙為末用皂角水熬也摘玄方噎塞膈氣服之吐出宿痰愈唐陸龜陸方

服之一十六脚氣入腹痛減一分則藥亦減一分簡便方

大以浸藥酒腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大溫酒服八十九丸平明微利惡物如膏膠膠即是風毒積因患楊梅瘡每服二十丸腎臟風壅滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服溫補藥孫兆方名枚杖丸集驗筋骨痛服輕粉毒藥桂香土火毒逐日飲之以愈為度集簡方破傷風病威靈仙半兩獨頭蒜一個香油一錢同搗時發痲痺或打撲傷痛痛不五兩生川烏頭靈脂各四兩為末醋糊丸梧子大每服七丸用鹽湯下忌茶普濟方男婦氣痛不拘久近威靈仙五兩生韭根二錢半烏藥五分好酒一盞難子一個灰火煨一塊刺痛是其驗威靈仙一把醋審各半盞煎五分宿痰宿飲喘欬嘔逆全不入食威靈仙焙半斤薑汁浸焙為末用皂角水熬也摘玄方噎塞膈氣服之吐出宿痰愈唐陸龜陸方

腹中痞積威靈仙楮桃兒各一兩為末每溫酒服三錢名化鐵丸普濟

大腸冷積威靈仙末蜜丸梧子大一更時生薑湯下十九至二十丸經驗良方

腸風瀉血久者威靈仙雞冠花各二兩米醋二升煮乾炒為末以雞子白和作

小餅炙乾再研每服二錢威靈仙三兩水一斗煎湯先重

諸骨哽咽威靈仙一兩二錢砂仁一兩沙糖一盞水二鍾煎一鍾溫

服乾坤生用意用威靈仙米醋浸二日晒研末醋糊丸梧

陳米飲下日二服聖濟痔瘡腫痛後洗冷再溫之外科精義

飛絲纏陰腫痛欲斷以威靈仙搗汁浸洗

瘡瘡黑陷鐵脚

子大每服二三丸半茶半湯下如欲吐以銅青末半匙入油一二點茶服探吐

○聖濟錄治雞骨哽喉赤莖威靈仙五錢并草水煎服即軟如綿吞下也甚効

仙炒研一錢腦子一分溫水調服取

下瘡癰為効意同百詳丸儒門事親

茜草

本經上品校正併入有名未定音義音

地血別錄染緋草蜀本見愁土宿風車草土過山龍補牛蔓

時珍曰按陸佃云許氏說文言莧乃人血所化

則草鬼為莧以此也陶隱居本草言東方有而少不如西方多則西草為莧又以此也陸機云齊人謂之茜徐人謂之牛蔓又草之盛者為莧牽引為茹連覆為庵則蒨茹庵之名又取此義也人血所化之說恐亦俗傳耳土宿真君本草云四補草其根莧草也一名西天王草一名四岳近陽草一名鐵塔草風車兒草蒨器曰有名未用苗根即莧根也莧苗二字相似傳寫之誤爾宜併之

解別錄曰苗根生喬山山谷二月三月采根曝乾又曰苗根生山陰谷中蔓未用苗根即莧根也莧苗二字相似傳寫之誤爾宜併之

不如西多詩云茹庵在阪者是也採其曰染絳草葉似寒頭尖下潤莧葉俱漚四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色所在皆有八月采頌曰今國人亦作畦種蒨故史記云千畝危蒨其人與千戶侯等言其利厚也時珍曰莧草十二月生苗蔓延數尺方莖中空有筋

外有細刺數寸一節每節五葉葉如烏藥葉而糙澀

面青背綠七八月開花結實如小椒大中有細子

根修治

數曰凡使用鋼刀於槐砧上剉日乾勿犯鉛鐵氣勿用赤柳草根煎氣味苦寒無毒權曰甘天明曰酸入藥炒用蜜炙曰熟元

鼠始汁制雄黃相似只是味酸瀉誤服令人患內障服速服甘草水止之即毒氣散

主治

寒濕風痺黃疸補本止血內崩下血膀胱不足跌跌毒及服益精氣輕身可以染絳又苗根主痺及熱中傷

跌折別錄

治六極傷心吐血瀉血經止鼻流血產後血運月經不止帶下撲損淤血泄精痔瘻瘡癰排膿酒煎服大

通經脈治骨節

痛

本

草綱目

卷十八下

草部

六

本草綱目

痛活血行血

時珍發明

用草藥取速効如石綠為君過山龍等佐之皆熱性而燥不能養陰却能燥濕病之淺者濕痰得燥而開淤血得熱而行故亦暫効若病深而血少者則愈切愈虛而病愈深矣時珍曰茜根赤色而氣溫味微酸而帶鹹色赤入營氣溫行滯味酸入肝而鹹走血手足厥陰血分之藥也專于行血活血俗方治女子經水不通以一兩煎酒服之一日即通甚効名醫別錄言其久服益精氣輕身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定

可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

剪草

日華子

載器曰剪草生山澤間葉如茗而細江東用之頌曰生潤州二月三月采曝乾用時珍曰按許叔微本事方言剪草狀如茜草又如細辛發台二州皆有之惟婺州者可用其說殊詳今遍詢訪無識者或云即茜草也未有據

根氣味苦涼無毒

平

主治諸惡瘡疥癬風瘙癢蝕有蟲浸酒服大 一切失血 時珍發明 元素曰上部血須用剪草牡丹皮天門冬麥

虞博云血藤即過山龍理亦相近未和的否姑附之

肝不收

蓋煎七分溫服 聖惠方 子解瘡 時行瘡疹正發服此則可無患 附錄血藤 宋圖經頌曰生信州葉如蔓蘭華根如大梅指

鬚烏髮

茜草一斤生地黃三斤取汁以水五大盞煎茜絞汁持滓再煎三度以汁同地黃汁微火煎如膏以瓶盛之每日空心溫酒服半匙一月髮髮如漆也忌蘿蔔五辛 聖濟錄 蟻蝨漏瘡 茜根燒灰千年石灰等分為脫末油調傳之 儒門事親方

每帖水一盞半煎七分

髮灰服之 唐陸經驗方 女子經閉 方見前 心痺心煩 內熱茜根煮汁 解中蠱毒 吐下血如猪肝茜草根葉荷華各三分水四升煮二

錄 鼻血不止

茜根艾葉各一兩烏梅肉二錢半為末煉蜜 九梧子大每為梅湯下五十九 本事方 五旬行經 婦人五十後經水不止者作敗血論用茜根一名過山薑二兩阿膠

身日華子言其泄精

殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

殊不相合恐未可憑

附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精

殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

殊不相合恐未可憑

附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

身日華子言其泄精

殊不相合恐未可憑附方新八吐血不定 可水服二錢服 周應蘭要濟方 吐血躁渴 及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分為末并水丸彈子大每服溫水化一丸 聖濟

此而世去
傳惜哉
附方
風蟲牙痛
熱漱少頃自止
中藏經
風瘡癢痒
滑肌散治風邪客于肌中渾身癢痒致生瘡疥及脾肺風毒攻衛生瘡
乾濕日久不瘥用剪草七兩不見火輕粉一錢為末慘之乾者麻油調

和
劑局方

防已

本經 時珍曰按東垣李杲云防已如險健之人幸災樂禍能首為
中品 經石解 亂階若善用之亦可禦敵其名或取此義解難因其紋解也
黃如桔梗內有黑紋如車輻解者良弘景曰今出宜都建平大而青白色虛軟者好黑點木強者不佳服食亦須之頌曰今黔中亦有之
但漢中出者破之文作車輻解黃實而香並根耳嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通然他處者青白虛軟又有腥氣
皮皺上有丁子名木防已蘇恭言木防已不佳用而古方張仲景治傷寒有增減木防已湯及防已地黃湯五物防已
已湯黃芪六物湯孫思邈治遺尿小便澀亦有三物木防已湯藏器曰如陶所說漢水二防已即是根苗為名
鐵上有丁子足子不堪用惟要心有花文黃色者細剉以車前草
根相對蒸半日曬乾取用時珍曰今人多去皮剉酒洗晒乾用
氣味辛平無毒
大寒權曰苦有小毒元素曰大苦辛寒陰也泄之才曰

般變為之使殺雄黃毒惡細
辛畏葶藶女苑齒鹹伏消石
主風寒濕熱氣諸癰除邪利大小便
瘰癧水腫風腫去腰脫熱傷寒熱邪氣中風手脚攣急通脹理利

九竅止洩散癰腫惡結諸瘡癰癰瘡
治濕風口面喝斜手足拘攣散留痰肺氣喘嗽
治中下濕熱腫脚氣行十二經
木防已

主治男子肢節中風毒風不語散結氣擁腫溫瘧風水腫去腰脫熱
經石解 亂階若善用之亦可禦敵其名或取此義解難因其紋解也
黃如桔梗內有黑紋如車輻解者良弘景曰今出宜都建平大而青白色虛軟者好黑點木強者不佳服食亦須之頌曰今黔中亦有之
但漢中出者破之文作車輻解黃實而香並根耳嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通然他處者青白虛軟又有腥氣
皮皺上有丁子名木防已蘇恭言木防已不佳用而古方張仲景治傷寒有增減木防已湯及防已地黃湯五物防已
已湯黃芪六物湯孫思邈治遺尿小便澀亦有三物木防已湯藏器曰如陶所說漢水二防已即是根苗為名
鐵上有丁子足子不堪用惟要心有花文黃色者細剉以車前草
根相對蒸半日曬乾取用時珍曰今人多去皮剉酒洗晒乾用
氣味辛平無毒
大寒權曰苦有小毒元素曰大苦辛寒陰也泄之才曰

已草龍膽為君黃藥知母甘草佐之防已乃太陽本經藥也景曰本草十劑云通可去滯通草防已之屬是也夫防已大苦寒能瀉血
中濕熱通其滯塞亦能瀉大便補陰瀉陽助秋冬瀉春夏之藥也此之於人則險而健者也幸災樂禍能首為亂階然善用之亦可敵兇
突險此腰眩之藥也故聖人存而不廢大抵聞其臭則可惡下咽則令人身心煩亂飲食減少至于十二經有濕熱壅塞不通及下注脚
氣除膀胱積熱而底其基本非此藥不可真行經之仙藥無可代之者若夫飲食勞倦陰虛生內熱元氣衰食已虧以防已泄大便則重
亡其血此不可用一也如人大渴引飲是熱在上焦肺經氣分宜滲泄而防已乃下焦血分藥此不可用二也外傷風寒邪傳肺經氣分
濕熱而小便黃赤乃至不通此上焦氣病禁用水藥此不可用三也大抵上焦濕熱者皆不可用下焦濕熱流入十二經致二陰不通者

草部

草部

草部

草部

草部

然後著附方新九皮水附腫按之沒指不惡風水氣在皮膚中四肢聶動者防已伏苓湯主之防已黃氏桂枝各三兩茯苓六兩甘草三兩每服一兩水一升煎半升服日二服張仲景方風水惡風汗出身重脈浮

之防已一兩黃芪二兩二錢半白朮七錢半炙甘草半兩兩劑散每服五錢生風濕相搏關節沉痛微腫小便淋瀝三物木防已湯用木防已防風葵子各二兩

薑四片棗一枚水一盞半煎八分溫服良久再服腹痛加芍藥仲景方風濕相搏惡風方同上小便淋瀝三物木防已湯用木防已防風葵子各二兩

咀水五升煎二升半其人喘滿心下痞堅面黃其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之虛者即愈實者三日分三服千金方隔間受飲復與之不愈去石膏加茯苓芒消主之用木防已三兩人參四兩桂枝二兩石膏雞子大十二枚水六升

煮二升分服傷寒喘急防已人參等分為末桑肺痿喘嗽漢防已末二錢漿水一錢張仲景方傷寒喘急白湯服二錢不拘老小肺痿喘嗽漢防已末二錢漿水一錢肺痿喘嗽漢防已末二錢漿水一錢

止生防已末新汲水服二錢霍亂吐利防已白芷等分為末新目睛暴痛防已酒浸三次為末每一解雄黃毒防已煎仍以少許嚙之聖惠方霍亂吐利汲水服二錢聖惠方目睛暴痛服二錢溫酒下摘立方解雄黃毒汁服之

實主治脫肛焙研煎飲代茶通草本經釋名木通士附支本通草時珍曰有細細孔兩頭皆通故名通草即今所謂木通也今之集解別錄曰

石城山谷及山陽正月二月采枝陰乾景曰今出近道遠樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良或云即莖藤莖也此物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉子長三四寸核黑數白食之甘美南人謂為燕覆子或名烏覆子遇七八月

采之藏器曰江東人呼為黃葛子江西人呼為攀子如葉袋熟黃子黑食之去皮蘇云色白者乃據葛也頌曰今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之藤生蔓大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗類石韋又似芍藥二葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜食之

甘美即陳士良本草所謂椹椹子也其枝今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也古方所用通草皆今之木通其通脫木稀有用者或以木通為葛藟苗者非也按張氏燕吳行紀載揚州甘泉東院兩廡山有通草其形如椿少葉子垂稍際如苦棟與今所說不同或

別一物也時珍曰今之木通有紫白二色紫者皮厚味辛白氣味辛平無毒別錄曰甘權曰微寒普曰神農黃帝辛雷公主治除脾胃寒者皮薄味淡本經言味辛別錄言味甘是二者皆能通利也

熱通利九竅血脉關節令人不忘去蠱本經療瘕瘕瘕欲眠心煩嘔吐音聲治耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻跖折髕骨肉

墮胎去三蟲別錄治五淋利小便開關格治人多睡主水腫浮大觀利諸經脉寒熱不通之氣說理風熱小便數急痛小腹虛滿且煎湯并

葱飲有効良安心除煩止渴退熱明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癰止痛推生下胞女人血閉月候不勻天行時疾

頭痛目眩羸劣乳結及下乳大利大小便令人心實下氣藏器主諸瘰癧喉痺咽痛濃煎含嚥通經利竅導小腸火暴明保日本草十

通草防己之屬是也夫防己大苦寒能瀉血中濕熱之滯又通大便通草甘淡能助西方秋氣下降利小便專瀉氣滯也肺受熱邪津液

氣化之原絕則寒水斷流膀胱受濕熱癰閉約縮小便不通宜此治之其症胸中煩熱口燥古乾咽乾大渴引飲小便淋瀝或閉塞不通

脛痠脚熱並宜通草主之凡氣味與之同者茯苓澤瀉燈草猪苓琥珀瞿麥車前子之類皆可以滲濕利小便泄其滯氣也又曰木通下

行泄小腸火利小便與琥珀同功無他藥可此時珍曰木通手厥陰心包絡手足太陽小腸膀胱之藥也故上能通心清肺治頭痛利九

竅下能泄濕熱利小便通大腸治通身拘痛本經及別經皆不言及利小便治淋之功甄權曰華子蟬始發揚之蓋其能泄丙丁之火則

肺不受邪能通水道水源既清津液自化而諸經之濕與熱皆由小便泄去故古方導赤散用之亦瀉南補北扶西抑東之意揚仁齋直指

方言入遍身胸腹隱熱疼痛拘急足冷皆是伏熱附方舊二心熱尿赤面赤唇乾咬牙口渴導赤散用木通生地黃炙傷血血屬於心宜木通以通心竅則經絡流行也新一甘草等分入水竹葉七片水煎服錢氏方婦人血氣木通濃煎三五

益飲之即通孟詵本草金瘡踣折通草煮汁鼠瘻不消方同上權子氣味甘寒無毒誦曰平南人多食之北人不知其功主治厚腸胃令人能食下三焦惡氣續五臟斷絕氣使語聲足氣通十二經脉和核食之孟詵除三

焦客熱胃口熱閉胃不下食良止渴利小便時珍通脫木法釋名通草綱目注音楚離南頌曰爾雅離南活范即通脫也山海經名冠脫人名倚南泉曰陰竅潘而不利水腫閉集解識器

通脫木象釋名通草綱目注音楚離南頌曰爾雅離南活范即通脫也山海經名冠脫人名倚南泉曰陰竅潘而不利水腫閉集解識器

用後不用苗得昇曰蔓上葉圓者草名蔓氣味苦平無毒主治蛇虺蜂螫狗咬菜肉益毒鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去州北汝州南岡上有五月六月采苗日乾

血可走毒痛上立清毒入腹者煮汁飲即解本經風邪熱極者汁飲搗不傳諸毒妙李

白花藤

唐本集解生淮南交州廣州平澤苗似野葛葉似女貞莖葉俱無毛而白花其根似葛而骨柔皮厚肉白大療毒用根不

白花藤味甘平得氣味苦寒無毒主治解諸藥菜肉中毒清酒主虛勞風熱本發明時珍曰蘇言用根雷言用苗都可用爾按葛洪肘后

去根細封陰乾多不即覺漸不能食或心中漸脹先寒似瘧急含白銀一宿變色者即是也銀青是藥銀黃亦是藥藥蘭音混草名也但

白英

本經上品校正併入別錄鬼目藥名白草上白暮道排風上子名鬼目時珍曰白英謂其花色似紫象其葉文排風言其功用鬼目象其

集解別錄曰白英生益州山谷春采葉夏采莖秋采花冬采根又曰鬼目一名來甘實赤如五味十月采弘景曰鬼目俗人呼為白草子

長而五裂實圓若龍葵子生青熟紫黑東人謂之白草陶云白草似識之而不力辨識器曰白英鬼目菜也蔓生三月延長滿畦名符邪

璞曰似葛草有毛子赤色如耳端珠若云子黑誤矣江東夏月取其莖葉煮粥食極解熱毒時珍曰此俗名排風子是也正月生苗白色

可食秋開小白花子如龍葵子熟時紫赤色吳志云孫時有鬼目菜緣東樹長丈餘葉廣四寸厚三分人皆異之即此

物也又羊蹄草一名鬼目鎮南有木果亦名鬼目葉似栲子大如鴨子七八月熟黃色味酸可食皆與此同名異物也

蘿蔔

唐本草校正併入拾遺釋名蘿蔔音賁詩疏白環藤拾遺實名蘿蔔陸機所合子道羊婆奶綱婆婆鐵線色藏器曰漢高帝用子傳軍士金瘡

之說也其實嫩時有裂裂時如瓢故有雀瓢羊婆奶之稱其中一子集解弘景曰羅摩作藤生摘之有白乳汁人家多種之葉厚而大可有一條白絨長二寸許故俗呼婆婆鐵線包又名婆婆鐵線兒也

氣強盛陰道與枸杞葉同也恭曰按陸機詩疏云蘿摩一名芡蘭幽州謂之雀瓢然雀瓢是女青別名也蘿摩葉似女青故亦名雀瓢女青葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇莖葉並異生平澤別錄云華嫩時似蘿摩圓端大莖實黑藏器曰蘿摩東人呼為白環藤生蘿落間折之有白汁一名雀瓢其女青終非白環二物相似不能分別又曰所合子作藤生蔓延蘿落間至秋霜合子如柳絮一名雞腸一名黃桑時珍曰研合子即蘿摩子也三月生苗蔓延蘿落極易繁衍其根白軟其葉長而後大前尖根與莖葉斷之皆有白乳如藕汁六七月間小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸大如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及雙霜后枯裂則子飛其子輕薄亦如兜鈴子商人取其絨作坐褥代綿云甚輕暖詩云芡蘭之支童子佩鵲其蘭之葉童子佩鸞其鸞結角雖也此物實尖毒子支間似之雜音涉張子指強也此葉后似之故以此與也一種莖葉及花皆似蘿摩但氣臭根葉結子圓大如豆生青熟赤為異此則蘇恭所謂女青似蘿摩陳藏器所謂二物相似者也蘇恭言其根似白微子似瓢形則誤矣當從陳說此乃藤生女青與蛇銜根之女青名同物異宜互攻之

子同氣味甘辛溫無毒

時珍曰

主治虛勞補益精氣強陰道華食功同子

唐本

子傳金瘡生膚止血搗葉傳毒藏器取汁傳丹毒赤

腫及蛇蟲毒即消蜘蛛傷頻治不愈者搗封三度能爛絲毒即化作膿也時珍附方新補益虛損極益房勞用蘿摩四兩枸杞根皮五味子柏子仁酸棗仁乾地黃各三兩為末

每服方寸匕酒下
日三服千金方損傷血出痛不可忍用雞上婆婆鐵線兒搗水服渣瘡口立効袖珍

赤地利

唐本

校正

併入拾遺

釋名赤辟荔

綱目

五毒草

拾遺

五載

拾遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

遺

曰所在皆有今惟華山有之春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月間白花亦如蕎麥結子青色根若拔莖皮紫赤肉黃赤八月采根曬乾將藏器曰五毒草生江東平地花葉並如蕎麥根紫硬似狗脊亦名蛇蒿名同物異時珍曰五毒草即赤地利今併為一

根修治藏器曰凡采得細到用藍葉并根同入平伏丹妙氣味甘平無毒主治赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉唐本主癰疽惡

藥方中用之則其功長于涼血解毒可知矣

大瘡滅癰
調塗
聖惠

三月采根皮日乾大明曰紫葛有二種此是藤生者頌曰今惟江寧府乃台州生之春生冬枯似蒟蒻而紫色

主癰腫瘰癧并熱痛風通小腸
明大生肌散血附方
珍附五寶二產

金瘡傳真 生肌破血用紫葛二兩順流水三盞煎
一盞半分三服酒煎赤抄並經効方

亦曰虎島曰龍曰菖並取蔓形赤發也亦葛及拔音相近

石罍曰五葉每生齡枝開花如楓樹體態有初葉曰曼生字澤蓀似白銀四月五月光之候昇曰五端五葉開花青色所在有之夏葉節間時時勾彎葉間多其葉柔而有枝一枝一葉凡五葉葉長而光有疎齒葉背背淡之八月結實以揀青白色花大如

氣味酸苦寒無毒主治癰瘡腫腹脹咳嗽

小便尿血 五葉藏陰散 為末每服二錢 白湯下 衛生易簡方 痢症

發升乳腫便毒瘡初起者並用五葉藤以一握生酒
一塊搗爛入好酒一盞絞汁熱服取汁以渣燻之忌飲一

蘇代薑亦失葉易五爪龍樹汁和童尿煎酒服之取汗簡便方

別本時珍曰此草莖有細刺善勒人膚故名勒草詩云
藥草文詁爲來海音方言也別錄勒草即此今併爲一
藥

本草綱目

麻而小且薄者有刺亦名葛藤古方亦時用之保昇曰野處多有之黃似大麻花黃白色子若大麻子俗名葛勒蔓夏采蔓葉曬乾用則錄曰動生山谷如梧櫟時珍曰一月生苗葉有細刺華對胎生一葉五尖微似皂麻而有細齒八九月開細紫花成莢結子狀如黃
麻子氣味苦寒無毒主治動草生痰血止精益氣風別錄草主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴者汁或生搗汁服生汁一合服治傷

寒汗後虛熱 瘧瘧瘧久痢疳癪 潤三焦消五穀益五臟除九蟲辟溫疫傳時珍附方 舊三 小便石淋 葛藤搗出根攪斷以盂子

出不止更服 小便利 律草搗生汁三升酌二合 尿血淋瀝 產婦汗血 治赤色 方同上 久痢成疳 葛藤蔓葉以管吹入肛 新久瘧疾 用葛藤

一名勒蔓去兩頭秋冬用乾者恒山末等分以淡漿水二 大盞浸藥夏月下露一宿五更前一盞分二服以吐瀉愈 體癰瘡 律草一握以水二石煮取一石清 斗煮取一石五斗去滓入氣中浸浴一時方出坐室中又復湯浴一時乃出踐臥取汗勿令

見風明日又浴如浴時瘡存不可忍切勿搔動少頃漸愈后隔三日一作以愈為度 聖濟錄

羊桃 本品 下品 薔毛桃 本 薔毛桃 音桃 或 細子 並求 傷 別錄曰羊桃生山林川谷及田野二月采陰乾引景曰山野多有

即此方藥不復用係昇曰生平澤中處處有之苗長而弱不能為樹葉花皆似桃子細如棗核今人呼為細子根似牡丹也郭璞云羊桃

葉似桃其花白己子如小麥亦似桃形陸機詩說云葉長而狹花紫亦色其枝葉弱過一尺引蔓于草上今人以為滋潤重而喜沒不如

楊柳也近下根刀切其皮看熱灰中脫之可鑄藥管也時珍曰羊桃蔓大如指似樹而 弱如蔓春長嫩條葉軟葉大如掌上綠下白有毛狀如芋麻而圓且條浸水有涎滑

莖根氣味苦寒有毒 甘無毒 主治 熱身赤色除小兒熱風水積聚惡瘡 經 去臟五水大腹利小便 薔毛桃 作浴湯 別錄 煮汁洗

風痒及諸瘡腫極效 根浸酒服治風熱癰老 附方 舊一 傷寒 四肢煩疼不食多睡羊桃十斤搗散浸熱湯三 傷寒 攻 手足腫

煮汁入少鹽 附後水氣鼓脹 大小便滑羊桃根白皮末通大戟炒各半斤到水一斗煮五 蜘蛛咬毒 羊桃葉搗傳之

細子一年一熟子亦入藥采無時曰辟為絡石極相類葉粗大如藤狀木道更大于絡石其實若蓬時珍曰木蓮近樹木垣墻而生四時不凋葉堅強大于絡石不花而實實大如豆微似蓮蓬而稍長正如無花果之生者六七十月實內空而紅八月後則滿腹細子大如椰子一子一殼其味酸焉其殼虛輕易見兒比日食之

葉氣味酸平無毒主治瘰癧乾木服之上利即愈頌主風血暖腰脚變白不哀器治血淋痛濁藤葉一握甘草炙二分日煎服之時珍

月真微曰圖經言辟瘰癧治瘰癧近見宜通縣一老婦人年七十餘患瘰癧利中無聲藥急取辟為月真微研絞汁和蜜飲日升以津傳之後用他藥傳貼遂愈其功實在瘰癧乃知圖經之言不妄

藤汁主治風癰瘰癧風癰瘰癧瘰癧明木蓮氣味甘平清無毒時珍治壯陽道元勝頌固精消腫散毒止血下乳

治久痢腸痔心痛陰癰時珍方新為清膏木蓮頭炒白蜜生等分為末每服陰癰瘰癧木蓮即木蓮頭燒研酒服二錢又方木蓮頭

集酒利腸風集黑散子治風入臟或食毒積熱大便鮮血疼痛肛出或久患酒痢木蓮頭燒存性馬梅去核粉草炙等分為末每服二錢水一盞煎服萬氏和濟局方腸風下大便更瀉木蓮頭燒研粉炒

楊侯家大腸脫下木蓮頭連皮子切炒伏苓猪苓等分為末每服一切癰疽初起不問發於何處用木蓮四十九個獨去毛研細藏方二錢米飲下亦治夢遺名鎖陽丹普濟方一酒解開通服功與以冬草相上下陳自明外科精要乳汁不

通木蓮二個猪前蹄一個爛煮食之并飲汁盡一附錄地錦拾遺藏器曰味甘溫無毒主破老血產後血結婦人瘰癧不能飲食腹中有日即通無子婦人食之亦有乳也集蘭方塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶並常服之亦浸酒生淮南林下葉如鴨掌

藤蔓青地即有根亦綠樹石冬月不死山人產後用之一名地紫時珍曰別有地錦草與此不同見草之六

扶芳藤拾藤名藤葉解藏器曰生吳郡樓南小時如絡石蔓延樹木山人取楓樹上者用亦如桑

莖葉氣味苦小溫無毒主治一切血一切氣一切冷大風血腰痛去直病久服延年變白不老劉細浸酒飲藏

莖葉氣味苦小溫無毒主治一切血一切氣一切冷大風血腰痛去直病久服延年變白不老劉細浸酒飲藏

常春藤

拾遺錄主鼓藤拾遺錄龍鱗拾遺錄

日華錄器曰小兒取其藤於地行作集解藤器曰生林薄間作蔓繞草木上其

集解藤器曰生林薄間作蔓繞草木上其

氣味苦寒平

溫無毒主治風血虛老腹內諸冷血閉強腰脚變白煮服浸酒宜藏

凡一切癰疽腫毒初起取葉一握研汁和酒溫服利下惡物去

其根本

時珍外附方新

用髮經劉佳將尖葉碎為搗汁和蜜一

血血不止

聖濟錄

千歲藥

別錄併入有名未

上品校正

別錄草

集解

集解似見桃蔓延木上汁白今俗人方藥都不識用仙經

歡處須之藏器曰蔓似葛葉下白其子赤條中有白汁陸機草木疏云一名蔓瓜連蔓而生蔓白子赤可食酢而不美幽州人謂之推藥
毛詩云蔓葛注云似葛之草藤藥謂為敗黃深是女字頌曰處處有之藤生蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其並汁白而味甘五月開
花七月結實八月采子青黑微赤冬惟用葉春夏間取汁用陶陳二氏所說得之宗輿曰唐開元末詩隱民姜撫年幾百歲召至集賢院
言服常春藤使白髮還黑長生可致藤生太湖松南帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之權撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終
南山有草藤之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大臣石驍騎將軍甘守誠云常春藤乃千歲藥也甘藕乃杜家也方家久不用故撫
易名以神之民以酒漬藤飲之多暴死乃止撫內懸乃請求藥牢山遂逃去今書此以備世歎時珍曰按千歲藥常無常春之名惟陳藏
器本草土鼓藤下言李邕名為常春藤浸酒服老變白
則撫所用乃土鼓藤也其葉與千歲藥不同故名耳
正誤見果部
氣味甘平無毒主治補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸瘡久服輕
身不饑耐老通神明

纂根主治緩筋余通

忍冬

別錄

上品釋名金銀藤

集解

集解

集解

集解

而藤左纏故有金銀名焉以下諸名金銀股貴其功也土百
真君云蜜補陰陰草也取汁能伏硫制汞故有通靈之稱
集解別錄忍冬十二月采陰乾茶曰藤生繞覆草木上莖苗紫赤色宿量
有薄皮膜之其嫩蔓有毛葉似胡豆亦上下有毛花白藥家今人或以

本草綱目

卷十八下

草部

絡石當之非矣時珍曰乃久在處有之附樹延蔓微紫對節生葉葉似葶藶而青有滿毛三四月開花長寸許一蒂兩花一瓣一大一小如半邊狀長藥花初開者藥鮮俱色白二三日則色變青新舊相參黃白相映故呼金銀花氣香芬芳四月來花陰乾葉不拘時采權曰辛藏器曰小陰乾氣味甘溫無毒寒二者溫非也主治寒熱身腫久服輕身長年要藥別治腹脹滿能止氣下泄熱熱毒血痢水痢瀉前服治飛

尸遁尸風尸沉尸注鬼擊一切風濕瘰癧諸毒癰疽疔瘡楊梅諸毒瘡散解毒時珍明弘景曰忍冬煮汁釀酒飲補虛瘰癧此脫

之草人多不肯為之更求難得者貴遠賤近庸人之情也時珍曰忍冬葉黃及花功用皆同昔人稱其治風除濕解癰逐尸為要藥而後世不復知用後世稱其消腫散毒治瘡為要藥而昔人並未言及乃知古今之理萬變不同未可一輒論也按陳自明外科精要云忍冬酒治癰疽發背初發便當服此甚効甚奇勝于紅內消洪內輸邁沈內輸括諸方所載甚詳如瘍醫丹陽僧江西僧鑒清金陵王琪王尉子駿海州劉秀才純臣等所載癰疽發背經効方皆是此物故張相公云誰知至賤之中乃有殊常之効正此類也附方一

新十忍冬酒治癰疽發背不問發在何處發背發頤或頤或項或背或腰或脇或乳或手足皆有奇効鄉落之間僻陋之所貧乏之中藥材難得但處心服之俟其疽破仍以神異膏貼之甚効甚妙用忍冬藤生取一把以葉入沙盆研爛入生餅子酒少許稀稠

得所塗于四圍中留一口洩氣其藤只用五兩木槌槌損不可犯鐵大甘草節生用一兩同入沙瓶內以水二盞文武火慢煎至一盞入無灰好酒一大盞再煎十數沸去滓分爲三服一日一夜喫盡病勢重者一日二劑服至大小腸通利則藥方到沈內輸云如無生者只用乾者然力終不及生者治消渴愈後預防發癰疽先宜服此用忍冬草根葉花葉皆可不拘多少入瓶內以無灰好酒浸以牌幼連陳自明外科精要忍冬圖大燒一宿取出晒乾入甘草少許破蒸細末以溫藥酒打麴糊丸梧子大每服五十丸至百丸酒酒任

下此藥不特治癰疽大能止渴外科精要五痔諸癰方一切腫毒不問已潰未潰或初起發熱用金銀花俗名甘藤米花連葉葉自然汁半盞煎八分服之以渣傳上敗毒托裏散氣和血其功獨勝萬表積善堂方丁瘡便毒

方喉痺乳蛾方敷腫拔毒金銀藤大者燒存性葉焙乾為末各二錢大黃焙為末四錢癰疽托裏治癰疽發背腸癰乳癰無名腫毒上喉痺乳蛾上敷腫拔毒以腫毒初發以水酒調搽四圍留心洩氣楊誠經驗方癰疽托裏微痛實知狀類傷寒不問老幼

實服之未成者內消已成者即潰忍冬葉黃各五兩當歸一兩甘草八錢為惡瘡不愈左纏藤一把搗爛入雄黃五分水二升瓦礫煎細末每服二錢酒一盞半煎一盞隨病上下服日再服以渣傳之和濟局方惡瘡不愈之以紙封七重穿一孔待氣出以瘡對乳黃之

三時久大出黃水後用生肌藥取効選奇方輕粉毒癰方同瘡久成漏忍冬草浸酒日日常飲之戴原禮要訣熱毒血痢忍冬藤湯前五腫尸注飛尸者遊之皮膚洞穿臟腑每發刺痛變動不常也遁尸者附

骨入攻鑿血脈每病不可見死尸聞哀哭便作也風尸者足踞四末不知痛之所在每發恍惚得風雲便作也沉尸者纏結臟腑中引心脇每發絞切遇寒冷便作也尸注者舉身沉重精神錯雜常覺身癢每節氣至則大作也並是身中尸鬼引接外邪宜用死父苗葉刺數斜者取濃汁煎稠每服雞子大許鬼擊身痛作痛用金銀花一兩水煎脚氣作痛筋骨引痛驚驚藤即金銀花為末每酒酒化下一日二三服肘後方飲之李樓怪病奇方服二錢熱酒調下衛生易簡方**中野蘭毒**急采

鴛鴦草咲之即今忍冬
草也 洪邁夷堅志

口舌生瘡 赤梗蜜柿藤高脚地銅盤馬蹄香等分以酒搗汁雞毛刷上取涎出即愈 普濟方

治諸般腫痛金刃傷瘡惡瘡用金銀
三錢香油一斤熬枯去滓入黃丹八

不散如常攤用

乾坤義蘊

甘藤宋書

校正 自木部移入此

嘉慶庚申刊曰：古感音相近也。又有甜藤、甘露藤、
枯感藤，皆此類，並附之。忍冬一名甜藤，與此不同。

器曰生江南山谷其藤大如雞卵狀如木
已斫斷吹之氣出一頃其十甘美如蜜

汁氣味

甘平無毒主

氣通血氣解諸熱止渴藏除煩利五臟治腎鈞

石傳蛇蟲咬明解熱痢及膝腫珍附錄甘露

解諸病

服調中溫補

人服之得肥一名肥藤味甘溫無毒主風血氣
好顏多天明曰止消渴潤五臟除腹內諸冷

藏器曰生江南山林下蔓如葛味甘寒無毒

餌食甜美
蛟蛇瘡口

天止洩又治痢
大有小葉尖長

肉及狂犬牛馬熟黃傳
獨傳小兒腹中閃癖

含
水
藤

海校正 自木
入拾

釋名大彭驢解頭曰接劉欣期交州記云今路旁行人乏水處便喫此驢

嶺南及北海邊山谷狀若葛葉似枸杞多在

藤取汁用
斷之更生

之藤狀如瓠
根至地水不

飲之清美特珍曰顧微廣州記云水藤去地一丈
渴斷取汁飲之陳氏所謂大藤蓋即此物也

藤中

水氣味甘

主治癰疽渴心躁瘡癰丹石發動亦宜服之

五臟去濕痺天行時氣利小便其葉搗傳中

水爛瘡

軍藏治人骨體

髮令長
廣州時珍

鼠海拾遺山曰願微廣州記

食此糖故名其咬處人取為藥藏器曰生南
似枸杞花白有節心虛苗頭有毛彼人食

之如甘蔗味甘溫無毒主丈夫五勞七傷陰痿益陽道小便數白腰脚痛今除風氣壯筋骨補衰老好顏色濃煮服之取微汗亦浸酒服性溫稍令人悶無苦也

天仙藤

宋園集解頌曰生江淮及浙東山中春生莖蔓作藤葉似葛葉圓而小有白毛四時不凋根有蟲夏月採取根苗南人多用之氣味苦溫無毒主治解風勞同麻黃治傷寒發汗同大黃

墮胎氣頌曰流氣活血治心腹痛時珍附方新

六氣氣作痛天仙藤一兩好酒一盞煮至半監服之神效孫天仁集効方痰注臂痛天仙藤白朮羌活白芷梢各三錢片子薑黃六錢半夏製五錢每服五錢薑五片水

煎服仍間服千金五套主娠水腫始自兩足漸至喘悶似水足趾出水謂之子氣乃婦人素有風氣或衝任有血風不可作水安投湯藥

丸楊仁齋直指方宜天仙藤散主之天仙藤洗微炒香附子炒陳皮甘草烏藥等分為末每服三錢水一大盞薑三片木

瓜三片紫蘊三葉煎至八分空心服一日三服小便利氣脈通腫漸消不須產後腹痛兒枕痛天仙藤五兩炒焦為末每服炒土薑

多服此乃淮南名醫陳景初秘方也得于李伯時家陳自明婦人良方產後腹痛兒枕痛天仙藤五兩炒焦為末每服炒土薑

紫金藤

宋園集解頌曰生福州山中春初單生葉青色氣味缺主治丈夫腎氣頌曰消損傷瘀血搗傳憂瘡腫時珍附方新

紫金藤補腎臟暖丹田興陽道減小便填精髓駐顏色潤筋肉治元氣虛面目黎黑口乾舌澀夢想虛驚耳鳴目淚腰膝沉重百節酸

疾項筋緊背脊腰膝陰汗盜汗及婦人子宮久冷月水不調或多或少赤白帶下並宜服之用紫金藤已乾天去心三兩吳

南藤

宋園集解頌曰自木部移入此併人有名木宋園集解校正用別錄丁公寄藤石南藤名石南藤丁公寄藤別錄丁公寄藤別錄丁公寄藤

集解別錄曰丁公寄生石間蔓迤木上葉細大枝亦甚大如噴黃有汁七月七日采頌曰南藤即丁公藤也生南山谷泉州紫州有

有之細藤圓膩紫綠色一節一葉葉深綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹

處有小紫瘤疣中有小孔四時不凋莖葉皆臭而極辣白蛇食其葉氣味苦溫無毒別錄主治金瘡痛延年別錄主風血補衰老起陽

強腰脚除痺癰白逐冷氣風邪者汁服冬月浸酒服

藏器煮汁服治上氣欬嗽

時珍發明志曰按南史云解叔謙雁門人母有疾夜開窗

藥至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求翁并示以清酒法受畢失翁所在母服之即瘥訪醫及本草皆無此
遂愈也時珍曰近俗醫治諸風以南藤和諸藥熬膏市之號南藤膏白花蛇喜食其葉治諸風獨捷
似丁公藤而纖細無花實九月采莖曬乾味辛溫無毒主肢節風冷筋脉急痛作湯浴之佳時珍曰楊倓家藏經驗方有烈節酒治風節
風痛用烈節松節牛膝熟地黃當歸各一兩為粗末絹袋盛之以無灰酒二斗浸三日每服一盞入生酒一盞溫服表氣武東叔年二
十餘患此痛不可忍活城
馬東之以此治之而安

清風藤

宋圖經

釋名青藤

尋風藤

集解

頌曰生台州天台山中其苗蔓延木上四時常青土人采莖用

氣味

主治風疾

治風濕流注

歷節鶴膝

痺瘰癧瘡

瘡癰

瘡癰

瘡癰

瘡癰

瘡癰

瘡癰

瘡腫入酒藥中用

時珍附方

新

二風濕痺痛

青藤根三兩防己一兩咬咀

人酒一瓶煮飲

普濟方

一切諸風

青藤膏用青藤出太平菸港上者三二月采之不拘多少

入釜內微火熬七日夜成膏收入甕器內用時先備梳三

五把量入虛實以酒服一茶匙畢將患人身上拍一掌其後遍身發痒不可當
急以梳梳之要痒止即飲冷水一口便解風病皆愈也避風數日良 集簡方

百稜藤

宋圖經

釋名青藤

集解

頌曰生台州山中春生苗蔓延木

上無花葉冬采皮入藥土人用

氣味

主治溢汗

治一切風痛風癢

以五斤剉水三斗煮汁五

升熬膏每酒服一匙日三服

時珍附方

新

三頭風腦痛

百靈藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三斗作飯候冷拌神麴炒末九兩同入甕中如

常釀酒經三五日更取糯米三斗投之待熟浸酒每溫飲一小盞服後運身汗出為効

聖

惠方一切風痺

不拘久近百靈藤五斤水三斗煎一斗濾汁再煎至三斗入牛膝附子仙靈脾赤箭何首烏乳香鹿角膠各

二兩為末同煎別入白蜜五合熬和錫狀瓷瓶收之每服一匙溫酒下一日二服忌毒物滑物 聖惠方

大風瘡疾

百靈

藤四

兩水一斗煮三升去滓入粳米四合煮粥於室中浴畢乃食暖卧取汗
汗後皮膚起如髮片每隔日一作五六十日後斷愈毛髮即生 聖惠方

省藤

拾校正

自本部

釋名赤藤

細工藤

集解

藏器曰生南地深山皮赤大

如指堪縛物片片自解也

氣味

苦平無毒

主治蛇蠍煮汁服之齒痛打碎含之者效

狗耆

藏時珍曰赤藤善殺蟲利小便共道長堅志云趙子山苦寸白蟲病醫令飛酒而素性脫之一日寓居

腹頭有宿疾遂愈皆驚異之視所飲 治諸風通五淋殺蟲時珍曰赤藤善殺蟲利小便共道長堅志云趙子山苦寸白蟲病醫令飛酒而素性脫之一日寓居

紫藤

宋開寶集解藏器曰藤皮着樹從心重有皮四月生紫花可愛長安人亦種飾庭也江東呼為招豆 氣味甘微溫有小毒主治作煎

如糖服下水瘕病

落鴈木

海藥校正自木部移入此釋名云鴈即至代州鴈門而生以此為名 集解 詢曰按徐泰南州記云落鴈木生南海山野中蔓生四邊如刀

繞大木苗葉彩色大都似茶無花實彼人四月采苗入藥用

莖葉氣味甘溫無毒主治風痛傷折脚氣腫脹滿虛脹以粉木皮同煮汁洗之立刻又婦人陰瘡瘡泡以椿木皮同煮汁洗之

產後血氣痛并折傷內損諸疾煮汁服 附錄折傷木 唐本草曰生資州山谷藤繞樹木上葉似蒼葉莖而皮厚八月九月采莖日乾

味苦寒無毒主小兒發熱發強驚風寒熱熱淋利小便解煩明目並者服之 風延壽 拾遺藏器曰生南海山野中他處無有也蔓結

旬日主三消五淋下疳小兒赤白毒痢蛇毒瘡瘡毒一切瘡腫並宜煎服 草木上細葉南郡賦云風衍蔓延于衡景是也

千里及

拾遺校正併入圖經集解藏器曰千里及藤生道旁離落闊葉細而厚宜間有之 詢曰千里急生天台山中春生苗秋有花土

花不結實采葉入眼 藥名黃花滴益一物也 氣味苦平有小毒 寒無毒 主治天下疫氣結黃瘡瘡毒煮汁服取吐下搗傳蛇咬 藏同甘草煮汁飲退熱

明目入衆藥

同小書煎服治赤痢腹痛

附方新爛弦風眼千里光草以等殺葉包煨熟
檢汁滴入目中經驗良方

藤黃

海正

自木部移入此

釋名樹名海藤

陶曰按郭義恭廣志云出岳鄂等州諸山崖樹名海藤花有藥散落石上彼人收之謂之沙黃就樹
采者輕妙謂之臘黃今人訛爲銅黃銅黃音謬也此與石淡米之無異蓋家及丹道家時用之時珍

曰今畫家所用藤黃皆經煎煉成者紙之麻人按周達觀直隸記云國有畫黃乃氣味酸澆有毒主治婦牙疳齒點之便落
李樹脂卷人以刀斫樹枝滴下次年收之似與郭氏說微不同不知即一物否也

附錄諸藤

一十
九種

地龍藤

拾遺藏器曰生天目山繞樹蟠屈如龍故名吳中亦有之小異味
苦無毒主風血羸老腹內腰脚諸冷食不調不作肌膚浸酒服之

龍手藤

藏器曰出安務浦石上向陽者葉如龍手采無時味甘溫無毒主偏風口喝
手足癱緩補虛益陽去冷氣風痺以醇酒浸近火令溫空心服之取微汗

牛領藤

藏器曰生嶺南高山形扁如牛領取之陰乾味甘溫無毒
主腹內冷膝痛弱小便白數陽道乏者汁服或浸酒服

牛妳藤

藏器曰生深山大如樹牛好食之其中有粉味甘
溫無毒主救荒令人不饑其根食之令人髮落

鬼膊藤

藏器曰生江南林間邊葉如梨葉子如槓子藤
味甘溫無毒浸酒服去風血同黃芩傳癰腫

班珠藤

藏器曰生山谷中不凋子如珠而斑冬月取之
味甘溫無毒浸酒服主風血羸瘦婦人諸疾

息王藤

藏器曰生嶺南山谷冬月不凋味甘溫
無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁服

萬一藤

藏器曰生嶺南蔓如小豆一名
萬言主蛇咬朽木水和傳之

曼遊藤

藏器曰生無為天門山谷狀如寄生着大樹葉如柳春花色紫蜀人謂之沉鷄藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽治癰

百丈青

藏器曰生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生味苦平無毒解諸毒物天行瘡癰疫毒並煮汁服亦生搗汁服其根令人下利

溫藤

藏器曰生江南山谷着樹不凋莖葉味甘溫無毒浸酒服主氣血積冷

藍藤

藏器曰生新羅國根如細辛味辛溫無毒主冷氣咳嗽煮汁服

瓜藤

宋圖經曰生施州四時有葉無花果皮無時味甘涼無毒主諸熱毒惡瘡同刺猪苓洗去粗皮焙乾等分搗羅用甘草水調貼之

金稜藤

頌曰生施州四時有葉無花果無時味辛溫無毒主筋骨痠痛與續筋根馬接脚同洗去粗皮焙乾等分為末酒服二錢無所忌

含春藤

頌曰生台州其苗延木冬夏常青莖葉治諸風有効

獨用藤

頌曰生施州四時有葉無花果上有倒刺采皮無時味苦辛熱無毒主心氣痛和小赤頭葉焙等分研末酒服一錢

祁婆藤

頌曰生施州山中蔓延木上四時常有土人采葉治諸風有効

野猪尾


頌曰生施州藤纏大木四時有葉無花果味苦澆涼無毒主心氣痛解熱毒同百藥頭等分焙研為末每酒服二錢

石合草

頌曰生施州藤纏木上四時有葉無花土人采葉味甘涼無毒主一切惡瘡飲瘡口焙研溫水調貼

骨路支

拾遺藏器曰味辛平無毒主上氣浮腫水氣喘逆婦人崩中餘血癰瘕殺三虫生昆侖國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有之名飛藤此條原附錄紫葳之后鈔書遺落附于此也



L69314
1888
V.17-18